




Mattholi
Medici.

1569





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4156/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4156/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4156/A/2

L 4156⁽²¹⁾
A/2

S. A. 5. 4. 20.

23349

Comenius An: Huijari

~~Comenius An: Huijari~~

Novell
16/12/16

1.2.

MAT
SENE
O

Simplic
Isid

ACCES
Profan
mulum
nam Ex

Apud


PETRI ANDREAE
MATTHIOLI
SENENSIS MEDICI
OPVSCVLVM,

DE
Simplicium medicamentorum
facultatibus secundum lo-
cos, & genera.


ACCESSERVNT QVOQVE

*Præfationes quædam huic opusculo ad
modum necessariae, quarum enarratio-
nem Epistola ad Lectorem indicabit.*

CVM PRIVILEGIO.



VENETIIS,
Apud Vincentium Valgrifium.
M D LXIX.



ILL

AC

Do

Equi

Coni

and

L

Petrus



fiel

ctu

litua

com

ILLVSTRI,
AC GENEROSO
DOMINO VITO

DE DORIMBERGIO,

Equiti aurato, Sac. Cæsa. Maieſtatis
Conſiliario, & ad Illuſtriſs. Se-
natum Venetum Oratori,
Domino ſuo obſer-
uandiſſimo.

Petrus Andreas Matthiolus
Senenſis Medicus.
S. P. D.



TRes ſunt pòtiſ-
ſimum cauſæ,
quæ amorem,
& amicitiam in
ter homines cõ
ciliant: una pro
ficifcitur ab ipſius naturæ du-
ctu, eſtq; arcana quædam ſimi-
litudo ſenſuum, & animorum
coniunctio; hinc ſæpe accidit,
A 2 ut

ut quosdam nunquam nobis an-
tea cognitos primo intuitu, uel
congressu amare incipiamus.
Altera oritur à consuetudine, &
mutua conuersatione, siue uitæ
societate, quæ etiam non pa-
rum habet momenti ad conglu-
tinandos animos. Tertia sita est
in rebus externis, ut pote offi-
cijs, & beneficijs, quæ inter can-
didos amicos inuicē communi-
cari solent. Ab his tribus fonti-
bus amicitia nostra uetus ma-
nat: nā quo tempore ambo Go-
ritij degimus, ego te quasi natu-
ra mea hortante amaui, & colui
propter uirtutes tuas excellen-
tes, & singulares ingenui animi
dotes, quæ ueluti philtrū me in-
tui amorem rapuerunt. qui qui-
dem amor deinde familiari, &
iucunda conuersatione sensim
auctus, & tandem etiam mul-
tis officiorum commoditati-
bus

bus à te mihi præstitis adeò con-
firmatus, & stabilitus est, ut
eum nulla loci, uel temporum
intercapedine mutari, quinetiã
nec Lethæo flumine ablui posse
existimem. Sed quoniam bene-
ficia non solummodo amorem
cōciliant, uerūmetiam ad repo-
nendam gratiam obligant, non
satis mihi fuerit, ab amore, quo
te cum ueneratione comple-
ctor non discedere, nisi etiam
beneficijs à te acceptis gratiam
aliquam referam. Sed inter mul-
ta genera gratitudinis unus mo-
dus mihi peculiaris est, quo ego
eos, qui de me benemeriti sunt
remunerari soleo, nempe dedi-
catio librorum, & lucubratio-
num mearum. Hac igitur uia
uolui tibi memor, ac gratus ap-
parere, uel saltem gratitudi-
nis, & obseruantiaē conatum ali-
quem declarare, sub nominis

Λ 3 tui

tui auspicio emittens libellum
hunc medicamentarium, phar-
macopæis, medicis, & omnibus
medicinæ studiosis æquè etiam
utilem, ac necessarium. Et præ-
ter enumeratas causas huius
meæ dedicationis etiam acce-
dit alia, nempe quòd liber hic
primò lucem experitur Vene-
tijs, apud cuius urbis Illustrissi-
mum Senatum tu cum multa
laude inuictissimi, ac potentis-
simi Cæsaris Maximiliani Secun-
di, personam sustines, ac repræ-
sentas, qui tuam prudentiam,
rerum usum, ac peritiam ani-
maduertens, tibi ad celeberrimam,
& splendidissimam to-
tius orbis Rēpublicam legatio-
nis munus demandavit. Præte-
rea & hoc me non mediocriter
impulit, quòd tu librum hunc ti-
bi destinatum, & intelligere, &
iudicare potes, ut pote qui nobi-
litati,

litati, ac generis splendori literarum decus, & optimarum disciplinarum cognitionem addideris. Postremò cùm tua salus mihi ob eas, quas dixi, causas debeat esse charissima, librum mitto in quo multa tuendæ, & recuperandę uoletudinis auxilia non uulgaria te inuēturum esse non dubito. Accipe igitur Illustris Heros quicquid est munusculi sereno uultu, & Matthioli modis omnibus tibi addictissimi memor esto. Benè, ac foeliciter uale. Oeniponti quinto nonas Martij, Anno M. D. LXIX.

PETRVS ANDREAS
MATTHIOLVS.
candido Lectori.
S. D.



*V*M quæ de Sim-
plicium medica-
mentorum uiri-
bus secundum lo-
cos, atque etiam
secundum gene-
ratum ex Dioscoride, tum ex no-
stris in eundem authorem commen-
tarijs certo quodam ordine collegi-
mus, medico usui profutura Medi-
cis nonnullis uiderentur, cumque
Commentariorum nostrorum uolu-
men, ubi hæc scripsimus, non quo-
cunque commodè circumferri pos-
sit, rogauerunt me ij plurimum ut
ea, nunc iterum per se in enchiridio
excudenda typographis traderem:
Horum uotis, cum refragari nequi-
uissem, ne me qui natiua quadam
animi liberalitate in Reipublicæ
usum

usum, mea sanè omnia, editis uarijs in linguis uoluminibus, sempiternæ posteritatis memoriæ consecraui, nunc morosum, atq; auarum in re tam exigua deprehenderet, decreui, omnino eorum petitionibus satisfacere. Cæterum quoniam simplicia, de quorum uiribus ad morbos quosuis sanandos scripsimus, non ea tantum sunt, de quibus meminere tum Dioscorides, tum etiam fortasse accuratius Galenus, à quibus eorundem qualitates tam primas, quàm secundas, & tertias edocti sumus, sed plurima etiam sint à posterioribus, recentioribusque materiæ medicæ professoribus reperta, à quibus ne tantillum quidem de primis, secundis, ac tertijs qualitatibus est promulgatum, uisum nobis est, non fore præter rationem si huic opusculo aliquid de saporibus omnibus adiungeremus. Id quod postea præ-

A 5 stitimus

stitimus præposita nobis ratione fre-
ti : quòd (ut Galenus est author)
ex plantarum saporibus, & primæ,
& secundæ plantarum qualitates
facile dignosci possint . His quoque
non nulla addidimus de medicamen-
tis, quæ peculiariter tota sua sub-
stantia operantur, & de quorum
facultatibus, nulla ratio reddi po-
test. Adieciimus quoque quo nam
pacto simplex medicamentum in-
telligi debeat, quòd scitu quoque
necessarium sit : quinetiam de pri-
mis, secundis, ac tertijs simplicium
medicamentorum qualitatibus. Item
quid agant quæ tenuium sunt par-
tium, quæve crassarum, ac etiam
præceteris noscendum esse quan-
tum unumquodque medicamentum
habeat caliditatis, frigiditatis, sic-
citatis, humiditatis, per gradus
usque ad quartum. Id quod conse-
qui nemo potest, nisi aut degustato
sapore, aut longa omnino experien-
tia

tia. Cæterum cùm medicamenta de quibus secundum locos, & genera ad morbos curandos egimus, uarijs parentur modis; attexuimus etiam non nulla de eorum uaria parandi ratione, nempe de Elixatione, Infusione, seu maceratione, quin etiam de Destillatione non modò aquarum, sed etiam oleorum ex aromatibus quibusdam eliciendorum, quorum iam frequens admodum incipit esse usus, ob admirabilem eorum præstantiam, & de quibus parandis pauci admodum, aut fortasse nulli hætenus uera scripserunt. Ad didimus prætera pauca quædam de Colliquatione, & Dissolutione, de Tritura, Torrefactione, Vstione atque Ablutione. Quæ omnia si ignorentur ab ijs, qui medicamenta simplicia, ac etiam composita propinant nullo prorsus pacto rectè mederi poterunt. Adiunximus quoque ex Galeno per catalogos simpli

cium omnium medicamentorum, de
quibus ipse meminit, primas quali-
tates per gradus usque ad quartum;
quinetiam secundas, & tertias;
quas medicis scitu perquam necessa-
rias fore iudicauimus. Quæ omnia
huic opusculo addenda necessariò
admodum uisa sunt, quòd mihi per-
suadeam, ijs prius intellectis posse
quempiam longè meliori ratione,
ac securitate nostris collectis auxi-
lijs in morbis omnibus uti. Itaq; be-
nignissimè Lector hæc boni consu-
las, & nostris fruarè laboribus.
Vale.


DE

7

DE SAPORIBVS

medicamentorum.

De amaro sapore. Cap. 1.



MARVS sapor ca-
lidus est, terrestris
& igneus. Mun-
dat enim, incidit,
attenuat, abstergit
casque præsertim
que in iecore sunt
obstructiones, in-

*Lib. de
oculis.*

*7. de
sim. m.
f.*

cidit & calefacit, hætenus tamen, ut
non urat. Crassa eius est materia, atq;
terrena, ab exuperante calore præas-
fata. Itaq; nouisse sat fuerit, qualita-
tem amaram omnem, calidis simul sic-
cisq; substantiis accidere, ac præter hæc
tenuibus, & terrenis. Nam cum ad ex-
tremam tenuitatem, atq; elaboratio-
nem terrena pertingit substantia, tunc
amara prouenit qualitas. in qua sanè
uis est præcipua detergendi, quin etiã
(ut diximus) meatus expediendi. Idq;
cum calore, haud tamen extremo, tam
etsi non instrenuè calefaciat, & desic-
cet, cum terrenæ sit essentiæ à largo
calore extenuatæ. At qui amara id
quidem

*4. de
sim. m.
f. c. 19.*

*7. de
simp. m.
fac. c.
de me-
lanthio.*

4. de

De Facultatibus

4. *de* quidem non perindè ac acria præsta-
f. m. f. re ualent : quippe quamuis quæ amara
cap. 9. sunt adstringentibus sint tenuiora,
acribus tamen crassiora habentur.

Quamobrem neq; tam facilè crassos,
lentosq; humores pertranseunt uelut
ea, quæ tenuiore sunt essentia, nec inci-
dere perinde, ut ea quæ sunt crassiora,
nequeunt. In medio autem utriusq; ex-
cessus sint oportet, quæ incisura sunt,
nempè ut neque promptè penetrent,
peruide ut flamma, neque dum cun-
ctantur, tardantq; , dissecare non pos-
sint. Præterea cum calor, qui amaris
inest medicamentis penetrando cras-
siusculam materiam secum ducat, ea
quidem quicquid obuium est secum ra-
pit, & abradendo expurgat, ita, ut quò
amarius fuerit medicamentum, eò ua-
lentius id molietur. Siquidem Absin-
thium (exempli causa) id moderatè
agit, at aloë, aristolochia, centuarium
minus, & colocynthis non solum ex-
purgant, & absterunt, sed etiam par-
tes ipsas in modico usu exasperant at-
que corrodunt, & exulcerant. Quæ ue-
rò remissiore sunt amaritudine, minus
tum excalfaciunt, tum siccant, atque
ad alia munia obeunda, imbecilliore
sunt facultate. Imò ubi amaritudo in
uno, & eodem medicamento à refrige-
rante qualitate uincatur, aut obscure-
tur,

tur, illud quidem frigidum non calidum statuendum erit. Quòd autem amarus sapor in siccis consistat corporibus, palam est, quòd minimè omnium amara putrescant, minimeq; uermes, aliq; non nulla animalicula, qualia in radicibus herbisq;, aut fructibus putrescentibus prouenire solent, procreent. Porro quæ exactè amara sunt (uoco autem ita, quæ nulla sensu notabili alia participant qualitate) omnibus propè animantibus esui inepta sunt. Quippe cùm animal omne plus, minusue sit humidum, amara autem sicca, haud aliter, quàm cinis & puluis, itaq; neq; cinerem, neq; puluerè, neq; fauillam, neq; calcè, neq; animal ullum esitat, neq; eorum, quæ planè amara sunt quicquam. Vt autè medicamenta intro sumpta, infarctus expediunt, crassa attenuant, lentaq; incidunt, ita, & exterius admota, sordida ulcera, lichenas, impetigines, alphos, lentigines, & cetera, quæ cutem inficiunt, expurgant & detergunt. Quin etiam amara, quòd siccando superuacuos humores aut absorbent, aut detergunt, & dulcedini ex qua facilè putredo gignitur aduersatur, ratione optima putredinem arcet, & corpora diu integra conseruat, ut præceteris Aloë.

De

De Facultatibus

De acerbo sapore. Cap. 2.

1. de **A** Cerbum omne appellatur, quod
fr. m. fa. linguæ admotum ualde desiccatur,
ca. 37. cōtrahit, & in multā usq; profundita-
 tem exasperat; sicut pira syluestria im-
 matura, & corna: ab austero intentio-
 ne duntaxat diuersum. Siquidē auste-
 rum Grecis id sibi uult, quod medio-
 4. de **A** criter adstringens. A cerbū quod uehe-
cōp. me. mēter id facit, genus utriq; commune
per gē. adstrictionis uocabulo signatur, nec
cap. 5. etiam utrum ualidē an obscurē ea fiat
 declarante. Atqui perspicuum est quod
 2. de a- adstringens, austereum & acerbum, tria
lim. f. hæc nomina saporis qualitatem uni-
cap. 1. cam significāt. Porro austera sunt mul-
 2. de ta, ut mali punici genera, Cydonia ma-
loc. aff. la, ac reliqua complura esui apta. Sanē
c. 7. acerba haud quaquā iucunda, non so-
 lum ea, quæ medicamentorum spe-
 ciem referunt, uelut hypocistis, & ba-
 laustium, & galla, & Rhus, sed etiam il-
 la, quæ cū sint huiusmodi, recipiūtur
 in cibum, quamuis quæ summē acerba
 sunt, nutrire nequeant. Memineris
 7. met. autem uelim acerbam qualitatem sua
cap. 7. quidem ipsius uirtute, & refrigerare,
 & resiccare, cuiusmodi etiam acide
 4. de qualitatis est proprium, sed acidorum
fr. m. f. saporum transitum in sentiētibus par-
cap. 7. tibus fieri conspicitur, acerborum au-
 tem

tem tardius: tum acida quidem in alto magis agere apparent, in superficie autem acerba: quæ omnia crassarum esse partium acerba indicant, acida uerò tenuium. Atqui ubi acerba alicui calefacientium sint admixta, quod ex ambobus compositum est, minus quidem in calfaciendi munere efficere, quam alterum, siccando uerò minus quam utrumque. Præterea omnia adstringentia contrahunt ac densant meatus, quin etiam uinciunt, ac continent partium sibi inuicem cohærentium substantiam, atq; minus, magisq; hoc pro adstrictionis quantitate efficiunt. Cæterum stringendo, ac densando summa corporis, quod adstringitur uirtus illorū excluditur, & in altum ire prohibetur: ob quam rationem pulchrè nonnulli medicorum huiusmodi pharmacis alia tenuium partium, & acri potestate prædita indere cogitarunt, à quibus ueluti ductæ adstringentium uires in profundum corpus perueniant. Ad hæc acerba contrahunt, densant, ac pariter constringunt: repellunt autem tum austera tum acerba, quæ communem adstringentium appellationem habent. Quin etiam acerba stomacho grata sunt, quemadmodum amara omnino ingrata. At meminisse quoq; oportet, qd cum fructus initio acerbi sint,

7. met.
cap. 7.

4. de
comp.
med. per
gen. c. 5

7. de
st. m. f.
cap. de
cappa.
re. .

3. de
com. m.
st. l. c. 3.

sint,

De Facultatibus

6. de f. sint, temporeq; maturescentes dulce-
m. f. c. scant, sequitur ex calore illis proueni-
de Ab re dulcedinem, acerbitem uerò con-
rotono. stitisse ex frigore. Itaque si acerba
4. de f. aqua incoquantur; relicta in aqua acer
m. f. c. 7 bitate dulcescunt.

3. de al.
f. c. 32.

De acris sapore. Cap. 3

4. de f. **A**Cre saporum genus, cum appella-
m. f. ca. tione propria careat, communi
19. per excellentiam usum uidetur. nam
cum sapor amarus, & acidus ambo
etiam acres sint, in quocunq; tamen
corpore uehementem cōperimus acri-
moniam: tametsi neq; amarum sit, ne-
que acidum, acre appellare consue-
uimus: quanquā multa in specie sint
corpora eiusmodi: alia enim edi pos-
sunt, alia esui sunt inepta. Ea igitur
quę esui idonea sunt, dulcem quan-
dam saltem obscuram admistam ha-
beant qualitatem nece sē est, proinde
multis ipsorum pro obsonio utimur,
multis uerò ut condimentum tātum:
at ut cibo ipsorum omnino nullo, idq;
ob uirium uehemētiam. Porro eorum
quę non eduntur, alia mortifera sunt,
alia simpliciter medicamenta: omnia
saltem cuti nostrę imposita, ulcus cele-
riter inducūt. quin etiam horum quo-
que non nulla qualitatem quandam
amaram

amaram præferunt, quemadmodum
 esculentorum quædam dulcem, non
 tamen uocantur amara, quandoqui-
 dem in eis leuis est, & infirma, ualida
 autem uis acrimoniæ. Sunt & quæ ne
 gustare quidem audeas: eiusmodi est
 thapsia, & cantharides, & ea quæ ero-
 sione, & putrefactione interimunt.

Sed eorum gustum ex eis coniiicere li-
 cet, quæ in toto agunt corpore. Porro
 acres sapores, exactè ipsos calidos di-
 cimus, deinde, exedentes, urentes, cru-
 stam molientes, ac denique etiam col-
 liquantes, si intra corpus sumantur:
 siquidem in tota substantia animanti
 cuiuspiam summè aduersentur, putrefa-
 cientes, eiusq; generis animantium de-
 leterios, si caloris duntaxat immode-
 ratione, si crassæ sint essentiæ terreæq;
 interiora ulcerandi pollere facultate,
 si tenuis urinam ciendi, prouocan-
 diq; sudoris uim habere: In summa au-
 tem incidendi & digerendi per hali-
 tum, ex quo genere quidam expuitio-
 nibus ex thorace, tum mensium moti-
 bus auxiliantur. Præterea acria omnia
 esse palam est, quæ succos crassos te-
 nuare queant, & sensus nostros pun-
 gunt, ac mordicant, quæ etiam si lar-
 gius equo sumpta fuerint, uentricu-
 lum mordicant, ciborumq; nauseam
 magnam inducunt, & halitus acres
 emittunt,

*Lib. de
 att. uic.
 rat.
 cap. I.*

De Facultatibus

emittunt, non modò dum manduntur, sed etiam postquàm è corpore fuerint egesta. Plurima autem eorum urinas & sudores graueolentes & acres, promouent, phymatibus præterea ac furunculis sunt accommoda: quædam autem ex ipsis cutim diuellunt, atq; facile erodunt, alia uerò pertundunt, alia ipsius partem aliquam in pus uertunt. ulceraq; magna, & quas uocant escaras efficiunt. Hęc omnia satis probant, ea acrem quandam, & incidẽtem habere facultatem. Cui rei euidentissimo etiam sunt argumento humores in corpore nostro ab eis extenuati: quin etiam experientia ipsa rationem confirmat: Videmus enim corpora omnia, in quibus humores frigidi, crassi, ac lenti abundant, huiusmodi ciborum usu, maiorem in modum alleuari. Vt in aliis, ita in his quoq; oportet medicum tempori, ac mensuræ usus diligenter esse attentum: periculum enim est, si quis non rectè his utatur, ne tandem prauo succo impleatur. Ad hęc acria utilia sunt, ad detergendum, abstergẽdum, detrahendum, extenuandum, digerendũ ualenterq; siccãdum, & colliquandũ. Eadẽ cuti imposita per spicuè eã calefaciũt, atq; in molem at tollunt, iubente calore, ac si diutius immorentur, etiam ulcerant, è quibus euident ex

9. de
simp m.
fa. c. de
pyrite
lapide
ibid. c.
1.

euidenter apparet ea tum incidere,
tum excalfacere, tum etiam à uicinis
partibus ad se sanguinem trahere;
Quo fit ut quæ talia sunt(ut calamin-
tha)ad uenenatarum bestiarum mor-
sus assumantur, uelut etiam cauteria,
& quæcūque medicamēta calida sunt,
& acria, tenuiumq; partium, quæq; fa-
cilè ex alto ad se circumiacentem om-
nem humiditatem possunt attrahere.

Præter id scire etiam oportet, quòd
acria, simul & acida agere possunt,
quantum ad extenuationem, præpur-
gationemq; attinet. Ceterū in hoc dif-
ferunt, quòd acidum refrigeret, acre
uero excalfaciat, quin etiam quòd il-
lud reperiatur, hoc attrahat & dige-
rat. Porro succus frigidus, non acida,
sed acria postulat. Quanquam enim
cū acida tum acria succos crassos in-
cidunt, in eo tamen differunt, quod
hæc cū calefactione, illa cū refrige-
ratione id præstent. Est etiam acrium,
& amarorum discrimen, quanuis ama-
ra acredine nō uacent. siquidem acria
irritare, mordere, calefacere, & fluore
in affectis partibus concitare, amara
uero exiccare citra morsus, & caleface-
re queunt. Postemò cū nullum repe-
rire corpus queas, missionis adunguē
expers, inspicienda item est eorum,
quæ illi accidunt comestio, idq; secun-
dum

5. de
s.m.f.c.

6.

2. de a-
alim. f.
c. 2 I.

5. de
med. p
gen. c.
2.

9. de s.
m.f. ca.
de terra
samia.

dum

De Facultatibus

dum leuitatis ac grauitatis differen-
tias, easque quę gustu uisuntur, nam si
qua eluceat adstrictio, tantum assum-
psit frigiditatis, quantum assumpsit ad-
strictionis. sin etiam acrimonia quę-
dam apparet, tantum inesse scito cali-
ditatis, quantum & acrimonię.

De acido sapore. Cap. 4.

4. de s.
m. f. c.
15.

Aciditas in saporibus nasci potissi-
mum uidetur, dum à calido quidē
mutatur, ut tamen nō superet. Id quod
ex acidis ructibus uel maximē coiciat.
Nam hi haud quaquam ubi nulla
prorsum facta in uentre ciborum alte-
ratio prouenire solent, quemadmo-
dum nec ubi optimē concocti, sed tan-
tum ubi semicocti (ut ita dixerim) fue-
rint. Voco autem semicoctos, qui à
uentriculi calore alterationem per-
pessi non etiam perfectē ab eo supe-
rati fuerint. Sic lac, ptisanæ succus,
& quęcunque eius sunt generis tem-
pore æstiuo citius acescunt, quàm hye-
me, postulantque ædes frigidas, ut in
ijs reposita plusculo tempore perdu-
rent. Ex quibus omnibus patet, quòd
à calore mutante quidem, non tamen
prorsum uincente, aciditatis genere-
tur qualitas, atque ob id plerisque in-
est fructibus, priusquàm maturuerint.

Etenim

Etenim si simile quid illis usu uenit,
quod Borealibus constitutionibus ac-
cidit, ut tenuis scilicet essentia sint, si
mulque frigidi, nasci eos haud sine ca-
lore satis constat, sicut nec illum ip-
sum aerem. Proinde quoque, quæ sum-
mè nos refrigerant; ac interimunt, ue-
luti cicuta, opium, hyoscyamus, man-
dragora, minimè omnium acida sunt.
Quippè licet frigidi sint saponi ac-
idi omnes, haud tamen eò usque re-
frigerant, ut interficiant. Non enim
subtilis forent essentia, si extremè ef-
sent frigidi. Itaque non modo iam
quod frigidus sit sapor acidus, sed &
quatenus iam apparuit: Exploranda
porro eius natura est in oxylapatho
& oxalide: Est autem hæc olus sylue-
stre. In istis enim maximè mihi syn-
cerus est uisus ac simplex, nulliusque
particeps acerbitalis, ut solent arbo-
rum fructus: perspicuo enim hi cum
acribitate quadam admistam habent
aciditatem, sicut cum acrimonia ace-
tum. Itaque quod proprium in sapo-
ribus appellatur acidum, à sola lingua
percipi potest, sicut & acre. Cæterum
quod utrique commune est, nempe
mordacitas, etiam à tactu sentitur:
utraq; uerò lingua agnoscere nata
est. Nam quæ communia sunt, sicut
& reliqua corpora sensilia, quæ tan-
quam

De Facultatibus

4. de f.
m. f. c. 3
4. de f.
me. f. c.
17.

quam gustus organum percipit. Idque mihi uidetur eximium ac particulare esse iuxta totarum substantiarum tum proprietatem tum (ut ita dicam) alienitatem. Porro acidum quicquid id fuerit, plane frigidum est, siue pirum, siue malum, siue acinus uuae, siue rubi, siue ipsius mori, siue mala punica, siue quis alius tum fructus, tum succus, tum planta, ut oxalpathum, & oxalis. Quippe si gustanti uehemens, atque manifesta illi inesse aciditas apparet, nec quicquam praese ferat acrimoniae, omnino hunc succum refrigerantem reperies: quin confidenter utitor, siue ad ardores uti consilium est hypochondriis imposito, siue ad erysipelas, siue ad alium affectum calidum. Similiter quoque frigidus affectus ab eo omnes palam ledi comperies. Porro ubi mista tibi qualitas apparet cum acrimonia, coniiciendum est caliditatem quoque inesse, si iuncta sit adstrictio, aliud est frigiditatis genus, nam acida frigiditas tenuium partium est, si iuncta sit adstrictio crassarum. Sed uelox si quidem acidorum saporum transitus insentientibus partibus fieri conspicitur, acerborum autem tardus. Tum acida quidem in alto magis agere apparent, in superficie autem acerba. Preterea accida incidere, extenuare, diuidere, fractuque liberare

5. de f.
m. f. c.
26.

liberare (*ῥαχαλαίρει* Greci uocant) ci-
 tra exsiccationem, nata sunt. At qui
 perspicuum est, quod adstringētia qui-
 dem, quantum in ipsis est, alui dete-
 ctionem semper cohibent, acida uerò
 cum succum crassum in uentre inuene-
 rint, ipsum incidunt, ac deorsum sub-
 ducunt, ob idque detectiones hume-
 ctant: quod si uentrem purum inuene-
 rint, ipsum magis sistunt. Cæterum
 acida uniuersa, tum ea, quæ simplici-
 ter acida sunt, uelut oxalida, tum mi-
 stis quoque aliis facultatibus quædam
 siue dulcibus, siue amaris, siue acris
 nihilo secius refrigerantia sunt, qua-
 lia sunt mala punica, mala, pruna, uuæ,
 mora, ficus, cerasia, ipsumque adeo
 acetum, sed huic permista est quædam
 acrimonia. Meminisse quoque oportet,
 quod quæ summè acida sunt, per-
 inde ac acerba, & amara, aut simplici-
 ter aliam quamuis qualitatem, præ-
 ter dulcem sortita sunt, ea omnia nu-
 trire nequeunt, at si iunctam habeant
 dulcedinem, hæc omnia nutriunt, cæ-
 terum per se dictorum nullum, ut nu-
 triat satis est.

4. de f.
 m. f. c.
 7.

Appendix de aceto.

Quoniam acidum saporis mentio ace-
 tum mihi in mentem redegit,
 B fit

De Facultatibus

fit nunc ut non ab re putauerim, aliquid hic de eo differere, & præsertim cum non desint, qui aceti acrimoniam mordacitatemque percipientes, sibi certò persuadeant, acetum potenter excalfacere, quanquam re uera refrigerat. Qui autem idem sentirent non deerant etiam Galeni tempore, medici. Quo factum est ut is lib. primo. cap. uigesimo tertio de simp. med. facult. eorum sententiam improbauerit, his uerbis. Haud concedendum quibusdam arbitror, qui acetum ex tenuitate sua & mordacitate, calidum esse colligunt. Nec enim quicquid tenue fuerit, id & calidum est, fortè uerò nec quicquid mordax fuerit & tenue. Verum in præsens id illis detur, tametsi adferre liceret niuem, Boream, aquam frigidam, non oculis duntaxat, sed etiam ulceribus, & raris corporibus omnibus mordaces, ut Hipocrates inquit ulceribus frigidum mordax. Verum etiam si quis & illud, ut dixi, concedat, quicquid mordax fuerit esse tenue, non statim & calidum concesserit. Itaque nec acetum proinde, quòd mordax sit, calidum fuerit, sed tenue, uti aer borealis, non tamen calidum. Præterea frigidam omnino qualitatem calidam longe superare in aceto restatur idem Galenus lib. octauo de simp. me.

me. fac. sic inquit. Acetum primo horum commentariorum mixtæ esse substantiæ, nempe frigide, pariter & calide, eiusque utriusque tenuium partium, demonstratum est, ceterum calidam frigidam exuperat. Porro magnam desiccandi facultatem obtinet, adeo, ut sit tertii ordinis desiccantium iam completi, utique cum calidum extiterit. Item eodem libro cap. 11. & 12. Apparet enim (inquit) à uino homini semper sitim increescere, ab aceto uero epoto interim quidem augeri, interim uerò sedari. Quippe quod sitis ipsa duplici ratione prouenire soleat, partim humoris inopia, partim caloris copia, quamobrem mirum uideri non debet si priorem quidem sanare nequeat, alteram possit. Si quidem humectare nequit, at refrigerare non instrenue. Et eodem quoque lib. cap. 21. Sed eorum (inquit) omnium acetum est efficacissimū quæ aut acrimoniam hebetant aut calorem refrigerare creduntur. Id quod etiam aliis in locis affirmavit. Cæterum non desunt quoque, qui acetum adstringenti uipræditum esse negant, inter quos reperio Ioannem Farnelium uirum quidem ætatis nostræ clarissimum, medicumque insignem; quippe qui uniuersam medicinam diuina sane oratione

B 2 descripsit

De Facultatibus

descripsit. Etenim is lib. quarto cap. tertio methodi medendi de saporibus scribens, sic de aceto differuit. Acetū sic experimur fluxiones repellere, & omnem sanguinis è naribus eruptionem, atque dysenteriam, tum uapore suscitato, tum etiam, fotu cohibere, ipsasque hemorrhoidas, & immodicas uteri purgationes suffitu infestūq; sistere, omnemque sanguinis reiectionem, potum uel per se, uel admista aqua, proptissimè cohibere, neque idcirco est inter adstringentia numerandum. Longè enim ab his materia distat, sed unius frigoris alte subeuntis beneficio, fluxiones repellit, siccitate uerò, quæ planè ualida est, eas atque sanguinis eruptiones sistit ac cohibet. hæc ille. Quibus manifestè refragatur Galenus, quippe qui acetū adstringenti ui esse præditum; pluribus in locis testatur. Siquidem lib. primo de alimentorum facultatibus in ipsa primū præfatione sic habet, sin minus uis aluum subducere lentem excorticatam bis decoquito in aqua, uidelicet priore effusa, dein salis, aut gari portiuncula addita, aliquid eorum quæ aluum modicè sistunt, iniicito, puta acetum, ea mensura, ut gustum non offendat. Quin etiam idem quoque affirmat libro primo c. uigesimo de simp. med. facult.

facult. Vbi acetum (inquit) haud perinde, ut crustam facientia medicamenta, sed potius, ut adstringentia, citra crustam sanguinis fluores cohibet. Id quod item falsus est apertissimè libro sexto c. primo de comp. med. sec. locos, ubi stomatica pharmaca citra succos composita ex aceto & gallis ex Andromacho describit. Inquit enim conspicuum uero est generosum esse hoc pharmacum ex contrariis compositum, Gallę enim, & Rhus magis, adstringētia sunt, & maximè repellūt. Quibus palam est clarissimum uirum Farnelium à Galeni sententia non parum ab errare, quin etiam ab ipsius Dioscoridis intentione. Si quidem is libro quinto de medica materia, acetum tum refrigerare, tum adstringere scribit. Id quod certissimum esse deprehenditur ex aceto ipso per alembicum distillato, quandoquidem ubi primum aquosa aceti pars quæ ex aceto prius destillare solet, ex uino uerò posterius, si quod remanserit in uase quod in fornace residet, gustaueris, manifestam adstrictionem per ceperis, ipsamq; non modicā. Quo fit ut à Galeni & Dioscoridis sententia haud tantillum quidem mihi discendendum fuerit.

De Facultatibus

De falso sapore. Cap. 5.

Salsus sapor in mediocri materia cō-
sistit, cum calore & siccitate. Aqueę
n. materie (quę non exquisite simplex
est) partes quasdam terrenas permi-
stas, calor externus tandem præassans,
& urens, atque ficcans, falsum saporē
inducit, fitque à terreno sicco, quod
in aqueo humido caloris ui præassatū
attenuatumque est: Neque igitur pror-
sum terrenus, neque aqueus, sed ex am-
borum permissione, quādam materie
mediocritatem sortitur. Neque si ex
calore processit, hic tutus manet, sed
permissione obtunditur, siccitas uerò
maior conquiritur ac persistit. Propin-
quus præterea est falsus sapor amaro,
quippe terreni ambo sunt, & calidi,
non obscura tamen diuersitate dissi-
dent. quòd uidelicet amarus à calore
arido plus sit extenuatus, & elabora-
tus. Nam si quid falsum excalfeceris
plurimum amarius tibi facile euadet,
ut mari Syrię Palestinę, quod mor-
tuum uocant, à solis ardore æstate ma-
gis, quàm hyemę compertum est eue-
nire. Salsa præter id, etsi calida sint,
non tamen ita uelociter, ut acuta pe-
netrant, cum calida non ignea, ut acu-
ta sint, neque adeo crassa sunt, ut nisi
longa

4. de f.
me. f. c.
20. 21.

Lib. de
ocul. c.
2. part.
5.

longa mora penetrare queant, quem-
admodū acerba, & austerā calida qui-
dem & terrestria sunt, sed minus quā
amara. Quin etiam acris magis sic-
cant, quanquam illis non similiter,
sed minus calefaciunt. Incidunt etiam
quæ saporem quendam habent nitro-
sum aut salsum, quorum etiā plurima
alium deliciunt. Itaque cum concula-
rum maris, cæterorumque ferè ofireo-
rum succus falsus existat, uentrem sol-
uendi uim obtinet. In summa, quæ sal-
so sapore sunt incidunt, tergunt, te-
nuant, liquant, à putredine uindicāt,
conturbant, uentriculum subuertunt,
& ad uomitum impellunt, siccant, si-
tim excitant, exasperant, aperiunt, &
abradendo expurgant, & hæc omnia
imbecilliter ac tarde efficiunt. Ac ob
hæc suamque modicam substantiam
omnia imbecilliter & tardè soluen-
tia roborant.

*Lib. de
uic. rat.*

*in mor-
bis acu.*

*com. 4.
de atte.*

*uic. rat.
cap. 3.*

*3. de f.
m. f. c. 5*

Mesue.

De dulci sapore. Cap. 6.

Dulcis Sapor suauis cū sit, ac per-
iucundus, maximè gustantes oble-
stat, nullaq; qualitatis exuperantia mo-
lestus est, uerū ubi iecur malè affici-
tur, usui haud quaquam conuenit. Lie-
ni præterea si phlegmone obsideatur,
pariter molestus est, atque multò ma-

*Lib. de
uic. rat.*

*in mor.
acut.*

com. 3.

B 4 gis

De Facultatibus

gis uentriculo, & intestinis. Nam cito ignescens, ob phlegmones caliditatem, facillimè in bilem conuertitur: Melle quidem delectantur tum uiscera, tum uenter. Melli quoque & dulcia alia idem habere quis dixerit, atque ideo, ut ad uentrem ita ad uiscera accommodari. uenter cutem his oblectari uidetur, nempe ubi ea deglutiuit, manifestè quodammodo ab assumptis delectatur, ueluti è contrario ab asperantibus, amarisq; offenditur, neque solùm cum assumuntur, uerum quoque & ubi assumpta sunt ad aliquod usq; tempus, quo fit, ut nemo ea nisi interdum uice medicamenti, ut ob collectos præter naturam in uentre humores, ingerat. Vbi enim secundum naturam habuerit, iniucunda ipsa talia omnia sunt: iucunda autem sola, quæ dulcia existunt. Sanè in appellato gutture maxima ex deuoratis dulcibus exoritur uoluptas, corpore scilicet loci illius peculiare quidpiam cum succo huiusmodi habente. Corpus hoc facit uentriculi interna tunica, ut & ea, quæ linguam ambit, uerùm in lingua euidentissimam habet dulcedinis sensationem, in gutture autem uoluptatis. Sensio uerò manifesta continuò efficitur & in uentris ore, quod dulcibus assumptis delectatur, modo animans secundum

dum naturam habuerit. Viscera igitur hoc pacto dulci gaudere succo, plurimumq; ipsius celeriter euocātia, cum ualent, frui, aliq; , cum uerò febriunt, aut phlegmone obsidētur, in id quod biliosum est, dulcem succum conuerti par est. Calidum præterea dulce omne est, nec immodicè calorem nostrum exuperat, imò sicut aqua calida, cuius contactus uoluptati est, maximè ubi frixerimus, hætenus uidelicet non ex calfaciens, dum concretas frigore in nobis particulas fundat, non tamen soluat, aut secet, distrahatūe continuum, ea inquam ut summa afficit uoluptate, ac utilissima est, sic omne edulium dulce calidum sanè omnino est, sed non tamen calore excedit, ut is lædat, ac molestus sit, sed inter limites se se continet fundentis, leuigantis, ac mollientis. Itaq; à temperato calore quamuis dulcedinem euenire minimè uerendum est: tam & si quò magis dulce fuerit eo ualentius exalfaciat. Minus etiam oportet, ut quæ uelut inungunt, atq; implent, ac in statum suum restituunt exasperatas partes, ac ueluti erosas linguæ particulas, hæc si cum uoluptate manifesta contingant dulcia, sin sint, pinguiā uocitantur. Porro & illud quidem non ignorandum quòd succus dulcis, cum sine acrimo-

4. de f.
m. f. c. 9

9. de f.
m. fac.
c. de ga
lactue
lapide.
1. de f.
me. f. c.
37.

B S nia,

De Facultatibus

nia, & crassitie, hoc est cum solus planè fuerit, celerius quantum in ipso est distribuitur. quòd si acrimoniam, & crassitiem habuerit, citius subducitur. Postremò quæ dulcia sunt excalfaciunt moderate, maturant, laxant, rarefaciunt abstergunt & digerunt.

De pingui sapore. Cap. 7.

Pinguis sapor à Theophrasto additus, nec calore nec acrimonia gustum sollicitat, sed linguam orisq; partes lentore quod am oblinat. Is præcipue animanduertitur in oleo, tū simplici, tum amygdalino dulci, tum quoq; in eo quod è pineis nucibus exprimitur: quin etiam in adipe, medulla, & in recenti butyro, quæ uetustate rancorem non contraxerunt. Pingui quoque sapore est Altheæ radix, ac psyllii aut malug, aut Cydoniorū seminum mucago, nā in aliis plerisq; tum adipibus tū oleis, ut in Ricino, Amygdalarū amararū, & unguetariæ Glandis, sub pingui sapore alii quoq; sapores existunt. At uerò ut non unus, simplexq; est eorum sapor; ita nec facultas, nec materia simplex est una. Nascitur pinguis sapor ex tenui non quidem ignea, sed planè aërea materia, quæ calore, & frigore quodammodo temperata sit, atque ea
licet

licet tenuis, sicca tamen non est; alio-
qui pingue perinde ac acidū & acre pe-
netraret, & incideret. At certe humo-
ris eiusq; aërei particeps magis est, ac
proinde præcipua uis eius atque fa-
cultas est relaxare, emollire, & hu-
mectare.

De insipido sapore. Cap. 8.

Insipidus proprie sapor nō est, quod
qualitate nulla gustum feriat. Hu-
iusmodi esse uidetur cucurbita, cucu-
mis, quibus & alia plurima finitima
sunt. horum sanè materia, quan-
quam crassa quodammodo est, non
ob id tamen terrena siccans adstrin-
gens fuerit, sed humore quodam etiā
perfusa, qui tamen non exquisitè sicco
permiscetur ui caloris, & cū neque
ipsius frigoris uis superet, accidit ne-
cessario, ut nullus gustu sapor, nulla ef-
fectu qualitas, aut facultas percipia-
tur. At nihilominus hæc eorum mate-
ria quoniam uere emplastica est, mea-
tus omnes, & intus, & foris infarcit, &
obstruit, exasperata lenit, & soluta ag-
glutinat. Quanquam autem sapor hic
dulci affinis est, distat tamen, quod in
paulo crassiore, atq; crudiore sit mate-
ria, & à temperie aliquantum in extre-
mum frigidius deuerget: dulcis uerò
B 6 sapor

2. de
alim. fa-
cult

De Facultatibus

sapor in calidius. Moderato enim, ac miti calore bene concoquente, plurima dulcescunt, ut fructus. Atq; etiam in dulci non nihil inesse caloris argumento est, quòd dulcia non pauca, ut mel, uetustate aut coctura amarescunt.

Hi sunt igitur saporibus simplices omnes atq; synceri: In quibus dignoscendis seorsum nos exercitari oportet. Ex sapore autem, quæ medicamenti temperatura, & quæ materia sit, cognoscitur. Ex his demum quibus id tum primis, tum secundis qualitatibus ac uiribus sit præditum.

De saporibus compositis. Cap. 9.

Quibus uero simplicibus medicamenti uarii inesse saporibusprehenduntur, ut (exempli causa) in absinthio, quod præter amarorem qui primus est obuius, adstrictionem quoq; habere percipitur, diuersæ quoque substantiæ, atq; facultates, ut adstringendi & detergendi, seu corroborandi in sunt: E contrario quoq; si cui medicamentum, ut Cichorio facultates inerunt uariæ, ut detergendi, & refrigerandi, ex uariis id quoq; & fere contrariis substantiis, à saporibus constabit. Itaq; à sapore siue simplex is est, siue multiplex

plex, de materia deq; facultate medica
menti iudicari potest. Id autem facile
aut certò fiet, si simplex aut exquisitus
sapor erit. At rarò admodum purus
syncerusq; , & solitarius inuenitur. In
quibus igitur sapor non certo poterit
medicamenti uim, atq; facultatē expri
mere, experiētia succurrit ac supplet;
atq; etiā si gustu, aut ratione uideberis
facultatem assequutus, ea tamen expe
rimiento identidem confirma. Multa
enim plerunq; solitaria meditatio, &
probabilis ratio suadet; quæ usus, & ex
perientia coarguit. At ne te fallax ex
perientia decipiat, etiam atq; etiam
caue ne effectum, qui per accidens à
medicamento processit, primum, &
per se editum esse iudices. Quā obrem
simplex quodque medicamentum se
pius quisque contempletur admoneo,
quò memoria teneat, quantum, quod
que dulcedinis, aut acrimoniæ, aut ali
cuius sensibilis qualitatē habere pos
sit. Neque enim qualitatū gradus
uerbis ullis explicari queunt. Accedit
præterea, & aliud quoddam iudicii ge
nus, quo uis uniuscuiusq; medicamen
ti perpenditur, longa experientia
comparatum, quod quidem tatione de
clarari non potest.

1. de
Antid.
cap. 2.

Simplex

De Facultatibus

Simplex medicamentum quo pacto intelligitur. Ca. 10.

- 1. de f. m. f. c. 1** Simplex medicamentum, & ipsum per oppositionem ad compositum nuncupatum est. Est autem id quod secundum naturam suam syncerum est. At facultas causa quædā est effectrix, quæ quidem prouenit partim à primis qualitatibus, partim ab ipsius essentiae tenuitate crassitieue, partim ab utrisque. Eaqu; partim actu, siue energia est, partim in futuro tēpore. Actu quidem, ut calfaciendi in igne, refrigerandi in glacie. In futuro autem; ut calfaciendi in pyrethro, pipere, & similibus. Refrigerandi in alterco, mandragora, & papaueris liquore, & id genus ceteris. Est autem perspicuum & illud, nempe omnia propemodum medicamenta, licet sensu simplicia appareant, constat tamen natura esse composita: quin etiam subinde quoque non nullas diuersissimas in se continere facultates: nempe excernendi & sistendi, in crassandi, & extenuandi, rarefaciendi, & condensandi, illinendi atq; abstergerendi, tendendi & laxandi, ceterasqu; oppositiones uniuersas. At mirum id uideri minime debet in id genus facultatibus cum uni & eidem medicamento uim calfaciendi & refrigerandi inesse

esse appareat, aut exiccandi & hume-
ctandi, aut tenuium partium, & crassa-
rum. quippe nisi primæ, efficacissime-
que uirtutes hoc pacto complicaren-
tur, haud sanè quæ ex illis sequuntur
similiter complicatæ forent. Igitur
quemadmodum in medicamentis cō-
positis mirum non est, si contrarii si-
mul affectus corporibus infligantur,
ita neque in simplicibus, cum & ipsa
sensu quidē omni, atq; cognitione sim-
plicia appareant, natura uero sint, com-
posita. Quinetiam quemadmodum in
iis, quæ nos componimus aut commi-
scemus, interim, si ita uisum est, plus
adstringentis succi indimus, aut plus
dulcis, aut amari, aut salsi, aut acris,
aut alterius cuiuspiam contrariorum,
nonnunquam uero utrosque partibus
paribus, aut portionibus, aut uiribus,
alienum non est. Itaque ex his conii-
ci licet pleraque simplicium medicamē-
torum dissimilariū esse partium, re-
que uera composita. Cæterum appella-
ri simplicia, quòd cuiusmodi sunt ta-
lia natura sint, nec quicquam ex no-
stra industria assumpserint, quin &
quod quædam crassarum sint partium
& terrena suis substantiis, quædam te-
nuia & aerea, & dictorum media. At-
qui meminisse quoque oportet medi-
camentum omne id appellari, quod na-
turam

3. de f.
m. f. c.
16.

5. de f.
m. f. c.
31.

1. de f.
m. f. c.
1.

De Facultatibus

Medi- turam nostram altera, aut mutare
camēta potest, & nutrimento planè contrariū
quæ to- est, nec aliter inter se differunt medi-
ta sub camenta, quàm sola alterationis uarie-
stantia tate, quippe quædam una, uel duabus
operan qualitatibus naturam nostram alte-
tur. rant, quædam tota substantia. Eorum

uero, quæ una uel duabus qualitatibus nos mutant, bifariam diuidunt, Est enim una medicamentorū species, eorum nimirum, quæ corpus excalfaciūt, aut refrigerant, aut siccant, aut humectant, mali tamen nihil afferunt.

Altera eorum species est, quæ & agunt & patiuntur aliquid, sed temporis spatio uincuntur, planèque assimulantur, adeo ut tam nutrimenta, quàm medicamenta existant. Sunt & alia quæ tota substantia nos alterant. Horum ueluti illorum duplex est natura, Quippe quoniam prior eorum species est, quæ nulla substantiæ suæ mutata parte, sed tota integra seruata uincunt, corpusque ipsum afficiunt ac mutant ad eum modum, quo id cibos mutat: atque hæc prorsus graua, & quæ animalis naturam corrumpere queunt.

Ideoquæ Græcis deleteria, hoc est uenosa, lethiferaquæ uocantur. Ex hoc genere habentur, quæ sua exuperanti frigiditate perimūt, ut cicuta, hyoscyamus, meconium, mandragora, & id
genus

genus alia : atque hæc non toto sanè genere humanæ naturæ mortifera pronuntiantur, sed ubi eorum quantitas exuperabit; nanque horum quodque, si exigua quantitate deuoretur, nullâ prorsus euidentem noxam nobis affert, non secus ac si ingenti flammæ pauxillum aquæ instillaueris, neque utique eò minus deleteria sunt appellanda. Altera eorum medicamento- rum, quæ nos tota substantia alterât, species est, quæ ubi mutationis principium ab animalis calore acceperit, deinceps iam putrescunt, & corrumpuntur; deinde ipsum corpus una corrumpunt, ac putrefaciunt. Eiusmodi quidem sunt, quæ erodendo putrefaciendoque interimunt medicamenta, ut cantharides, arsenicum, chrysocola, aconitum, & similia. Sunt autem hæc deleteria, & perniciofa toto quidem genere, non ut frigefacientia duntaxat quantitate. Putrefacientia enim etiam si minima quantitate sumantur omnino tamen corrumpunt, nisi unâ cum excrementis excernantur, prius quàm iniuria corpus afficiant, aut cibis, aut aliis, quæ uires eorundem obtundant, mista fuerint. Sunt & medicamenta ex hoc genere, quæ quanquã inter uenena numerantur, non tamen interficiunt, nisi modum excesserint, siue

2. apho-
rismo -
rum, a-
pho. 17

3. de f.
m. f. c.
18.

De Facultatibus

siue fortè fortuna in corruptionem
uertantur. Cuiusmodi sunt medica-
menta omnia, quæ humores attrahunt
atque electiue purgant. nempe scamo-
nium, Elleborus, Colocynthis, Elate-
rium, Vitis alba, Cyclaminus, Tithy-
malorum omne genus, Thapsia, Turpe-
tum, pityusa, Ricinus & alia nonnulla
quæ prædictis de causis pharmaca, anti-
quis sunt appellata. At qui meminisse
præstabit hæc non solum tota sua sub-
stantia, atque forma operari, sed etiã
qualitatibus primis iuuantibus. Siqui-
dem quanuis hoc bilem, illud pituitã
atram bilemue deicere propria facul-
tate ualeant, cum tamen omnia sint
calida, sui ipsorum caloris ui adiuta,
hunc, uel illum humorem facilius
trahunt. Sunt enim medicamenta pur-
gantia detrahendis humoribus fami-
liaria, uerum cum sint in attrahendo
efficaciora, ualentioraque, humores
ipsos attrahunt, non autem attrahun-
tur ab illis. Id quod facile in lapide
magnete spectari potest. quippe qui
ad ferri naturam accedat, & in ferri fo-
dinis reperiatur, eique magnopere spe-
cie sit persimilis; uerum fortior est
quodãmodo, ut attrahere sit aptior,
quàm attrahi. Quin etiam Cnicum
quoque à pituitæ natura alienum esse
haud diffidendum est; uti in colore suo
præse-

3. de f.
m. f. ca.
25.

præferret, sed tamen calore ipso pituita ualentior est, ut trahere, quā trahi magis par sit. Calida enim ut sint id genus omnia necesse est: Nam inter ea, quæ sibi substantiis similia sunt, quod calidius est id potentius trahit, utpote quod essentie similitudine calorem adiunxerit. Ceterum huiusce generis medicamenta, ubi fortè purgatione frustrantur, extra quàm quod corpori noxam afferunt, etiam alimentum homini præbent, alia uerò in corruptionem, ac tanquam in uenenum uertuntur. Prorsum enim medicamentum expurgans, uel cum uno saltem humorum, qui in corpore sunt nostro similitudinem obtinet, non autem perpetuo permista est uis uenenosa, quam obrem, nec perpetuo, licet non purget iniuria afficiet, uerùm coctionem accipiet, talemque producet humorem qualem trahere natum erat. At hæc autem numerantur in hoc genere alia nonnulla medicamenta, quæ tametsi humores trahant eiiciantque innocua tamen sunt, nisi sumentes modum excesserint. Nam quanuis quandoque fiat, ut humorum nihil educant, nunquam tamen in corruptionem & ueneni naturam trahuntur. Quo fit, ut à recentioribus Medicis hæc innocua appellentur. Ex huiusmodi itaque genere

3. de s.
m. f. c.
23. lib.
de Th.
ad Pis.
cap. 4.
lib. de
his quos
purga-
re con-
ueniet.

De Facultatibus

nere sunt Manna, Cassia nigra, Myrobalananorum omne genus, Tamar Indi, Rhabarbarum, Agaricus, Rosa, uiola purpurea, fumaria, Epithymum, Polypodium, Sena, Aloë, & id genus alia. Non desunt quoque & alia ab his longe diuersa, quę etiam tota sua substantia suas exercent uires, uerū haud quaquam humores purgant. Sed uariis admodum modis nostris in corporibus agunt. Aliqua enim uenenosa cū sint, suum tamen uenenum superant, ac destruant, alia corpori uniuerso medentur, nonnulla uero, particulatim iuuant aut lædunt. Suis itaque ac propriis uenenis succurrunt, uipera, scorpius, Mus araneus, Draco marinus, quippe hæc omnia dissecata, & suis moribus adalligata, uenenum ad se trahunt, & demorsos sanant. Cantharides peculiariter solam uesicam lædunt, lepus marinus solos pulmones inficit. Cicuta homines necat, sturnos nutrit, ueratrum homines in perniciē ducit, conturnicibus uerò optimus est cibus. Amygdalę amarę pluribus modis nos iuuant, ceterū gallinas, & uulpes necant. Romanę pęonię radix collo suspensa Epilepticos iuuat, caninū Stercus anginis medetur. Lupinum uerò colicos sanat. Sicq; mergi ueter uentriculū nostrum roborat. Iaspis lapis uiridis

uiridis, qui os uentriculi contigerit, ipsum pariter firmat. Lapinum Iecur Iocinorosis medetur, terreni uermes auriginosos sanant. Sicque alia complura habentur, quę hęc, & similia tota sua substantia operantur, quorum facultates, cum à methodo, & ratione alienę sunt, per solam noscuntur experientiam. Nam cur hic lapis tacto vulnere unde sanguis prorumpit cursum eius reprimat ac sistat, curque scamonium bilem, Cnidium granum cutem subeuntes aquas deiciat nobis sanè occultum est, & sola experientia comparantur.

9. de s.
f. m. c.
de lap.
dibus.

13. Ma
th. c. 6.

De primis, secundis, & tertijs facultatibus. Cap. 11.

Medicamentorum qualitates, alię quidem primę, alię secundę, alię denique tertię numerantur, atque eas quę primę dicuntur, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, siccitatem nuncupant, & hę quidem in elementis, nempe Igne, Aere, Aqua, Terra syncerissimę habentur. Itaque certo pronuntiandum quatuor hęc omnia esse communia & prima elemēta. Namq; prima sunt hęc in mūdo simplicissima corpora, cętera uerò, nēpe plantę & animalia ex istis componuntur.

Lib. 1.
de ele-
ment.
c. 1.

De Facultatibus

7. de f. tur. Quamobrem hinc omnis mem-
m. f. c. bratim medicamentorum in agendo
I. prouenit diuersitas quod haftenus eo-
rum unūquodq; aut calidū est, aut frigi-
dū, aut siccum, aut humidū, aut tenniū
partium, aut crassarum. SECVN-

5 de f. DAE autē à primis ortū ducunt. Cate-
m. f. c. 2 rùm cū particulatim unumquodq; nō
pari modo ex illis temperatū sit, aliud
puto ex illis laxatiuum euasit, aliud
emolliens, aliud indurans, aut rarefa-
cines, aut condensans, tum ex operibus
quæ edere nata sunt, facultates in se
habere dicta sunt rarefaciendi, conden-
sandi, emolliendi, indurandi, illinen-
di, extergendi, attrahendi, repellen-
di, laxandi, contendendi, reseruandi,
concludendi, incrassandi, extenuandi,
doloris sedandi, ac ciendi, concoquen-
di, pus mouendi, digerendi per hali-
tum, putrefaciendi, urendi, erodendi,
crustam faciēdi, fundendi, dēfandi, suc-
cum prauum procreandi, attemperan-
di, purgandi, sistendi, exasperandi, le-
niendi, infarciendi, fārctūque liberan-
di. TERTIAE uerò qualitates dicū-
tur, quibus medicamenta licet prima-
rum & secundarum ope agant, in pro-
prium tamen aliquod membrum, aut
proprium humorem agunt, atque hæ
particulares dicuntur qualitates: nem-
pe urinas ciendi, uomitus prouocan-
di

di, uentris subducendi, lubricandi, per
nares, & os purgandi, menses mouen
di, aut comprimendi, lactis, & semi
nis tum generandi, tum extinguendi,
tum prouocandi, & reprimendi, ma
gisque etiam cum à capite cephalicas,
ab oculis ophthalmicas, ab auribus
oticas, à dentibus odenticas, à uentri
culo stomachicas, à pulmone pneuma
ticas, à costis pleuríticas, à Iocinore
hepaticas, à Liene splenicas, à renibus
nephriticas, à coxa ischiadicas, à pe
dibus podagricas, ab articulis arthri
ticas, à tussi bechicas, à calculis com
minuendis lithonhypticas uocant.

Pari modo quædam dicta est sarcotica
facultas à procreanda in ulceribus car
ne, ab inducenda cicatrice epulotica,
à glutinando collectica, à purgatione
cathartica, ab excrementia carnis de
trahenda cathēretica, & alia similia,
quæ omnes uix particulatim numera
ri possunt, si ab uno quoque singula
tim eorum quæ perficiuntur deflexa il
lis imponere nomina aggrediamur.

Quid agant quæ subtilium sunt
partium, quæve crassa
rum. Cap. 12.

Medicamenta tenuium partium,
quin etiam crassarum alia calida,
alia

De Facultatibus

- 4. de f.** alia frigida . Quæ autem calida sunt
m. f. c. subtilium partium nonnunquam om-
f. c. 2. nino non mordicant, sed duntaxat cal-
 faciunt, quòd etsi quandoque mordēt
 non tamen urunt, calida uerò crassa-
 rum partium mordent acrius ac uelli-
 cant, urunt atque ulcerant. Cæterum
 frigida, quæ tenuium sunt partium, cū
 magis in profundum transeant, uehe-
 mentius etiam ob id mordicant, sed
 multo etiam magis, quæ cū tenuiū
 sint partium, inequabilem obtinent
4. de f. intemperiem. Quæ uero crassioris
m. f. c. sunt essentiæ, omnino, nullum intro-
3. ducere humorem queunt. Cutis enim
 superficiem non lubeunt, proinde nō
 mordent, neque uellicant. At tenuiū
 partium aer est, crassarum uero terra,
 medium eorum tenet aqua . Aer autē
 accensus fit flamma, terra uero pruna,
 uerū aqua uehementem sanè calidi-
 tatem accipit, sed nec flamma, nec pru-
 na propter innatam humiditatem effi-
 citur . Si quidem flamma & pruna
 ignis sunt genera. Ignis autem omnis
 calidus est, & siccus, at aqua sicca ut
 fit fieri nequit, proinde nec ipsius ignis
 qualitatem exactè, sicut aer, & terra
 accipit . Nullum est itaque æque cali-
 dum medicamentum ut aut est flāma,
 aut pruna, aut aqua feruens, imo, ut sit
 uel calidissimum, omnino tamen plu-
 rimum

rimum ab illis uincitur: procedit tamen ad uersionem usque medicamentorum caliditas, ubi uidelicet in crassa consistit essentia. Ceterum ea tenuium partium esse dicimus, quæ celeriter in tenuia soluuntur. Id quod perpeti nequeunt crassarum. Quod ergo ea soluantur, calor qui est in animalis corpore, cui unumquodque applicari contingit, in causa est. Quod autem in tenues crassasue partes comminuantur, id à sua ipsorum natura obtinent. Præterea medicamentum quod tenuis est materiæ, si pariter calidum est citra ordinem tertium, ut petroselinum, & hyssopus, sumptum quidem corporis meatus exiguos aperit, & humores tenues dissoluit, dissipat, seu halitu digerit, hincque sudores, & urinam mouet, crassos uerò incidit, attenuat, seu comminuit, foris autem impositum cutem rarefacit, & dilatat, ex alto quoque corpore spiritus, humoresque trahit, atque resoluit, At si etiã quarto est calidorum recessu, septicũ habetur, quod nimirum aut urit, ulcerat, aut uescicas excitat, aut colliquat. Quod uero tenuis est materiæ, si temperatum, aut etiam si pariter id frigidum existit, ut acētum, intro sumptũ aperit quoque & attenuat, sed ignauius, quàm calidum aut foris inductũ

C corpo-

De Facultatibus

corpori, quatenus frigidum est fluxionem repellit, & eruptionis impetum cohibet. Idque ualidius, quam quod frigidum adstringensque est. altius enim frigoris uim deducit. Quod uero cum media materia frigidum quoque existit, ut portulaca, modice fluxionem repellit, ac sistit, siccatur, & adstringit. Ceterum medicamentum medio cras materie, quod una temperatum fuerit, ut oleum simplex, relaxat, emolliat scirrhus, concoquit, maturat atque pus mouet. At moderate calidum, ut chamæmalum, quia dolorem lenit, a nodinum appellatur. Quod paulo calidius sed citra tertium est ordinem, ut absinthium, sumptum quidem aperit ora uasorum glutinososque detergit humores, ac proinde uenas, meatusque omnes expurgat, & eorum obstructions expedit, quod tenuior materia, quia celerius & sine deterfione penetrat, non effecerit. Quod item tertium caloris recessum superat, ut colocynthis, aristolochia, non solum detergit, sed etiam quia acrius, partes ipsas uehementer exasperat, & exulcerat. Medicamentum item, quod in crassa, terrenaque materia temperiem quandam caloris frigorisque natum sit, ut bolus Armenus, aut lemnia terra, interiores meatus obstruit cutem-

cutemque obturat, exasperata lenit & soluta agglutinat, infarciens enim est aut emplasticum, aut leuigans aut etiā glutinosum: Quod autem moderatē seu calidum, seu frigidum existit, ut rosa, ut myrtus; laxiores partes contendit, atq; idcirco corroborat. At immoderatiū uelut ordine quarto calidum, ut calx, ut auripigmentum, exedit, estq; septicum, causticum, uel escharoticum. Immoderatiū uerò frigidum, atq; siccum, ut galla, & nuxcupressi, ora uasorum sumptum non modo obstruit, uerū etiam contrahit, & occludit, meatus omnes coarctat, seu coangustat, ipsos uero humores supra modum incrassat. Foris impositum cutem densat, & adstringit, fluxionis impetum cohibet, ac etiam repellit, & uulnus cicatrice obducit. Ita igitur facultates secundas ex medicamento materia temperamento perfula prodire, quibus intelligere potest: Porro medicamentorum facultates iudicandæ sunt ad nostram naturam, hoc est ad hominis nō extra hominem, ad aliud, quod uis collata, & unū quodq; medicamentum considerandum est non quale ex se sit, & ad totam naturam, sed quo pacto nos afficiat: Nam acetum & aqua marina, si ex se iudicentur, humida esse deprehenduntur ad 38.

I. de f.

m. f. c.

C 2 nostram

De Facultatibus

nostram autem naturam collata, sicca
proculdubio iudicabuntur.

Noscendum quantum unum-
quodque medicamentum ha-
beat caliditatis, frigiditatis,
siccitatis, humiditatis per gra-
dus usque ad quartum. Ca. 12.

VIres Medicamentorum, non so-
lùm cuiusq; generatim noscendæ
sunt (ut quidam scripserunt, dicentes
cas calfacere uel refrigerare uel sicca-
re uel humectare) uerùm distinctè
membratimq; ex quo sint ordine, pri-
mo uidelicet, aut secundo, aut tertio,
aut quarto cognoscere oportet. Nam
non nulla quidem medicamenta ob-
scure prorsus unumquodq; prædicto-
rum efficiunt, quædam manifestò, ali-
qua ualidè, alia absolutè. Non satis est
ergo nouisse pharmacum hoc calefa-
ciendi, aut refrigerandi uirtutem habe-
re, sed quantam habeat diffinire oportet.
Siquidem tanto medicamen expe-
dit esse calidius, quanto exuperauit fri-
giditas; tantoq; siccius, quanto, & uicit
humiditas. Calefaciunt enim (exmpli
causa) resinæ omnes, idq; sibi commu-
ne habent, attamen maioris, mino-
risq; rationem non exiguam in calo-
re

*I. de
me. sec.
gē. c. 20*

*5. de f.
m. f. c. 5.*

*I. de
cōp. me.
sec. gen.
cap. 20.*

re fortite sunt. Item succi plures non mediocriter ratione ad maius, minusque facta, differentes, excalfaciunt. Nā panacis succum cyreneo, & Medico, si conferas, uidebitur tibi hic nihil ceu ad illos esse. At quorsum attinet sermonem ipsorum diuertere longius, cum eorum differentia quibus in cibo utimur, quotidie possimus meminisse. Anethum igitur, & ruta, cæpaq; omnia calefacientia, magno inter se uariant discrimine, qua propter in curationibus quoq; particule admodum refrigeratæ, medicamen, quod impensè calefaciat applicabimus. Illi uerò quod paululū à naturali habitu recessit, modico calore præditum: sicut & insigniter refrigeratæ uehementissimè calefaciēs adhibebitur. Meritò igitur quatuor nos excalfacientium ordines statuimus, separantes à modicè calidis ea, quæ euidenti eiusmodi qualitate præcellunt, tum quæ magna, tum quæ uehementi adeo, ut urere uideantur. In singulis autem illis quatuor ordinibus diuersis, quædam esse uelut incipientes differentiæ, non nulla desinentis, & ei quæ post hac existit propinquæ; alia in medio cōstituta. Itaq; sunt ex iis, quæ propter caloris uim exulcerent, quemadmodum etiam ex illis, quæ septica, idest exedentia, seu putrifi

De Facultatibus

ca nominantur: Alia simulatq; corpora contigerint, potestatem suam ostendunt: quedam duabus, tribusue, aut quatuor horis opus habent, non nulla diem totum; uel etiam post eum noctem, uel maius dein spatium requirunt. Hæ iam, ut in calefacientibus, ita quoque in refrigerantibus intelligere eum oportet, qui medicamen aliquod confecturus est. Pari modo, & in eis, quæ humectant siccantq;.

An rationi magis, quàm experimento adstipulandum.

Cap. 14.

6. de
sanit.
tuend.
c. 14.
2. meth.
cap. 6.
De The.
ad Pis.
cap. 30.

Medicamentorum omnium notitia duobus artis medicæ fundamentis consequitur, nempe ratione, & experimento. Atqui sine experimento eorum uires haud rectè cognosci possunt, nanque plerumq; illud dicat ratio, cui non astipulatur experimentum. Contra uerò id experimentum sepe ostendit, cui ratio non consentit. Hæc itaq; sunt utraque coniungenda quantum licet, & quæ ratione inuenta sunt, tum sensu tum experimento sunt probanda, atque eo quidem assentiente comprobanda. Contra item eorum, quæ experimento sunt inuenta, quærenda

renda ratio est, quā si assequamur, tunc
 idem nullo interiecto scrupulo, ex-
 tollendum medicamentum est; sin au-
 tem ratio subterfugiat, aut etiam relu-
 ctetur, suspectum sanè id redditur, at
 non semper negligendum; siquidem *1. meta*
 Aristoteles expertos magis id, quod *phy.ca.*
 uolunt consequi existimat, licet ratio- *1.*
 nem ignorent, quā eos, qui ratio-
 nem quidem rei tenent, sed inexperti
 sunt. Quin etiam Galenus Empiricos *3. de lo.*
 magis, quā methodicos probat. Et si *aff. c. 2.*
 enim qui soli nituntur rationi sapien-
 tiores sunt, (ut idem sentit Aristote- *1. Ph-*
 les) in medicina tamen, quæ circa singu- *ficorū.*
 laria uersatur, errant magis, qui ra-
 tionem absque experientia quā qui
 experientiam sine ratione perspectam
 habent. At uerò experimēti certitudo,
 non statim ex uno successu iudicanda
 est, sed obseruanda sunt multa. Atque
 iis demum diligenter animaduersis
 de experimento, quod certum sit, &
 constans, ferri iudicium oportet.

De uaria parandorum medica- mentorum ratione. Cap. 15.

Cum simplicia medicamenta, de qui-
 bus meminimus ad morbos pellen-
 dos uariis sub formis, & modis parari
 soleant, siue intus in corpus sumantur,

C 4 siue

De Facultatibus

siue extra admoucantur mihi quidem de his non abs re differe uisum est, nēpe de Elixatione, Maceratione, Destillatione, Liquatione, Dissolutione, Assatione, Vstione, Lotione, & Attritione. Siquidem præter id, quod non desint affecti, quibus hæc magis, quàm illa placeant, parandi ratio, sunt quoq; aliæ, quæ ad affectos locos, non nullæ uerò ad ipsos morbos commodiores habentur. Ceterùm de elixatione in primis mihi dicendum proposui, quòd hæc frequentius in medicamentorum usum usurpetur, quàm quæ aliis parantur modis.

De elixatione. Cap. 16.

Purimum sanè refert ueram elixationum simplicium non ignorare rationem: Nanque ubi quispiam id ignorauerit, haud unquam poterit rectè integras medicamentorum iures in suo ipsorum decocto asseruare. Si quis enim, lignum, cortices, radices, femenue breui tempore coxerit, quòd in solida materia horum uis consistat nullo sanè pacto hæc suas facultates integras in ipso, quo decoquantur iure deponent: contra uero uires, quæ tenui, ac dissipabili substantia consistunt, ut longa coctura euanescent, ita breui per

perbelle conseruantur. Itaque eorū,
quę coquuntur materia diligenter exa-
minanda est: crassa ne sit, an dura, cō-
pacta solida, sicca ue, ut lignorum, ra-
dicum siccarum, corticum, ac semi-
num, an tenuis imbecillis, & facile
resolubilis, ut adianthi, aspleni, epithy-
mi, senæ, rhabarbari, agarici, cuscute,
ocimi, myricę, thymi, uiolę pur-
pureę, croci, schænianthi, florumque
cum buglossi & nymphę tum etiam
ceterarum plantarum. Atqui memi-
nisse quoque oportet, odorata fere
omnia leuissima indigere coctione,
nam tametsi ligni cortex sit uulgare
cinnamomum, & zingiber, acorus,
iris, galanga, asarum, nardum, sint ra-
dices, cū tamen horum omnium uis
sit in suę ipsorum substantię tenuiori-
bus partibus, ubi coquantur plus quā
par sit facile dissipatur & perit, ac in
auram euanescit. Itaque cū plura
simul diuersarum substantiarum co-
quenda erunt, quę compactiora fue-
rint, & diuitius excoqui postulant, pri-
mò in tepidam aquam coniecta ali-
quandiu merceranda sunt, & deinde
coquenda. Hęc deinde consequi de-
bent, quę mediocriter, ac postremò,
quę leuiter coquenda ueniunt. nem-
pe primū ligna, deinde radices, se-
mina, lignorum cortices, denique her-
bas

De Facultatibus

bas, postremò flores, qui tamen macerari potius, quàm coqui debent. Cæterùm percocta omnia macerari oportet à coctione in suo ipso iure quousque egelida fuerint, demum ius lintheolo percolandum, atque in usum recondendum. Porro & illud haud ignorandum, scilicet quòd ubi herbæ, radicesq; recentes fuerint minus aquæ ad cocturam sumendum est, quàm ubi aride fuerint elixandæ. Cùm enim hæ duriores aridioresque sint, & diutius coqui postulent, humoris que non parum combibant, longè plus aquæ exposcunt, quàm quæ recentes sunt, & uirides. Præterea animaduertendum est ut uas (quod fictile potius, quàm æreum esse debere statuo) in quo medicamenta, & præsertim, quæ calidam possident qualitatem, ac tenuiorum sunt partium, perpetuo contactum sit cooperculo fornicato, seu concamerato, quod in fictilis os inferatur, namque uapor omnis, qui ex feruore sursum fertur fornicatum cooperculum petens in aquam conuertitur, quæ de inde inferuentem ollam guttatim stillat, ac recidit. Quo fit ut uapore concluso nulla uis deperdatur, quemadmodum deperdi solet in decoctis, seu apozematibus, quæ in publicis parantur myropoliis ubi cacabis ex crefabricatis

bricatis, nullo prorsus cooperculo
adhibito, hæc parari solent, magno
cùm medicorum tum ægrotantium de-
trimento, minimè qui ita parant con-
siderantes, quòd ubi calida, tenuium-
que partium simplicia coquuntur po-
tior eorum pars in auram deperditur.

Atqui interim dum hæc scribo Ioan-
nem Farnelium uirum per quàm do-
ctissimum, mirari subit, quippe qui
libro quarto cap. quarto & undecimo
meth. medendi in Ioannem bap-
tistam Montanum Veronensem medi-
cum omnibus numeris celeberrimum
his uerbis inuehitur. Non enim (ut
quidam prodidit) aqua simplex tan-
quam communis sit materia omniū
cum quibus permiscetur, cum cali-
dis calefacit, & cum frigidis refrige-
rat, neque si seorsim diutius coquatur
(quod ille putat) incalescit, sed fri-
gida semper tametsi minus, persi-
stet, ac perpetuò calidorum, & atte-
nuantium, quæ incoquuntur uim ob-
tundit, quin etiam coctio omnis eo-
rum quibus tenuis est materia uim
aut minuit, aut prorsus dissipat, cras-
sarum uerò ut metallorum adstrin-
gendi, siccandiq; facultatem auget. hæc
ille. Quæ quidem immensam Farnelii
in materia medica doctrinam, atq; ex-
perientiam ne per somnium quidem,

C 6 resipere

De Facultatibus

resipere videntur . Si quidem his aper-
tissimè refragatur Galenus . Quippe
qui libro primo , cap.4. de simpl. me-
fac. At si marinam aquam, inquit , aut
muriā , aut id genus aquam mistā,
bituminosā uidelicet, aut sulphuro-
sā admouēas, usque adeo hominem
offenderis, ut partem ipsam sis adustu-
rus , quibus palam est , quod aqua in
quam calida uenerunt medicamenta,
non solum excalfaciat igni non admo-
ta, sed etiam urat. Id quod etiam affir-
mat esse falsum , coctionem , quę in
aqua fit calidorum , & attenuantium
medicamentorum vires minimè re-
tundere, minuire, & prorsus dissipare.
Nāque si uerum id esset , aqua in qua
aut sal, aut calx , aut acerrimus ligno-
rum cinis , aut arsenicum, aut chalcari-
thum, aut argentum uiuum, quod of-
ficinę sublimatum uocant , incoctum
fuerit, particulis quibusuis corporis ad-
mota haud quaquā ea exulceraret: sed
cū se cus res se habeat, cadit , peritq;
(eius pace dixerim) Farnelii sentētia.
Quo fit ut asserere non dubitauerim
aquam omnino suam immutare natu-
ram, ubi cum uehementer calidis per-
mixta fuerit, quod iis superantibus fri-
giditatem amittat. Nam sicut ignis, cui
aqua admouetur eam adeo actu inca-
lescere facit, ut dum calens est , urat, &
exulceret

exulceret, ita & quę uehementer calida sunt medicamenta, aque incocta, aut macerata, sua quoque potentia calidam ipsam efficiunt. Sed hec est inter ignis & medicamentorum calorem differentia, quod ignei caloris uis, ubi aqua refrixerit, euanescat, medicamentorum uero contra, quod omnino sit inseparabilis, nec unquam deperdatur. Hincque fit ut tam calida, quam frigida admota aqua, in qua uehementer calida incocta sint, perpetuo exulceret, & urat. Ceterum quod aqua quę seorsim coquitur caliditatem haud parua acquirat (ut Montanus assererat) testatur Galenus lib. 3. cap. 22. de sim. me. fac. ubi sic habet. Aqua pura diutius seruescens, falsior redditur, nec mirum cum ipsa aqua optima diutius decocta falsam qualitatem tandem assumat. hec ille, quibus, cum falsus sapor omnium consensu ex calore, & siccitate proueniat, palam sane est aquam diutius coctam; calidam assecutam esse qualitatem. Itaque ex prescriptis concludendum est, calidorum medicamentorum uires, quę in aqua elixantur, haud quaquā obtundi, minui, aut prorsus dissipari, presertim cum sensibus manifeste pateat, aquam in qua alium, cępa, porrum, zingiber, piper, pyrethrum, Guaiacum lignum, non aliter

ter

De Facultatibus

ter dum potatur, fauces, & guttur uell
care ac urere, quàm si piper ipsum aut
zinigiber deglutiretur. Id quod pari-
ter accidet, ubi quispiam aquã potaue-
rit in qua amara medicamenta, nempe
lupini, gentiana, minus centaurium,
aut absinthium incocta fuerint. Quo-
fit ut non sit opus pluribus hæc com-
probare.

De infusione siue Maceratio- ne. Cap. 17.

DIximus de elixatione satis, nunc
uerò de infusione disseremus,
quæ quidem in medendis morbis ma-
gnam affert medicis commoditatem,
& præsertim ubi ægri aut morosi ad-
modum, aut delicatores fuerint, & soli-
da respuerint medicamenta. sed & il-
lud plurimi faciendum censeo, quòd
infusiones non solum integras medi-
camentorum uires asseruent, sed quòd
decoctis longe gratiores, præstantio-
resque habeantur, ubi recta parandi
ratione fiant. Præstat autem macera-
torum dilutum, longè magis, quàm
elixorum decoctum, quoniam exol-
uentium medicamentorum uires ua-
lentius in se recipiat, contra uerò de-
coctum, in eo sanè infusionem præcel-
lit, quòd eorum medicamentorum ui-

res

res quæ in crassa, & terrena substantia consistunt, longè melius extrahat, & excutiat. Quamobrem qui materiam medicam intelligunt, ea ferè semper macerant, quæ aluum ducunt, quòd eorum uis in tenui substantia residat. Deponunt enim huiusmodi medicamenta, in aquam, aut serum lactis, aut uinum, in quibus macerantur, per belle quidem uim suam omnem exoluentem, Id quod non paruo fit ægrotantium commodo. Namque sæpe accidere solet, ut qui, crassæ substantiæ portiones præ nausea ebibere, aut catapotia deuorare nequeunt, his maceratorum simplicium dilutis diligenter paratis ad parendum medicis alliciantur, & subinde absque ullo incommodo purgentur, quo postea fit, ut libentius iterum, atque iterum eiusmodi portiones hauriant, ubi cõtumax morbus uno tantum haustu euinci non potest. Dantur præterea hæc portiones securius, quàm quæ medicamentorum integram substantiam habent, quòd uentriculo, ac intestinis haud hæreant, tormina, & alia incommoda non excitent, & magis obstructos meatus aperiant, ac peruadant. Ceterum præter hæc est infusio admodum utilis ad olei genera ferè omnia paranda, quibus in myropoliis est usus, nam paucis

cis

De Facultatibus

cis omnino exceptis, quæ per alembicum destillari solent, ac etiam prælo exprimi, in oleo ipso plantarum folia aut flores, aut succi tam diu insolantur, aut in balneo calætis aquæ detinentur, quàm sat fuerit. Præterea non semper medicamenta infundimus, ut eorum vires in liquorem, in quo macerantur transferamus, sed etiam ut vires quæ in ipsum liquorem prius transfatæ sunt in aliud transferamus medicamentum. Siquidem hac ratione Aloë tum in aromatum, tum in Rhabarbari infusione, tum quoque in rosarum succo aliquando maceramus, quousque dilutum ipsum ita paratum combibat, cum uenter, aut caput, aut Iecur, catapotiis inde paratis iuuare cupimus. Quinetiam Turpetum in agrestis cucumeris succo aliquandiu macerandum relinquimus, ut adaucta purgatoria facultate, excrementitios humores à remotioribus corporis partibus ualentius educat, ac trahat. Præter id macerantur & quædam alia ad lésionem prohibendam, quam uentriulo & intestinis medicamenta quædam herendo inferunt. Itaque colocynthidis pulpam in tragacanthæ lachrymæ mucagine, atque scamonium in oleo uiolaceo macerari solent periti medici, ut adepta hoc pacto lubri-

ca

ca qualitate, facilius permeent. Hac etiam ratione, exuperantem acrimoniam exuunt chamelæa, thymelæa, & pithyusa, si prius aceto macerataificentur: Porro medicamenta, quæ maceranda sunt, & præsertim à quibus vires deiectionas elicere volumus, si arida fuerint, & humore destituta, ut senæ folia, uel siccæ radices, nempe rhabarbari, polypodii, aut asari in tenues particulas prius concidenda sunt & deinde in aqua uel lactis sero maceranda in fictili uase uitro ubique obducto atque circumlito, oris angusti, ut melius faciliusque occludi queat.

Itaque medicamentis (ut prædiximus paratis, in huiusmodi fictile coniectis aqua feruens superinfunditur, fictilisque osculum adeo concluditur, ut nullus penitus spirandi pateat aditus: His peractis; puluinari plumis anserimis referto, ignique calefacto, uas inuoluitur, & in arca aliqua reponitur, ibique tamdiu asseruatur donec quæ infusa sunt satis macerentur: Id quod diei unius spatio commodè fieri solet. Sic enim conseruato calore, omnem medicamenti facultatem dilutū in se recipit. Sunt qui in tepido tantū liquore (ut Fernelius iubet) dilutum parari doceant triduo, aut quatrduo, uerū cum uehementior extrahendi
uis

De Facultatibus

uis insit ubi calor uehementior quoq;
fuerit, quàm ubi remissior, ego qui-
dem perpetuo feruenti aqua usus sum,
idque non modo, q̄ citius, & felicius
res ipsa mihi successerit, sed etiam q̄
odoratiores, gratiores, præstantio-
resque potiones hinc profectò fiant.
Siquidem quæ in egelido liquore ma-
cerantur, non nisi diuturniori tempo-
re perficiuntur, nempe trium, aut qua-
tuor, aut fortasse plurium dierum
spatio. Quo fit ut interim dilutum aut
fitum, aut acorem, aut putredinem,
aut graueolentiam contrahat, quibus
non solū sumētibus magna admodum
concitatur nausea, sed quod peius est,
ipsum corrumpitur medicamentum.
Præter id tantum aquæ, alteriusuè li-
quoris accipiendum est, quantū satis
fit pro medicamentorum quantitate.
Videlicet ubi (exempli gratia) senæ
aridæ uncia maceranda sit, aquæ un-
cię decem superinfundi debent, ubi ve-
rò uel huius, uel aliarum plantarum
folia uiridia recentiaque fuerint, mi-
nor sanè quantitas sufficiet, ut in eli-
xatione superius diximus, quòd plus
arida, minus recentia liquoris combi-
bant. Vtimur autem dilutis eiusmo-
di ratione paratis non solum in apo-
zematibus, sed etiam foeliciter ad-
modum, in quotidianis portionibus
aluum

aluum mouentibus, quod hæc (ut diximus) longè gratiora sint quàm ipsa solidorum substantia : quin etiã, quod quæ liquida sunt , citius quàm crassa per corporis meatus distribuuntur.

Quare rectè Hippocrati dictum est ,
facilius refici nos posse potu quàm cibo.

De Destillatione. Cap. 18.

PRiscorum Medicorum nemo fuit, qui quicquam ad posteritatē transmississet de arte eliciendi aquas stillatitias ex plantis, aut aliis quibusuis uegetabilibus. Parabant illi potiones suas ex dilutis, uel decoctis ad curandos corporum nostrorum affectus, aquarum stillatitiarum nulla habita mentione, aut fortasse notitia. Inuentum ergo hoc nouum est, referuntq; quidam ad Chymicæ artis professores, alii ad Medicum quendam, qui (ut narratur) dum forte fortuna betam decoctam adhuc calentem in stagnæam patinam effunderet, & alteram similem patinam superponeret, ne statim refrigesceret olus, idq; ubi sub edendi rēpus detegeret, uideretq; superiorem patinam, aqueo liquore, ipsoq; copioso adeò resudantem, ut undiquaq; plurimæ excurrerent guttæ, quæ oleris iam cocti tum odorem, tum saporem respiciebant
his

De Facultatibus

his omnibus diligenter consideratis
sicq; artē à natura edoctus instrumen-
tum excogitauit plumbeum campanæ
rostratæ modò paratum ad cotegen-
dam æneam patellam super fornacem
compositam quæ herbas excipit , ut
subdito igne, stillatitias consequeretur
aquas . Id quod illi felicissimè cessit.
Elégit ille sanè non sine ratione plum-
bea hæc instrumenta, quòd sibi persua-
deret plumbum ob suam, quam pos-
sidet frigiditatem, ascendentem uapo-
rem à plantis ab igne calefactis , per
quam facilè in aquam uertere posse.
Et rectè quidem cùm è nullo alterius
metalli, aut materiæ Alembico tam co-
piosa educatur aqua, ut è plumbeo . Id
cùm postea contèplarentur alii nouū
modum excogitarunt , quo uno tantū
igne & una tantū fornace plura conca-
lescerent uasa, singula singulis plūbeis
alembicis contecta , ut minore sum-
ptu, ac labore, copiosas adipiscerentur
aquas . Quamobrem fornacem, cuius
imaginem primo loco dabimus sibi
fabricarunt. Ceterùm cū nō desint, qui
semper meliora inuentis addere sata-
gunt , præsertim chymicæ facultatis
professores. ii cùm uiderent eiusmodi
aquas plumbeis alembicis paratas sua-
rum plantarum odores , sapesque
haud quaquam resipere sed potius fu-
mum

num olere, & adustionis nidorem, & quæ ex amaris acutisq; plantis fierent, nec amaroris aliquid, nec acredinis, sed dulcedinis non parum gustantibus reddere, aliud ad hoc munus obeun- lum inuenerunt instrumentum, quod vesicam appellauere, quo passim utun- tur ii qui è uini fecibus Aquam uitæ destillant, herbis unà cum communis aquæ non mediocri quantitate in uas æneum coniectis, ut ex fornacis ipsius imagine quispiam uidere poterit. Cæ- terum concinniores modum postre- mi reppererunt: quippe qui eiusmodi aquas in feruentis aquæ balneo, quod Mariæ chymistæ uocant, aut super ua- poribus extrahunt. Siquidem constat has esse omnium præstâtissimas, quod suarum plantarum tum odorem, tum saporem egregiè retineant. Euenit sa- nè hoc, quoniam balneum feruentis aque sua ipsius humiditate partes te- nuiores retinet, conseruat ac custo- dit in herbis, quo fit ut eæ non re- soluantur suis in plantis, quemadmo- dum in iis, quæ lignorum, aut carbo- num uiolento igne exuruntur in pa- tellis, qua propter, inter aquas, quæ balnei calentis ui destillantur, & quæ plumbeis alembicis extrahuntur, tan- ta deprehenditur differentia: quanta inter uinum & aquam: Quippe quæ
fiunt

De Facultatibus

fiunt in balneo feruentis aquę, aut super ipsius uapore, utreis alembicis ad id muneris paratis, ut postea ostendemus, ex quidem ab herbis, & floribus, à quibus manant, nec sapore, (ut paulò ante diximus) nec odore discrepant: quin etiam non solum herbarum qualitates secum trahunt, sed etiam tam limpide, clare, syncereq; proueniunt, ut ne tantillū quidem fumi, uel adustionis nidorem respiciant. Contra uerò nunquam, uel rarissimè gustaueris aquas è plumbeis alembicis resultant, quin tibi fumidum quiddam in ore relinquant. Quę res non modo gustantibus, bibentibusue, præsertim ægris, qui ceteris morosiores semper esse solent, nauseam mouent, & molestiam afferunt, sed plurimum noxę pectori, uentriculo, iocinori uisceribusq; omnibus ignerunt, quòd à plumbeis uasculis è quibus deriuantur malas qualitates eliciant, & in seipsas contrahant. Quare rectè Galeno dictum est. lib. septimo, cap. secundo de comp. med. secund. loc. ubi confectionem è papauerum capitibus parat, fugiendas, uitandasq; esse aquas quę plumbeis canalibus ducuntur, quòd dysenteriam faciat, & abradat intestina. Patet hoc manifestissimè in absinthii aqua ex plumbeo Alembico profecta, nam
eam

am dulcem esse constat, non amaram. Id quod à plumbeis instrumentis, quibus conficitur (ut diuturna docet experientia) euenire certum est, idque non solum in absinthii aqua; sed etiam in alterius cuiusvis plantę, temperamento calido & acri sapore præditę. Siquidem cum plumbeus alembicus huiusmodi plantarum uaporibus, tum actu, tum potestate ex-calfacientibus superficietenus afficiatur, corrumpaturue, fit quidem ut superficies ipsa ita affecta in tenuissimam cerussam uertatur, quę deinde aquis se commiscens, illis dulcedinem addit. Atque id uidere est in albo harum aquarum sedimine, præsertimq; ubi aquę per plumbeum alembicum recens paratum meauerint. Nam uas, quod diu in hoc opere usurpatum est, obducta circumquaq; quadam ueluti gypsea crusta non ita facile à calidarum aut acrium plantarum uaporibus inficitur, & in cerussam uertitur. Porro nulli mirum esse debet si ab acri plantarum uapore plumbi superficies in cerussam mutetur, cum cerussa ipsa (ut Dioscorides est autor) paretur laminis plumbeis super aceti uaporibus suspensis. Quod quidem aquis iis non euenit, quę duplici uase uitreis organis in calentis aquę balneo conficiuntur

tur

De Facultatibus

tur . Nam eæ sufficienter amarescere
aut fauces linguamue uellicare, si fiant
ex amaris, aut acribus plantis, sentiun-
tur . Præterea dulcedine carent quòd
à uitreis instrumentis, unde guttatim
fluunt, nullam ascititiam qualitatem
recipiant. Porro quæ parantur in eneo
uase, (quod Germani . Vesicam uo-
cant) stanno circumlito, longè etiam
meliores habentur, quàm quæ è plum-
beis rostratis cāpanis eliciuntur, quòd
suppositus ignis herbas in aqua ferue-
scentes, nec urere, nec fumido nidore
inficere queat . Attamen nec hę inte-
gras herbarum uires retinēt, ob aquæ
communis admistionem, quæ illas mi-
nuit, & hebetat . Quamobrem aquis
tantum illis palma danda quæ in bal-
neo aut balnei uapore parantur, & præ-
fertim, quæ fiunt ex herbis facultate ca-
lidis . & hæc de modis distillandarum
aquarum à plantis & plantarum flori-
bus in uniuersum dixisse sufficiat . Pe-
culiaria enim inferius describentur
ubi fornacum, & instrumentorum ima-
gines appictas dabimus . Quòd autem
ad aquarum stillatitiarum uires spe-
ctat, sciendum est iisdem eas pollere
uiribus, quibus & herbe, & flores, à qui-
bus eliciuntur, præditę sunt. uerum nō
omnino adeò præstantibus, quippe
quòd in distillando non modicum sub-
stantię

stantiæ deperdatur, & in auram euo-
let, quo fit ut non desint medici, qui de
coctis, & dilutis potius utantur; siqui-
dem ex gustu, olfactuq; apertissime cõ-
stat, longe plus uirium in his contine-
ri, quàm in aquis stillatitiis. Ve-
rùm quia decocta ac diluta ægris haud
requè placere solent, ut aquæ ipsæ stil-
latitiæ, ideo hæ potius quàm illa eli-
gendæ, ubi ægrotis gratiora pocula of-
ferre uolumus. Ad quam rem etiã My-
ropolarum diligentia requiritur, ut sci-
licet eas aquas probè, ut diligenter
conficiant. Sunt præterea stillati-
tiæ aquæ admodum utiles ac necessa-
riæ, adeo, ut decoctis quibusdam in
medicamentis non parùm anteferri de-
beant. Nam ubi in ardentibus feбри-
bus, & æstatis feruoribus potus ali-
quis parandus fuerit, qui & sitim ua-
lenter extinguere & gustum potantis
oblectare queat, foelicius commodius-
que id proculdubio fiet cùm aquis ad-
mixtis stillatitiis, aut uino punico-
rum malorum, aut rosacco, uiola-
ceouæ iulapio, aut ex citrei, aut limo-
nii mali succo, quam cum quouis de-
cocto quantuncunque optimè para-
to. Idem etiam euenit ubi aut ad ocu-
lorum morbos collyria, aut in capi-
tis dolore oxyrhodina, aut in iocino-
ris, & cordis affectibus epithemata pa-

D randa

De Facultatibus

randa erunt. Prætereo quantum con-
ducant stillatitiæ aquæ ad odoramē-
ta paranda cū in medicum potissi-
mum usum, tum ad diuersi corporis
delitias, cuiusmodi sunt, quæ paran-
tur è floribus rosarum; pomorum au-
rantiorum, myrti, & aliarum plan-
tarum, quorum flores suauiter spi-
rant. Silebo quoque quantum ualenat
ad mulierum ornatum, & ad conci-
liandum in eis faciei nitorem, quæ
fiunt è radicibus polygonati, bryo-
niæ, agrestis cucumeris, ari & faba-
rum floribus; ne uidear his rebus ma-
gis intentus, quàm ceteris, de qui-
bus scribere decreuimus. Sed de stil-
latitiis aquis hætenus. Reliquum

*Olei di-
stilladi
ratio ex
aroma-
tibus.*

est ut de stillatitiis etiam oleis dica-
mus præsertimque de his, quæ è uul-
gari cinnamomo, è Caryophyllis,
myristicis nucibus, maci, atque ani-
si, sceniculi, cari, melanthii alia-
rumque plantarum feminibus, quin
etiam è iuniperi baccis per alembicū
parantur, & usui medico plurimum
conferunt. Scripsere quidem de hu-
iuscemodi oleis parandis quidam ma-
gni nominis medici, sed an uera, uel
falsa ii postea dicent, qui periculum
fecerint. Atqui uera, securaque pa-
randi ratio hæc est. Sumitur (exem-
pli causa) Caryophyllorum electorū
libra

libra una. Caryophylli contundun-
tur in tenuem puluerem, & deinde
macerantur ex libris sex aque fonta-
ne egelide in uitreo uel stanneo ua-
se diebus quindecim continuis, post
modum per alembicum quod uesi-
cam uocant, quo cum aqua uite pa-
rari solet, distillantur. Siquidem
hoc pacto oleum una cum aqua di-
stillat, quod deinde ab ea facile se-
paratur. Porro si diligenter labo-
ratur Caryophyllorum libra, olei
unciam reddere solet: atqui plus,
aut minus pro caryophyllorum bo-
nitate, ac prestantia. Eodem etiam
modo paratur e cinnamomo, quod
tamen plus aque requirit, & minus
olei reddit, cum ex libra uix dra-
chma colligatur. Nec aliter fit, quod
ex prescriptis paratur seminibus, & in-
niperinis baccis. Sic quoque opti-
me conficitur ex myristicis nucibus
& mace. Sed hæc macerare oportet
prius confusa in uitreo uase cæco a-
lembico, (ut chymicis uerbis utar)
oculoso, mensis unius spatio, in bal-
neo calide quidem sed non feruen-
tis aquæ, ac deinde eadem ratione
distillare. tametsi e myristicis nuci-
bus confusis passim ab unguentariis
parari soleat, iis prius calefactis,
deinde prelo expressis, perinde ac
D 2 oleum

De Facultatibus

oleum, quod ex amygdalis nucibus paratur. Ceterum possunt quoq; distillari hæc olea per uitreum alembicum ubi in urinale chymicum uitreumque luto incrustatum, quæ iam macerata fuerint aromata imponantur & deinde superposito alembico distillantur in fornace ita parata, ut suppositus carbonum ignis urinalis fundum attingere possit: Sed curare oportet quod urinale præscriptum spithamę mensuram non excedat. sic itaq; utraque parandi ratione è præscriptis oleum habebis preciosissimum, synce-
rissimum, ac odoratissimum, absque ullo adustionis, fumique nidore, cuius una aut altera tantum gutta longè plus ualebit in medicamentis parandis, quàm si integram cinnamomi, aut caryophyllorum unciam adderes. Hæc accepta referant uelim, qui legunt Balthasari Clauselio harum rerum peritissimo, indagatoriq; accerrimo Serenissimi Principis mei Ferdinandi Archiducis Austriæ, Pharmacopœo, qui mihi hæc sua secreta reuelauit, & nonnullorum alioqui clarissimorum uirorum fabulas patefecit, qui ab aliis fortasse delusi, ac decepti, de hac materia scripserunt. Quod uero ex resina terebinthina, larrigna, abiognaq; paratur in uitreis va-
fis


Simpl. Medic. 39

sis luto circumlitis in fornace fabulo,
aut cinere circumquaque stipatis, eli-
citur, igne primùm lento, deinde pau-
latim aucto, ac postremò uehementer
accenso.



D 3 Prima


De Facultatibus




Hæc form
formam
vel capere
bo paratos
deberi possunt
hic appingi
modum ubi
oō causis de
omnes insigne
perioris statu
ferent illi
qui in hoc
quantum
modi aqua

Prima Fornax

HAec fornax ad huiusce imaginis formam parata quàm plures potest capere rostratos alembicos è plũbo paratos, qui unico tantum igne calefieri possunt. Eius autem imaginem hic appingi curauimus; non quod in medicum usum rectè uenire possit, eas ob causas de quibus diximus, sed ut omnes inspicere queant, quo pacto superioris ætatis pharmacopæi suas confecerint stillatitias aquas; atq; ut sciãt qui in hanc usq; ætatem iis utuntur quantum læsionis ac detrimenti huiusmodi aquę afferant ægris.



De Facultatibus




Secunda Fornax.

Fornax Vessicam æneam (ita Germania uocatam) æneo pariter alembico contactam, continet, cuius rostrum ligneum cadum aqua frigida plenum perforat, ut transeuntes uapores siue spiritus facilius in aquam uertantur. Hoc itaq; alembico (ut prædiximus) aqua uitæ paratur, quin etiam aqua quæuis alia è quibuscunq; plantis; ac præterea Olea omnia ex aromatis; de quibus paulo superius abundè diximus.

D 5 Tertia

De Facultatibus




Alchemi
Bum cum
ferius vas
magis obli
quo alieni
tum, ferunt
altero extru
cuntur simul
rostrum ali
tat. Vbi aut
go iure
quod con
culo spe
funditur

Tertia Fornax.

BAlneum est Mariæ simpliciter paratum cum uno tantum alembico. Inferius uas quod stanneum est matulæ magnæ oblongæ simile habetur, tum æneo aheni cooperculo ita plumbatum, ferruminatumq; , ut alterum sine altero extrahi non possit. Simul imponuntur, simul quoq; auferuntur. At qui rostratum alembicū uitreum esse oportet. Vbi autem aqua in aheni ex longo feruore defecerit, aperto foramine, quod cuneo conclusum in aheni operculo spectatur, alia etiam feruens infunditur, donec ahenum repleatur.

De Facultatibus




Quarta Fornax.

Balneum hoc quatuor continet
alembicos uitreos, quorum uasa in
balneum collocanda, & uitrea, & stan-
nea esse possunt. Quod autem in sum-
mo eminent, uapore tantum aque infe-
rioris balnei per æneam fistulam sur-
sum ascendente calefactum, aquam à
contentis herbis aut floribus stillat
omnium optimam.

Quinta

De Facultatibus



Alchem
Bqo des i
rum longu
tre rebiet
fium effo
men in me
fum, ad h
ponigunt
dicut, que
confutun
pia, ad h
que ex l
ma colu
de hui
cum in
friger
gerato, h
antes le
in aqua
est, in
artifices
paulo po
illico f
alambic
reth, ap
frigida
qui ne
& refun


Quinta Fornax.

BAlneum hoc est elegantissimum in quo uas stanneum trium spithamarum longitudine, tumido inferius ventre residet, cuius superior pars, in qua situm est orificium, per rotundum foramen in medio balnei cooperculo excisum, ad spithamæ altitudinem sursum porrigitur. Huic inseritur stanneus alembicus, quem uas aliud eodem metallo conflatum, amplioris latitudinis excipit, ad frigidam recipiendam aquam, quæ ex superiori oblongo uase, in summa columnæ parte residente per creā defluit fistulam, ut stanneum alembicum in medio stantem circundet & refrigeret. Siquidem eo continuo refrigerato, fit quidem, ut uapores ascendentes longè melius concrecant, & in aquam uertantur. Id quod in causa est, ut copiosiore aqua recipiant artifices. Vbi autem ipsa aqua frigida paulo post à calore alembici calefiat, illico fistula in inferiore parte uasis alembicum recipientis, euacuari potest, aperto epistomio, & alia iterum frigida denuo uas ipsum repleti. At qui ne tantum laboris in effundenda, & refundenda hac aqua suscipiant ministri

De Facultatibus

nistri, potest superioris uasis fistula, quod frigidam continet, epistomio ita subinde regi ac moderari, ut tantum aquæ continuò in uas alembicum circundans distillet, quantum huiusce recipientis fistula, suo ipsius epistomio moderata, continuò uacuari queat. Ut autem balnei ipsius ahenum eadem semper aquæ quantitate refertū sit, & ne aqua quæ ignium ui continuè consumitur in eo deficiat, arte quidem factum est, ut uas aliud in inferiore parte columnę repositum calidissimam aquam continuo per suam ipsius fistulam epistomio moderatam in ahenum effundat, quæ quidem in suo uase calefit eodem igne, quo ipsum calefit balneum, siquidem uacua est parietis columna usq; ad ipsius inferioris uasis fundum.

Sexta



De Facultatibus

Sexta & postrema fornax.

Postrema hac fornace utuntur Veneti ac Neapolitani aquarum stillarum artifices, qui uitreis alembicis abundant, in qua una tantum die & nocte sicco ignis calore, eliciuntur aquæ centum libræ. Fornax rotunda est, ut ex imagine hic appicta apparet, fornacibus, quæ in Germanorum uisuntur uaporariis, omnino similis. Continet hæc in uniuerso suo ipsius ambitu, (ut uisitur) numerosa fictilia intrinsecus uitro incrustata, matulæ maioris formam referentia, & diligenti sanè artificio argillaceo luto fornaci agglutinata, quibus singulis, singuli adduntur uitrei alembici, è quorum uertice ex globulo ad hoc parato, recipientia crassiusculo funiculo adalligata pendunt. Calefit itaq; hæc fornax eodem modo, quo calefiunt in alpinis tractibus uaporariorum fornaces, atqui dum ignis uehemens in principio est, uacua relinquunt uasa, donec parumper remittatur, ne uiolento calore, plantæ, aut flores exurantur. Tunc itaq; plures ministri, qui hoc tantum artificio aluntur obstructo undiq; fornacis ostio, ne conclusus deperdatur calor, herbas fictilibus addunt, & simul uitreos

treos applicant, alembicos. Atque in hunc modum copiosas eliciunt aquas, quæ omnino longè meliores habentur, quàm quæ plumbeis parantur instrumentis, quòd nullam metallorum contrahant infectionem.

De colliquatione, & dissolutione. Cap. 19.

Medicamenta quæ liquantur in medicum usum, plura sanè sunt, sed non omnia una, & eadem ratione liquari possunt. Cera enim, resine, adeps medulla, butyrum, & oleum, quod hyberno frigore concrevit, moderato ignis calore liquantur, nullo prorsus humore addito, Mastiche uerò, sandarax, thus, myrrha, styraxq; quæ syncera sit, ladanum, euphorbium in oleo ad ignem facilè, liquantur: quin etiam & in mortario facilè cõteruntur, ubi sicca satis fuerint. Atqui Gummi, nempe Ammoniacum, opopanax, bdellium, sagapenum, Calbanum, sicco ignis calore liquari nequeunt, sed prius ex uino uel aceto macerata ad ignem, rudicula continuo agitata dissoluuntur. Cæterùm gummi quod Arabicum uocant, & tragacanthæ lachyrma, non nisi aqua aut quouis alio aquoso, uinoso uel liquore infusa liquefiunt. Metallica

De Facultatibus

lica autem medicamenta, nempe argenti spuma, cerussa, uulgare minium, erugo, chalcanthū, chalcitis, misy, fori, quo pacto liquari debeant docet Galenus lib. primo cap. 5 de comp. med. secundum genera, sic inquit. Licet itaq; nobis in uarium usum administrare argenti spumam interim ex oleo, & aqua, coctionem eius, ad usq; emplastri spissitudinem molientibus. interdum ex oleo, & aceto, aliquando ex oleo, & uino. Porro in quibuscunque istorum coquatur, melius id medicamenti redditur, quod magis coctum fuerit; quod liquidorum, quæ miscentur copia continget. Est enim ex iis pharmacis, quæ liquefieri possunt, etiā argenti spuma, dum tota funditur sicut resina, & cera, sed non statim ubi ignē contigerit: unde multis imponit, qui nullo modo ipsam fundi existimant: igitur si cum oxaleo coquatur, liquefcit citius; perinde ac cum ærugine, quæ & ipsa fundi natura solet, uti chalcitis quoque, & misy. Ipsorum itaq; celerimè chalcitis funditur, tardissimè argenti spuma: at in horum medio sunt erugo, & misy. funditur & fori, sed lōgiore temporis interuallo, quod terrestre magis, & saxeum sit, quàm chalcitis & misy. Argenti autem spumam per oxaleum coquens, ocyus liquefa-

uefacies, per hydrelæum tardius: tamen funditur sic quoque, si duplum ius sit uterq; humor: Ego certè plusq; duplum miscui frequenter. At qui melius est statim ab initio hæc tria in mortario miscere, argenti spumam, aquam, & oleum. hætenus Galenus. Alumen quoque liquatur ex aceto, & melle coctum, & præsertim addita erugine, sic enim paratur unguetum quod Aegyptiacum uocant officinæ. Concreti autem plantarum succi, nempe hypocistidis & glycyrrhizæ; lycium opiū acatia, & glaucium facile in aqua aut alio quouis liquore; liquari possunt, qui cum eorum uiribus cōueniat.

De tritura. Cap. 20.

Secca, omniq; penitus humore exspertia medicamenta ubi in puluerem conuertere cupimus, id tritura fieri conuenit: ut autem quod potentia sunt medicamenta id actu fiant, in tenuem conterimus puluerem: si quidem, quæ potestate calida sunt, quo tenuius sunt trita, cō citius, & facilius à nostro calore actu calida euadunt, & nos uehementer calfaciunt, cū integra ipsa, parum, aut nihil ex calfacere queant: quemadmodū enim integrum piper in ore retentum, aut deuoratum

*Gal. li.
I. c. II.
de sim.
med fa.*

De Facultatibus

deuoratum, parum aut nihil excalfacit etiam post longum tempus, eius uero tenuissimo puluere uix degustato lingua & fauces statim à contactu exuruntur: eodem sanè modo calida omnia potestate tusa longè magis nos excalfaciunt, quàm si integra deuorentur. Id quod de frigidis medicamentis dicimus. Est etiam tritura utilis admodum ad mitionis necessitatē: Nam quæ tenuissime trita sunt, & Cribro tenuissimo creta simul compositionibus commiscantur, ut partibus suis minimis se mutuo contingentes, promptius, & ualentius se inuicem afficiunt, donec tandem compositi uirtutem unam rectius conflant. Teruntur præterea medicamenta simplicia magis, uel minus, ut facultatem acquirant à prima diuersam. Quæ enim tenuissimè sunt tusa, (ut Galenus inquit) & cribro tenui, creta promptissime in totum corporis habitum digeruntur; Atqui crassiora è diuerso in uentre hærent, quia angusta uenarum ora subire nequeunt. Ob id enim Idem dicebat Galenus Diospoliticon crassius facio, cum alium per id ducere studeo, tenuissimum uero pollinis modo cum urinas mouere. Hinc itaque discant qui rhabarbarum ad ducendam alium contritum propinant, si quidem hac ratione

*Lib. 4.
cap. 7.
de san.
tuend.*

ne crassiusculè tritum, ualentius quā
tenuissimè, purgabit. Quamobrem
qui ipsum cum passis uuis mandunt,
copiosiores alui deiectiones habent,
quā qui in puluerem tenuem, pari-
bus seruatis ponderibus, ex liquore ali-
quo bibunt. Scamonium autem ubi
medicamentis facile corpus peruadē-
tibus miscendum est, tenuissimè atte-
ri debet, contra uerò si catapotiiis, aut
aliis, quę diuturniorem in uentriculo
moram facere debent. Pręter id non
omnia una tantum ratione terenda
sunt, sed pro substantiæ crassitudine,
uel tenuitate: Nam quę rarę ac tenuio-
ris sunt substantiæ, ut rhabarbarum
& scamonium parum diu terēda sunt
quòd longa tritura tenuissimæ eorum
partes dissoluantur, & pereant. Quę
uerò dense admodū sunt substantiæ &
diuerso diutius teri debent. Quare
metallica omnia, & cętera terrea, lō-
ga sanè tritura indigent, ut sua ipsius
tenuitatę per longam trituram acqui-
sita, corporis spiracula peruadant. At
qua ratione teri debeant, quę crassę
sunt substantiæ & acri facultate prædi-
ta perbelle docet Galenus his uerbis.
Memnisse uos puto, & huius, quod
toties repeto fortium medicamento-
rum, cuiusmodi est erugo, misy, chal-
citis, fori, squama æris, ac chalcanthū

*Lib. 6.
c. 2. de
comed.
per gē.*

ex

De Facultatibus

ex aceto diebus pluribus contritorum
morsum obtundi, bonitatem augeri.
Quoniam enim metalla, quę crassio-
ribus natura constant partibus, pote-
statem suam in altum usque corporis,
quod curatur, non extendunt, ideo
ut tenuiora fiant, iis per trituram, &
acetū adhibēdus est cultus. Hoc enim
curiose ita attenuata, ad intima usque
penetrant. hęc ille. Cēterū non so-
lūm cruda quę metallica sunt, nos cō-
terere oportet (ut Galenus ipse do-
cet) sed etiam, quę ufla sunt, diutius
sunt terenda. tum eas ob rationes,
quas prēmisiimus, tum etiam ut me-
lius lauari possint, & pręcipuē quę in
oculorum collyriis cū humidis, tum
siccis addenda sunt. Quę autem rarif-
imæ sunt substantię, ut agaricus & co-
locynthis, cū per se in tenuem pulue-
rem, nisi magna cum difficultate feri-
nequeant, aut cum aliis ad rem facien-
tibus medicamentis, aut prius in pa-
stillos conformata, siccataq; terenda
erunt, (tamen si agaricus super incerni-
culo equi setis parato, cōfricatus bel-
le in farinam cedat) tunc enim facile
in tenuem puluerem comminui pote-
runt. Id quod maximē prohibet, ne in
uentriculo, & intestinis hereant. Quę
uero suo lentore ad trituram contu-
macia sunt, cuiusmodi habetur traga-
canthę

ranthe lachryma, gummi officinis ara-
 bicum uocatum, thus, myrrha, styrax,
 anastiche, euphorbium, ladanum, opius,
 glycyrrhizę succus, quę et si simplici-
 ter, & per se suo lentore contritioni re-
 pugnent, teruntur tamen, ubi diutius
 insolata fuerint, uel moderato ignis
 calore arefacta, cum aliis siccioribus
 ad rem facientibus mista. Id quod etiā
 de seminibus quibusdam, nempe cu-
 curbitę, melopeponum, cucumeris, cy-
 doniorum, citrei mali est etiam intel-
 ligendum. Amygdala quoq; pinei nu-
 clei, pistacia xyli ac tale quoduis semē
 facile conteras, si prius cum triticeis
 furfuribus in patella super ignem con-
 fricata siccabimus, ubi in plueribus,
 quas officinę species uocant, addi de-
 beant. Atqui ubi in antidotis hec
 addere sit opus in mortariis lapideis li-
 gneis pistillis diligentissime sunt atterē-
 da, ac liquore aliquo ad id faciente, dis-
 soluenda, & deinde ex melle uel ex sac-
 charo excipienda. Postremò memi-
 nisse oportet non omnia medicamen-
 ta in mortario esse terenda, si quidam
 quę crassissimę sunt subliatıa, ut sunt
 gemmarum, & lapidum omne genus,
 corallia, uniones, & alia duriora, nul-
 lo pacto in mortariis æneis terenda
 sunt, sed super porphyreis, aut aliis
 purioribus lapidibus ad leuorē usq; :
 E siquidem

De Facultatibus

siquidem ubi inconsultè, ac temerè in mortariis eneis terantur, derafis, deli-
matisq; sua ingenti duritie mortariis
ac pistillis, æris & ferri scobs iis admi-
sta, noxium ac deleterium reddit me-
dicamentum in hominum perniciem.

De torrefactione. Cap. 21.

SVnt & medicamenta, quæ à medi-
scis pluribus de causis igni torren-
tur, uerùm non omnium una est tor-
refaciendi intentio, quædam enim tor-
rentur ut facilius trituram admittant
quædam ut eorum uires imbecilliores
reddantur, nonnulla è diuerso, ut au-
geantur, quædam uerò, quæ diuersis,
& pugnantibus sunt inter se facultati-
bus, ut alteram deponant, alteram au-
geant. Quæ igitur assare oportet, ut
facilius triturentur, sunt ueluti traga-
canthæ lachrima, gummi, sericum,
bdellium, thus, mastix, myrrha, &
alia quædam, de quibus satis, superq;
in tritura diximus. Quæ autem torrè-
tur ut acerrima, uehementesq; eo-
rum uis minuatur, sunt ueluti aspho-
deli, dracunculi, ariq; radices, quin
etiam cæpa allium porrum. Scamo-
nium quoq; in cydonio pomo & ue-
raturum in raphani radice immissum,
inassamus, ut mitescant. Ceterùm
quæ

quæ tosta ualentiores uires acquirunt sunt uelut i scilla, & pancratium. Hæc autem in patella torrêtur, ut deposito humore, acriora euadant & ad purgandum ualentiora. Quin etiam orizam hordeum, coriandri, oxalidis, & planraginis semen, torrefacimus, ut aucta siccitate magis corroborent. Quæ postremò uirtute duplici ac repugnante prædita sunt, torreri nonnunquam in myropoliis præcipimus, ut deiectioni uim amittant, & adstrictoriâ augeât, Hoc quidem cum rhabbaro, myrobalanis plerunque facimus, atque iis postea felicissimè utimur ad dysentericos, cæliacos affectus, ac ad cæteras quascunque alui fluxiones, eorum sententiam improbantes, qui cum tosta, à combustis discernere nequeant, eos medicos teprehendūt, qui rhabbarū torrefactum, magno profecto auxilio, dysentericis propinant. Porro torrefaciendorum medicamentorum, neq; unus tātum est modus, nec ratio una. Sunt enim quæ in patellis torrêtur, ut oriza, hordeum, coriandri, & oxalidis semen. Sunt & quæ super calefactis tegulis, ut tragacanthæ lachryma, gummi, bdellium, sericum, crocus, rhabbarum, myrobolani: Nec desunt quæ in furno torreri oporteat, ut Scamonium in cydonio pomo occlusum

De Facultatibus

clustum & farinaceo glutino circum-
uoluto, forba, mespila, corna, ut faci-
le in farinam moli queant, quin etiam
& lepusculi, & lupinum iecur, eodem
modo torrendo solent: hoc quidem ad
hydropicos, illi ad nephriticos affe-
ctus. Assantur & alio fermentibus cine-
ribus obducta, ut dracunculi, asphodeli,
& ari radices, nux myrtica, & alia
pleraq;. Atqui meminisse quoq; oportet,
quod sicut, quæ rare, tenuissimæ-
que sunt substantiæ, & superficietenu-
es vires sortite sunt, decoctionem
longam non sustinent, sic neque lon-
gam afflationem.

De uestione Cap. 22.

VRuntur de industria medicamenta
pleraque, uel ut reddantur siccio-
ra, friabilioraq; quod facilius conteri
queant, uel ut essentia crassitudinem
deponant, & tenuitatem acquirant, uel
ut uis quædam à nostro curandi scopo
aliena in eorum superficiem trahatur,
& deinde lotionem auferatur, uel ut no-
uum aliquem calorem induant, uel ut
in aliam se permutent speciem. Cate-
rum quæ uruntur, ut facilius teri leui-
gariq; possint, sunt sicut purpurarum,
buccinorum, ostreorum, cochlearum-
que putamina, ungulæ, cornua, ossa la-
na

na, pili, & coria quorundam animalium, quæ uel sua terrena consistencia, atq; concreta densitate, uel suo ipsius lentore, ac humiditate, usui esse non possunt, nisi prius urantur. Hac enim ratione ungulæ asininae, atq; humani capitis os ad epilepticos uruntur, atq; eadem ratione ceruorum cornua, ostreorum, & purpurarum putamina, ad dentifricia, oculorum cicatrices, & ad carnis excrescentias cohibendas, ulceraq; cicatrice obducenda, cremari iubemus.

Quæ autem uruntur, ut exuta suæ ipsius essentia crassitudine, tenuiorem acquirant substantiam, sunt ferè omnia metallica, medicamenta, quæ quauis uisione acriora, mordaciora, atque erodentia euadant, diligenter tamen deinde lota, mitia admodum redduntur, atq; omnis erosionis expertia, & longè magis siccantia. Id quod in calce atq; in aliis non nullis quotidie experimur. Cornu itè ceruinum ustum, longè magis terget, quàm crudum. Eadem de causa uruntur ostracodermorum putamina, nempe non modò, ut teri facilius possint, sed ut tenuioris fiant substantiæ, & cogendi facultatem deponant. Porro quæ comburuntur, ut quædam à nostro scopo aliena in superficiem trahantur, & deinde lotionem

E 3 lantur

De Facultatibus

lantur, sunt sicut cadmia & hēmatites lapis. Nanq; hęc sepe uruntur, restingunturq; in uino, aut melle, aut butyro, atque diu lauātur ad uarios oculorum affectus. Quę uerò uruntur, ut nouum colorem acquirant, sunt sicut ęrugo, cerussa, auripigmentum. Hoc enim ruberrimum pellucidumq; euadit, cerussa uerò in rubrum, uulgareque minium transit, ęrugo autem aut nigro fit colore, aut ęris modo flauescente.

Postremò quę uruntur, ut in aliam transeant speciē, sunt ueluti sal quod ex uiperis uſtis conficitur, quin etiam illud, quod ex nitrosarum plantarum cinere à peritis artificibus confici solet, uel ex uſto chalcantho oleum, uel ex uſto stibio uitrum, alterius, ac longè ualentioris facultatis, quàm stibium crudum. Pręterea urendi modus non omnibus est unus. Nam quę humore, & pręsertim pingui sunt prędicta, per se uruntur, ut pili, lana, corium, cornua ungulę ossa hirundines, & aues alię quędam, lepusculi ex utero matris exempti, alięq; non nulla pedestria. Quę omnia in olla fictili noua cooperculo foraminulento tecta, argilla circumquaq; obducto, urenda sunt, pręsertim cū cinefacta disperdi possint: Quę uerò etiam uſta integra manēt, ut ungulę, ossa, cornua, tametsi uiuis

uiuis carbonibus tradi possunt, uruntur tamen longè melius in fictili crudo operculo unde quaque argilla agglutinato, & in figulorum fornace collocato. Herbe autem comburi omnino non debent, nisi quis uelit ex cinere sal conficere, siquidem ad alios usus præstabit eas eò usq; torrefacere, quò in puluerem conteri queunt. Nam. Galeno teste, corrumpitur, ac uilescit herbarum uis, si diutius torreantur. At qui Metallica, nempe es, plumbum, argenti spuma, molybdena, helcysma, alio omnino opificio indigent, ut libro quinto de medica materia docet Dioscorides. quò qui diffusius hæc addiscere cupiunt, se conferre poterunt.

Lib. 5.

ca. 9. de

comp.

me s. la

cos.

De ablutione Cap. 23.

TRes sunt lauandorū medicamento-
rum intentiones, prima, ut, separetur, quod in iis impurum est, secunda, ut si quid maleficarum uirium insit, auferatur. Tertia ut quæ lauantur nouam aliquam induant facultatem. ut igitur quod futurum est separetur lauantur aqua fontana, herbe & radices, ubi uel terra, uel luto infectæ fuerint, quin etiã semina, & fructus, ubi hæserit uel puluis, uel situs. Quoniam etiam metallica eadem ratione aqua pura lauantur. Quæ

E 4

autem

De Facultatibus

autem ut maleficam uim deponāt ab-
lui solent, sunt usta omnia, tam ex me-
tallicis, quā ex plantis & animalibus
accepta. Siquidem hec acrimoniā
ex uisione acquirant, ablutione depō-
nunt, atque longē minus mordacia
reddūtur. ob idq; æs ustum lauari uult.

*Lib. 9. Galenus, ubi in carne molli cicatrix
de s. m. sit obducenda, nam in dura omnino
fac. epuloticum est citra lotionē. Id quod
de ustis omnibus est intelligēdum. La-
uantur quoque eadem de causa alia
non nulla citra uisionem, ut deposita
acredine, mitiora euadant. Talia enim
sunt acacia, oleum, pix, resina, aloë, can-
chamum, cæruleus, & Armenius lapis.
Quæ autem lauantur, ut alias præter
suas facultates induant, sunt ueluti bu-
tyrum elotum ex aqua, in qua argen-
tum uiuum, quod officinæ sublima-
tum uocant, incoctum colliquatumq;
fuerit, quo utuntur non nulli ad mor-
bi Gallici papulas curandas. Item cata-
potiorum non nullorum massa, ex ti-
thymali, aut ellebori decocto pluries
lota, uel aloë ex aromatum diluto ab-
luta, uel turpetum ex agarici decocto.
Porro lauandorum medicamentorum
uariat quoque ratio, nec omnia aqua
tantum pura lauantur, sed quandoq;
marina, aceto, uino, plantarum succis,
& stillatitiis aquis. At qui quo pacto
lauari*

lauari debent metallica docet Galenus *r. c. 10.*
 his uerbis. Argenti spuma facile, elui- *de com.*
 tur, ut quæ statim propter innatam gra- *ph. s. ge-*
 uitatem liquoribus in quibus leuigatur *nera.*
 subsidat, unde totam mordacitatem
 in aqua lota exuit. Acuti uerò sensus
 corpora parùm adeò mordacem perci-
 piunt, si ex aceto, uel uino eluatur. Por-
 rò conuenit diligenter toto die con-
 tritam colliquare, & per noctem relin-
 quere, postero die mane deinde aufer-
 re, aliūq; mox superinfundere, po-
 stea rursus terere similiter, iterum-
 que sequenti aurora liquorem emit-
 tere. Quod faciendum est, donec si-
 mul cum humore argenti spumæ ue-
 lut tenuissima quædā portio (achnen
 hanc Græci uocant) appareat, cumq;
 nihil amplius innatat, nihil etiam ma-
 gis effundendum est. Attamen conue-
 nere diebus pluribus oportet, cū ni-
 hil ei insistat. idq; sole feruente satius
 est. Ita enim accidit, ut medicamen-
 tum siccet ualentius. Porro nouerunt
 omnes id estate non solum in argenti
 spuma, uerùm in aliis etiam, quæ hoc
 modo præparantur fieri commodius.
 Siquidem cadmia, eris squama, dy-
 phryges, cerussa, misy, fori, stimmi, &
 omnes lapides, præterea calx, perin-
 de, ut argenti spuma, ex liquore aliquo
 prædicto eluuntur, ac leuigantur. Quan

E 5 do

De Facultatibus

do aut em, & quibus in morbis lauanda sunt hæc ex aqua pura, uel marina, ex uino uel aceto docet idē Galenus his uerbis. Etenim in prætumidis ulceribus, ac duris, quæ oras crassas callasq; multam attenuationem requirētes habēt, ex aceto, & marina aqua læuigata: magis quā quæ per aquā idonea sunt. In quibus autem acre, & mordax est humidum quod in ulcera fertur, ex aqua terere potius singula metallica necesse est. quemadmodum rursus ex uino magis, ubi copiosus humor ulceribus influens apparet. Hæc ille. Ceterum non desunt, qui aquis stillatitiis metallica lauant, nam ubi refrigeratione opus sit ex lactuæ solani, aut cucurbitæ, ubi autem adstrictionem, ex plantaginis, & rosarum aquis huiusmodi abluunt medicamenta. Sicq; Mesues ad maiorem inducendam lætitiā cyaneum lapidem ex aqua buglosi lauari præcipit. Præter id quo nam pacto lauari debeant, quæ aquæ misceri non possunt, nempe oleum, adeps, butyrum, pix, resina, cera, & alia quædam id sanè ex eodem Galeno petere oportet. Quippe qui horum medicamentorum lauandi ratione satis superque docet lib. 2. cap. 15. de simp. medic. facul. sic inquit. Lauanda porrò non tantum-

tummodo cera, sed ex pix, & resina, & oleum, & quicquid aliud aquæ misceri non patitur, primumq; modicè calfactum, mox in uas lati oris, ac magnū, cuiq; insit aquæ copia purissimæ, simul, & omnis qualitatē expertis, infundito, nā in ea quicquid id sit, quod abluatur, acrimoniam suam exuit, dein de conterito, tundito, frangito, manibūq; impensè subigito, ita ut unaquæq; uidelicet medicamēti abluēdi particula aquam possit contingere, de nique effusa priori aqua rursus, quod lauatur excalfaciens, in aliam aquam æque synceram iniicito, rursusq; diutissimè contundito, donec qualitatem suam in aquam deponat. Id autem gustu cognoscitur. Mox uerò & tertio, & quarto, & sæpius deinceps idem faciendum, donec aqua nullam ex abluto medicamento qualitatem recipiat. Atque hunc in modum omnia quæ excalfieri & fundi sustinent lauabis. haftenus Galenus. Ceterum non desunt etiam qui lauandi scopos numero definiūt. siquidē cadmiā, & hæmatitem ad oculorum collyria alii septies, alii decies lauant. Armenium lapidem quinquagies lauat Alexander Trallianus. Itaq; alia diutius alia parcius lauanda erunt pro ipsarum facultate, & substantia.

E 6 SIMPL

rum primæ qualitates
per ordines usq; ad
quartum.

SIMPLICIA calida & sicca in primo, secundo, tertio, & quarto ordine. Quibus autem numeri deficiunt, etsi calida & sicca Galeno habeantur, quo autem ordine recenseri debeant, ipse sanè non meminit.

Calid. Sic.

A Brotonum	3.	3.
A Absinthium	1.	3.
A bsinthium seriph.	2.	3.
A canthium		
A canthus		
A canthus syluest.		
A cetum.	moderate,	moderate
A corus	3.	3.
A darces	4.	4.
A deps omnis uetus		
A egilops		
A erugo		
A ethiopsis		
A garicus	1.	2.
		A geratum

Calid.

Sic.

Ageratum		
Allium	4.	4.
Alyssum		
Aloe	2.	3.
Althea	1.	aliquatenus.
Alumen		3.
Alypum		
Ammi	3.	3.
Amomum	3.	2.
Amygdalæ amar		
Amygdalæ dul.		
Amurca	2.	2.
Anagallis utraq;		
Anagyris		
Anchusa altera		
Androsaces		
Anemone		
Anethum	2.	2.
Anisum	3.	3.
Anthemis	1.	1.
Antirrhinum		
Aparine		
Aphaca	temper.	2.
Apium satium.	2.	3.
Apium sylvestre.	2.	3.
Apium palustræ	2.	3.
Apium montanum	2.	2.
Apium magnum	2.	3.
Apiastrum		
Apocynum	3.	3.
		Aqua

Dubitā
dum ta
men.

Dubi-
tādum.

Calid. Sic.

Calx	4.	4.
Canchamum		
Capparis		
Cardamomum	3.	
Carduus	2.	2.
Carpesium		
Carum	3.	3.
Casia odorata	3.	3.
Castoreum	3.	3.
Cedrus	3.	3.
Cedrinus liquor	4.	4.
Cedrides		
Cepa	4.	
Chalcitis	4.	4.
Chalcanthum	4.	4.
Chamæleon albus		
Chamæleon niger	2.	3.
Chamæpitys	2.	3.
Chamædris	3.	3.
Chamædaphne		
Chamæfice		
Chamæleuce	3.	1.
Chelidonium ma.	3.	3.
Chelidonium mi.	4.	4.
Cicer		
Cinnamomum	3.	2.
Circea		
Clematis altera	4.	4.
Clynopodium	3.	3.
Cinis farmentitius	4.	3.
	Cinis	

In no-
stro cly-
mate a-
liter se
habet.

De Facultatibus

Calid.

Sic.

Cinis ficulneus	4.	4.
Coagulum		
Colocynthis	3.	
Conyza	3.	3.
Coriandrum		
Cori		
Costus	4	
Crocus	12.	1.
Crocomagma		
Crocodilium		
Cucumis sylvest.	102.	3.
Cyclaminus		
Cyclaminus altera		
Cyminum	3.	3.
Cyminum sylvest.	12.	3.
Cyperus		
Daphnoides	3.	
Dauci semen	3.	
Dictamnium cret.	3.	2.
Dracunculus ma.	3.	
Dracunculus mi.	3.	
Dryopteris.		
Ebenus		
Elaphoboscum	2.	2.
Elaterium	2.	2.
Elelisphacus.	2.	2.
Epithymum	3.	3.
Erica		
Eruum		
Eruca		
Eryngium		

Calid.

Sic.

Eryngium

Eupatorium

Euphorbium

Faba

temper.

Fex ufta

Fel

Ferula

Ficus

Foeniculum

Foeno græcum

Folium

Galbanum

Gentiana

Geranium

Gingidium

Glauz

Granum cnidium

Halcyonium

Haradinum corticum

cinis

Hedera.

Hedera terrestris

Hippoglossum

Hydropiper

Hypericum

Hyssopus

Iberis

Inula

Iris

Irio

Isaris

22

212

Lycchnis ipe
 Lycium
 Macer
 Malicetres co
 Malicetres fen
 Malobacrum
 Manna thura
 Merum
 Marrubium
 Mel
 Melateria
 Menta fatina
 Mentatrum
 Meum
 Milly
 Moloy
 Myrrha
 Myrrhis
 Nastiche
 Napum
 Nardum in
 Nardum o
 Nardum m
 Nardurum
 Naveca
 Nigella
 Nitrum
 Nitri ip
 Ochra
 Ocinum

Calid.

Sic

Lychnis sylvest.

Lycium

Macer

Mali citrei cortex

Mali citrei semen

Malabahtrum

Manna thuris

Marum

Marrubium

Mel

Melateria

Menta fatiua

Mentastrum

Meum

Misy

Moly

Myrrha

Myrrhis

Mastiche

Napum

Nardum Indicum

Nardum celt.

Nardum montanū

Nasturcium

Nepeta

Nigella

Nitrum

Nitri spuma

Ochra

Ocimum

Ocimastrum

temper.

dubitā
dum.

	Ocimastrum.		
	Oculus bubulus.		
	Oesypus.		
	Olee æthiopice lachryma.		
	Oleomel.		
	Oliux falsæ.		
	Olus atrum.	2.	3.
	Orobis	1.	2.
	Onobrychis		
	Ononis	3.	
	Onosma.		
	Origanum	3.	3.
	Orminum satium		
	Orminum sylvest.		
	Olyris		
	Paliurus		
	Panacis lachyrma	3.	
	Pancratium	2.	
Dubitā-	Paronychia	3.	3.
dum.	Parthenium.		
	Pastinaca erratica.		
	Pæonia		
	Peplis		
	Peplos		
	Periclymenum	3.	3.
	Petrofilinum	3.	2.
	Peucedanum	2.	3.
Dubitā	Phalaris		
dum.	Phu		
	Piper	3.	3.
	Pistacia		

Pistacia
Pityula
Pylagida
Pylaea
Polemonia
Poleum
Polychaeta
Polypoda
Populus nigra
Pomum caprea
Pomum agreste
Propolis
Pseudobunium
Pseudodictamnus
Pterocarya
Præmaria
Pulegium
Purpurea
Pyramidalis
Pyrethrum
Quercus
Radix
Radix chelidonium
Ranunculus
Raphanus
Ricinus
Rhododendron
Robia
Rosa
Ruta

Calid. Sic.

Pistacia		
Pityusa	4.	4.
Pix liquida	2.	2.
Pix ficca	2.	2.
Polemonia		
Polium	2.	3.
Polychnemum	2.	2.
Polygala		
Populus nigra	1.	moderate
Porrum capitatum	3.	3.
Porrum agreste	4.	
Propolis	1.	
Pseudobunium		
Pseudodictamnus	3.	1.
Pforicum	4.	4.
Ptarmica	3.	3.
Pulegium	4.	4. dubitan dum.
Pumex		
Pychnocomum		
Pyrethrum	3.	3.
Quinquefolium	1.	3.
Radicula	3.	
Radix ehodia	2.	2.
Ranunculus	4.	4.
Raphanus	3.	2.
Ricinus		
Rhododaphne	3.	1.
Rubia		
Ruseus		
Ruta	3.	3.
		Ruta

De Facultatibus

Calid.

Sic.

dubitan
dum.

Ruta sylvest.	4.	4.
Sabina	3.	3.
Saccharum	1.	1.
Sagapenum		
Salvia	2.	2.
Sampfuchum	3.	3.
Sandaracha	4.	4.
Sardonia herba	4.	4.
Scandix	2.	2.
Scilla	2.	
Scordium		
Scorodoprasum	3.	3.
Scorpioides	3.	2.
Scolymos	3.	2.
Serpyllum	3.	3.
Sesamoides ma.	3.	3.
Sesamum	temper.	1.
Sesamoides mi.	3.	3.
Seseli	3.	3.
Sinapi	4.	4.
Sison		
Sifer	2.	
Sisymbrium	3.	3.
Sium		
Smilax aspera		
Smilax levis		
Smyrnum	3.	3.
Sori		
Spartum		
Sphondylium	3.	3.
		Stachis

Calid. Sic.

Stachis	3.	3.
Staphylinus		
Staphys sylvest.		
Stęchas		
Styrax		
Tamarix		
Telephium		
Terra cimolia		
Testę marinę		
cremataę	4.	4.
Teucrium	2.	3.
Thlaspi	3.	3.
Thymbra	3.	3.
Thymus	3.	3.
Tithymalus	4.	4.
Tordisium		
Tragium	3.	
Tragoponum		
Tragoriganum	3.	3.
Tripolium	3.	
Triflago	3.	3.
Tubera		
Thuris Manna	2.	1.
Thus	2.	1.
Tussilago		
Veratrum album	3.	3.
Veratrum nig.	3.	3.
Vetonica		
Viola alba		
Viscum		
Vitex		

De Facultatibus

Calid.

Sic.

Vitex
Vitis alba
Vitis syluestris
Vitis nigra
Vrtica
Xanthium
Xyris
Xyphium
Zingiber
Zeia

3.

3.

Calida, & humida.

SIMPLICIA calida & humida in
primo, secundo tertio, & quarto or-
dine. Quibus autem numeri defi-
ciunt, & si calida, & humida Galeno
habeantur, quo tamen ordine re-
censeri debeant, ipse sanè silentio
præteriit.

Calid. Hum.

Adeps omnis recens
Buglossum
Butyrum
Dulcis radix
Glauæ herba
Halimus
Lini semen
Ocimum
Oleum oliuarum

temper.

I.

I.

temp.

Oleum

Simpl. Medic. 61

Calid. Hum.

Oleum Amyg. dulc.		
Oleum sesaminum		
Oleum sem. lini	i.	temperat.
Polygala		
Saccharum	i.	i.
Satyrium primum		
Satyrium alterum		
Sertula campana		
Testiculus uterque		

SIMPLICIA frigida: & humida
in primo secundo, tertio, & quarto
ordine. Quibus autem numeri de-
sunt, quo ordine recenseri debeant
non explicauit Galenus.

Frig. Hum.

Acetabulum		
Apollinaris herba		
Aqua		
Atriplex	i.	2.
Blitum	2.	2.
Centunculus		
Cicuta	4.	4.
Cucurbita	2.	2.
Cucumis satiuus	2.	2.
Cytisus		

F Dorychni-

De Facultatibus

	Frig.	Hum.
Dorychnium	4.	4.
Dulcis radx	temp.	1.
Epimedium		
Fungi	4.	3.
Helxine		
Hieracium maius		
Hieracium minus.		
Lactuca satiua	2.	2.
Lactuca syluest.		
Lens palustris		
Mala persica	2.	2.
Mala communia		
Mala Armenica		
Malua		
Marinus phucus		
Medica		
Muris auricula		
Opium	4.	4.
Papauer erratic.	4.	4.
Papauer satium	3.	3.
Platanus		
Portulaca	3.	2.
Potamogetum	2.	2.
Pulicaris herba	2.	temp.
Sideritis		
Solanum somnif.	3.	3.
Solanum manicum.		
Stratiotes aquatica.		
Sycomorus.		
Veneris umbilicus.		

Veneris

Frig. Hum.

Veneris umb. alt.
Viola purpurea.

SIMPLICIA frigida, & sicca, in
primo, secundo, tertio, & quarto or
dine, Quæ autem numeros non ha-
bent, non explicauit Galenus.

Frig. Sic.

Acatia	2.	3.
Acetum		3.
Achillea		3.
Acinus		
Agrestis olea		
Amylum		
Arbutus		
Argenti recrementum		
Argenti spuma		
Aspalatus		
Alga marina	2.	2.
Balauftium		
Braslica		
Britannica		
Centunculus		
Cerussa		
Cistus		
Clymenum		
Condrylla	2.	2.
Corallium		
Cornus		
F 2		Coronopus

Si

Si mpl. Medic. 63
Frig. Sic.

Olea agrestis
Olostium
Omphacium
Orobanche
Oxyacantha
Oxyſchēnus
Paluirus
Palma
Palma elate
Panicum
Pæoian
Perſea
Phyllitis
Phænix
Picea
Pirus
Pira
Plantago
Platanus
Plumbago
Plumbarius lapis
Plumbum elotum
Pulicaris herba.
Punica mala
Quercus
Radix Idea
Rhamnus
Rosa
Rubus
Rubus Ideus

1. 2.

2. temp.

F 3 Salix

De Facultatibus

	Frig.	Sic.
Salix		
Sanguinalis		
Sedum maius	3.	leuiter
Sedum minus	3.	leuiter
Sentis canina		
Sesamum	temp.	leuiter
Siliquæ		
Solanum hortense	3.	1.
Solanum sommis.	3.	
Sorba		
Sonchus		
Spina Arabica		
Spodium		
Stibium		
Terra erethria		
Terra samia		
Terra cimolia		
Terra pinguis		
Tilia		
Tomentum		
Tragium alterum		
Tragus herba		
Tribulus		
Tricomanes	temp.	

Simplicia

SIMPLICIA

QVAE TEMPERA-

ta iudicantur.

A Diantum	} in caliditate, & siccitate.
Argenti recrementū.	
Argenti spuma	
Asparagus	
Cera in omnibus	quatuor qualitatibus.
Dulcis radix	in calid. & frig.
Eryngium	in calid. & frig.
Faba	in calid. & sicc.
Halimus	in calid. & sicc.
Lens	in calid. & sicc.
Lentiscus	in calid. & frig.
Lini semen	in hum. & sicc.
Lotus sativa	in calid. & sicc.
Mastiche	in calid. & sicc.
Sesamum	in calid. & frig.
Trichomanes	in calid. & sicc.

Simplicia tenuis essentia.

Arctium	Anethum
Argemone	Anthemis
Acanthus	Aparine
Acetum	Apium sativum
Acorus	Apium montanum
Agaricus	Adiantum
Ammi	Aristolochia rot.
F 4	Artemisia

De Facultatibus

Artemisia	Hypericum
Asarum	Hyssopus
Ascyrum	Iasme
Asplenium	Iris
Baccharis	Iuniperus
Botrys	Iuncus odoratus
Calamus odoratus	Ladanum
Capnos	Leucoium
Carpesium	Ligusticum
Casia	Lycium
Castoreum	Macer
Cinnamomum	Mala citria
Circea	Malabathrum
Clynopodium	Menta sativa
Coris	Milium
Crocus	Moly
Cuminum	Myrrhis
Daucus	Myrtus
Dictamnium	Napum
Ebenus	Nepeta
Elaterium	Nasturcium
Epithymum	Nigella
Erica	Ocimum
Eryngium	Ocimastrum
Eupatorium	Onobrichis
Euphorbium	Origanum
Ficus	Origanum sylvestre
Geranium	Paronychia
Glycis. i. pæonia	Parthenium
Gramen	Petroselinum
Harundo	Peucedanum

Phalan.

Phalangium	Sisymbrium.
Phalaris	Sium
Piper omne	Spartium
Pistacia	Spina alba
Polemonia	Sphondylium
Populus nigra	Stachis
Propolis	Sulphur
Pseudo dictamnium	Tamarix
Psarmica	Teucrium
Pulegium	Thapsia
Pyrethrum	Thlaspi
Quinque folium	Thymbra
Rha Ponticum	Thymus
Rhodia radix	Tordilium
Rhabarbarum	Tragium
Sabina	Tragoriganum.
Sagapenum	Veratrum
Sampsuchum	Vitex
Schænianthos	Vrtica.
Seseli	Xyris.

Simplicia crassæ essentiaæ.

Acatia	Auripigmentum	
Alumen	Buccina	
Amurca	Cacalia	
Arbutus	Casens.	
Argenti spuma	Centaurium ma.	
* Arum	Capea	* dub
Alga	Cera	tandum
Atramentū metallicū	Cerussa	
	F 5	Chalcitis

De Facultatibus

Chalcitis	Plumbago
Chrysocolle.	Plumbarius lapis
Concula Indica.	Plumbum elotum
Cucumis sativus	Plumbum ustum
Ephemerum	Pompholyx
Fax	Populus alba
Galla	Potamogetum
Glaucium	Psoricum
Hypecoum	Radix Idea
Hypocistis	Rha Ponticum
Lentiscus	Recrementum fer-
Ligusticum	ri
Lycium	Rubrica Synopica
Lysimachia	Rubrica fabrilis
Macer	Sal
Melanteria	Sesamum
Mespila	Sori
Misy	Sonchus
Myagrurn	Spina Arabica
Myrtus	Squama aeris
Nitrum	Stachas
Ochra	Terra lemnia
Oxychaenus	Terra Erethria
Paliurus	Terra Samia.
Palma	Terra Selinusia
Palma elate	Testæ marinae
Papaveris liquor.	Tubera
Phyllitis	Thuris fuligo
Picea	Thuris cortex
Plantago	Viscum

Simplicia

Simplicia dissimila-
rium partium.

Aspalathus	Gingidium
Aster Atticus	Glaucium
Atramentum sut.	Glans ung.
Brassica	Halimus
Bulbus esculentus	Hedera
Calamus odoratus	Isatis sativa
Capparis	Isopyrum
Centaurium ma.	Iuncus
Centaurium mi.	Lapis phrygius
Chalcitis	Lapis gagates
Chrysocome	Lapis ostracites
Cinis sarmentitius	Ligustrum
Cinnabaris	Licium
Coccum infectorium	Macer
Coriandrum	Mala citria
Cratægonum	Malabathrum
Cuppressus	Melilotus
Cyperus	Morus arbor
Cytisus	Myrtus
Diphryges	Mastiche
Dracunculus ma.	Nardus
Dryopteris	Paliurus
Ephemerum	Pæonia
Fæx uini	Phis
Filix	Pira
Folium	Plantago
Fumaria	Polygonatum
	F 6 Popu-

De Facultatibus

Populus alba	Stachys
Psorium	Symphytum pe --
Rha	treum.
Rosæ	Terra cimolia
Rubia	Terra pinguis
Rubus	Tribulus
Rumex	Tubera
Ruscus	Veneris umbilicus
Scordium	Viscum
Senecio	Vitis alba
Sideritis	Vitis nigra
Sonchus	Vlmus

Simplicia acrimoniam habentia.

Abrotonum	Aqua marina
Acetum	Argemone
Acornis	Arisarum
Adarces	Aristolochia rot.
Aegilops	Arum
Aerugo	Asarum
Aesulum	Aspalathus
Allium	Asphodelus
Alypum	Atramentum sut.
Ammi	Bdellium
Amomum	Calamus odoratus
Anagyris	Capnos
Anchusa altera	Capparis
Anemone	Cardamomum
Anisum	Carum

Casia

Casia odorata	Flos æris
Caucalis	Fœniculum
Centaurium m.	Fœniculum sylus.
Chalcitis	Folium
Chamelæo albus	Fumaria
Chamæpitrys	Gallium.
Chamædaphne	Gramen.
Chamæfice	Granum Cridium
Chelidonium ma.	Halcyonium
Chelidonium mi.	Halimus.
Chrysocome	Hedera
Chrysocola	Hidropiper
Cinis sarmentitius	Iberis
Cinnabaris	Iris
Coagulum	Irio
Conyza	Isatis siluest.
Coris	Iuniperus
Costus	Lapis Phrygius
Crocodylium	Lapis ostracites
Cupressus	Lapis thýtes
Claminus.	Lapis smyris
Cuminum utrumque	Laserpitium
Daphnoides	Laureola
Dictamnus	Laurus Alexa.
Dictamnus creten.	Leontopetalum
Diphryges	Leucas
Dracunculus ma.	Lolium
Dracunculus mi.	Macer
Dryopteris	Mali citrei cortex
Fæx	Malabathrum
Ficus	Melanteria

Menta

De Facultatibus

<i>Menta</i>	<i>Piarmica</i>
<i>Meum.</i>	<i>Pulegium</i>
<i>Moly</i>	<i>Pychnocomum</i>
<i>Nardus omnis</i>	<i>Quinquefolium</i>
<i>Nasturcium.</i>	<i>Radicula</i>
<i>Nepeta.</i>	<i>Rha Ponticum</i>
<i>Oculus bubulus</i>	<i>Rhanunculus</i>
<i>Ophioscorodon</i>	<i>Raphanis</i>
<i>Olus atrum</i>	<i>Ruta</i>
<i>Ononis</i>	<i>Sabina</i>
<i>Onosma</i>	<i>Sagapenum</i>
<i>Orminum sativum</i>	<i>Salis flos</i>
<i>Origanum</i>	<i>Sardonia herba</i>
<i>Origanum sylvestre</i>	<i>Scandix</i>
<i>Pancratium</i>	<i>Scilla</i>
<i>Peonia</i>	<i>Scordium</i>
<i>Peplis</i>	<i>Satureia</i>
<i>Peplos</i>	<i>Seseli</i>
<i>Periclymenum</i>	<i>Sinapi</i>
<i>Petroselinum</i>	<i>Smilax aspera</i>
<i>Phu</i>	<i>Smyrniun</i>
<i>Pityusa</i>	<i>Sphondylium</i>
<i>Pix liquida</i>	<i>Stachys</i>
<i>Pix sicca</i>	<i>Staphylinus</i>
<i>Polium</i>	<i>Staphysagria</i>
<i>Polygonatum</i>	<i>Testæ marinæ comb.</i>
<i>Porrum</i>	<i>Thlaspi</i>
<i>Porrum agreste.</i>	<i>Thaspia</i>
<i>Pseudobunium</i>	<i>Thymælea</i>
<i>Pseudodictamnium</i>	<i>Tymbra</i>
<i>Psorium</i>	<i>Tithymali</i>

Tordy.

Tordylium	Viscum
Tragoriganum	Vitex
Tripolium	Vitis alba
Tussilago	Vitis nigra
Veratrum alb.	Vitis sylvestris
Veratrum nigrum	Zingiber
Veronica	

Abstergentia.

Abrotonum	Asphodelus
Absinthium omne	Atramētū sutorium
Acetabulum	Atriplicis semen.
Acorus	Beta
Aeris squama	Bdellium
Aerugo	Brassica
Agaricus	Brassica sylvest.
Alisma	Buccina
Aloë	Bulbus esculentus
Amygdala amara	Cadmia
Anullis	Canchamum
Antirrhinum	Capnos
Aparine	Capparis
Apiastrum	Cardamomum
Arctium	Centaurium m.
Argemone	Cepa
Argentispuma	Chamædrys
Aristolochia utraq;	Chamædaphne
Arum	Chamæleon
Asarum	Chamælea
Asparagus	Chamæpitys
	Chamæ-

De Facultatibus

Chamaesyce	Foenogrecum
Chelidonium mi.	Flos aeris
Chondrylla	Fumaria
Chrysocolla.	Gentiana
Cicer	Glans unguentar.
Cinis sarmentitius	Glandes
Cinnamomum	Granum infectorium
Clinopodium	Halcyonium
Colocynthis	Harundo
Conyza	Hedera terrestris
Conchula Indica.	Hedysarum
Costus	Helsine
Cucumis sativus	Hemerocallis
Cucumis sylvest.	Hordeum
Cyclaminus	Hyacinthus
Diphryges	Labrusca
Dracunculus ma.	Lanaria herba
Dulcis radix	Lampsana
Dryopteris	Lactuca sylvest.
Ebenus	Lapis Armenius
Elaterium	Lapis chalcitis
Eliotropium	Lapis pyritis
Equisetum	Lapis Asius
Eruum	Lapis ostracites
Eupatorium	Lapis opithes
Euphorbium	Lapis thijtes
Faba	Leucacanta
Fel	Leucoium
Fex	Libanotis altera
Ficus	Lichen
Filix	Lilium

Litos-

Liospermum	Pichnocomum
Litargyrum	Quinque folium
Lotus sylvestris	Radicula
Lupini	Ricinus
Lycium	Rubia
Marum	Sagapenum
Marrubium	Salis spuma
Mel	Scamonia
Misy	Scandix
Myrrha	Scordium
Narcissus	Scilla
Nasturcium	Sepiæ testa.
Nepeta	Sesamoides utrumq;
Nigella	Sideritis
Nitrum	Sifera
Nymphaea	Sisymbrium
Ononis	Sisymbrium alter
Onosma	Solaris maior
Orminum sativum	Spuma argenti
Osyris	Stoechas
Panacis radix	Sulphur
Pancratium	Tamarix
Papaver corniculare	Telephium
Parthenium	Terra samia
Phu	Terra chia
Pistacia	Terra selinusfa
Ptyusa	Terra melia
Pix utraq;	Tithimalus
Plantago	Trissago
Populus alba	Veneris umbilicus
Purpura	Veratrum album
	Veratrum.

De Facultatibus

Veratrum nigrum	Vitis alba
Verbascum	Vitis sylvestris
Vetonica	Vitis nigra
Viola Alba	Vitis Vinifera
Viscum	Vlmus

Adurentia .

Adarces	Iberis
Aerugo	Lanaria herba
Allium	Melantheria
Asius lapis	Misy
Atramentū sutorium	Ochra
Auripigmentum	Pancratium
Buprestis	Psorium
Calx uiua	Ptarmica
Cantharides	Pulegium
Calamintha	Pulmo marinus
Chalcantum	Ranunculus
Chalcitis	Sala
Chelidonium mi.	Sardonias herba
Cinis ficulneus	Scilla
Clematidis alc.	Sinapis
Dracunculus	Staphisagria
Dryopteris	Tapfia
Erucae pinorum	Thymelea
Euphorbium	Tithymali
Fex usta	Veratrum album
Hydropiper	Vrtica

Aperien-

Aperientia.

Abrotonum	Chamædrys
Absinthium	Chamæpitys
Acorus	Cicer rubrum
Adiantum	Cichorium
Agaricus	Cinnamomum
Aloe	Costus
Amaracus	Crithamus
Ammi	Cuscuta
Antehemis	Cyclaminus
Apium	Daucus
Aristolochia	Eupatorium
Artemisia	Eryngium
Asarum	Feniculum
Asparagus	Gentiana
Asplenum	Hyacinthi semen
Aspodelus	Hyssopum
Atriplicis sem.	Iris
Amygdalæ amaræ]	Iris
Betonica	Iuniperus
Brassica	Laurus
Calamintha	Libanotis
Canchamum	Lichen
Capparis	Ligusticum
Carduus	Marubium
Carpesium	Melissophyllum
Cæpa	Melopeponum sem.
Centaureum ma.	Mentastrium
Centaureum mi.	Meum
	Myrica

De Facultatibus

Myrica	Rosmarinum
Myrrha	Rubia
Napi semen.	Ruscus
Nardus utraq;	Sabina
Nigella	Scilla
Ononis radix	Scordium
Origanum	Sphondylium
Oxylapathum	Sinapi
Partinaca syluest.	Sium
Petroselinum	Smyrnium
Peucedanum	Squinanthum
Pistacia	Sulphur
Polium	Thymus
Pulegium	Tymbra
Raphanus	Trichomanes
Rhaponticum	Verbenaca
Rhabarbarum	Vrtica
Rosarum succus	

Astringentia.

Abrotonum	Ashea modicè
Absinthium	Alumen
Acatia	Ambrosia
Acetabulum	Anchusa
Acetum	Aphaca
Achillea	Arbutus
Acinus	Argenti vercemētum
Aes crematum	Argenti spuma
Agaricum	Aspalathus
Aloe	Astragalus

Alga

Alga marina	Cynosbatus
Atramentū sutorium	Cyperus modicè
Baccharis	Diphryges
Baluiſtium	Dracunculus ma.
Beta nigra	Dryopteris
Brasſica	Ebur
Britannica	Elatine
Bromos	Ephemerum alterum
Bulbus eſculentus	Equiſetum
Calamus odorat.	Eupatorium
Capnos	Fæx vini
Capparis	Ferula
Centaurium ma.	Filix
Centunculus	Fumaria
Ceratia	Gallæ.
Chalcanthum	Gingidium
Chalcitis	Glandes
Chryſocome	Glans ungunt.
Chryſocolla	Glycyrrhiza
Cichorium	Gnaphalium
Cinnabaris	Granum inſectorium
Ciſtus	Gypſum
Clymenum	Halimos
Colymbades	Hedera
Condrylla	Hedysarum
Corallium	Helſine
Coriandrum	Hemerocallis
Cornus	Hemionitis
Coronopus	Hieracium utrumq;
Crocus modicè	Hyacinthus
Cupreſſus	Hypociſtis
	Intybus

De Facultatibus

Intybus utraque	Malabathrum
Isatis	Manna thuris
Isopyrum	Malum
Iuglans	Mastiche
Iuniperi baccæ	Medium
Ilex	Melilotus
Labrusca	Melanteria
Ladanum	Menta
Lapis Armenius	Mespila
Lapis Phrygius	Misy
Lapis hematites	Morus
Lapis scissilis	Muscus
Lapis ostracites	Muscus marinus
Lapis magnes	Myrtus
Lapis Geodes	Nardus omnis
Lens	Nimphaea ale.
Lemti scus	Ochra
Leporinus pes	Olea agrestis
Ligustrum	Oleum acerbum
Limonium	Olostium
Lotus arbor	Omphacium
Lycopsis	Oriza
Lycium	Oxiacantha
Lyfimachia	Paliurus
Malum punicum ac.	Palma
Macer	Palma elate
Malicorium	Paonia
Malum cydonium	Persea
Mala orbiculata	Personata
Mala sylvestria	Phanix
Mala Persica	Phu
	Phyllitis

Phyllitis	Salvia
Picea	Salix
Pinus	Scordium
Pirus sylvest.	Sedum maius
Plantago	Sedum minus
Plumbarius lapis	Sentis canina
Plumbum elotum	Sideritis
Polygonatum	Sifer
Poligonum	Solanum
Polypodium	Solanum uesticarium
Portulaca	Sori
Potamogeton	Sonchus
Pruna sylvestria	Spina alba
Pforicum	Spina Arabica
Punica mala	Spodium
Quercus	Squama aris
Radix Idea	Stibium
Radix rhodia	Stæchas
Recrementum plumbi	Stabe
Recrementum argenti	Stratiotes
Rhaponticum	Symphyti petreum
Rhus	Simphitum magnum
Rosa	Tamarix
Rubia	Terebinthus
Rubrica synopica	Terra lemnia
Rubrica fabrilis	Terra erethria
Rubus	Terra cimolia
Rubus Idæus	Terra pinguis
Rumex	Terra melia
Sal	Tilia
Salis spuma	Tomentum
	Tragium

De Facultatibus

Tragium alterum	Vitex
Tragorigonum	Vitis alba
Tragos	Vitis nigra
Tribulus	Vitis uinifera
Thuris cortex	Vlmus
Thus	Vinacei
Veneris umbilicus	Vua acerba
Verbascum	

Attrahentia.

Amaracus	Dracunculus mi.
Ammoniacum	Elaterium
Anagallis utraq;	Eryngium
Anagyris	Fæx usta.
Anchusæ radix.	Galbanum
Anemone	Gentiana
Apium	Gladiolus
Aristolochia rot.	Harundo
Baccharis rad.	Hedera
Bdellium	Helenium
Botrys	Heliotropium
Bulbi esculenti	Iris
Centaurium ma.	Lacertæ caput.
Centaurium mi.	Laserpitium.
Cicer	Magnes lapis.
Cochleæ terrestres	Mastiche.
Cyclaminus	Narcissus
Dictamnus	Nepeia.
Dictamnus cret.	Nitrum
Dracunculus ma.	Onosma
	Opopanax

Opopanax	Rubia
Oxyacantha	Sagapenum
Panacis rad.	Seseli Massiliense
Pastinaca sylvest.	Siluri falsi caro
Personata	Sinapi
Pix	Sulphur
Propolis	Thapsia
Pseudictamnus	Tragium
Pycnocomum	Veratrum nigrum
Pyrethrum	Verbascum
Ranunculus	Viscum
Resina omnis	Xyris

Cientia.

Ageratum	Aristolochia longa
Albium	Artemisia
Alisma	Asarum
Ammi	Ascyrum
Amygdala amar.	Asphodelus
Anagyris	Atramentum futo.
Androsaces	Atriplex
Anemone	Balsamum
Anisum	Bdellium
Antemis	Bitumen
Apium sativum	Brassica
Apium sylvestre	Bulbus vomitorius
Apium palustre	Calamus odoratus
Apium montanum	Canchamum
Apium grande	Cantarides
Apiasitrum	Capnos
	G Capparis

De Facultatibus

Capparis	Dictamnus cret.
Carduus	Dracunculus ma.
Carpesium	Dracunculus mi.
Carum	Elaterium
Casia	Epithymum
Castoreum	Eriuum
Caucalis	Eruca
Cedri fructus	Eryngium
Centaurium ma.	Fel
Centaurium mi.	Ferula
Chamaepitys	Feniculum sativum
Chamaedaphne	Feniculum syl.
Chrysocome	Folium
Cicer	Fumaria
Coniza	Gingidium
Coris	Granum Cnidium
Costus	Gutta Ammoniacæ
Crocus	Helichrysum
Crocomagma	Hypericum
Crocodilium	Iasme
Cucumis sativus	Inula
Cucumis sylvestris	Iris
Cyclaminus	Irio
Cyminum	Iuniperus
Cyminum sylvestre	Iuniperi bacce
Cyperus	Lactuca sylvest.
Cytisus	Lanaria herba
Daphnoides	Laureola
Daucus	Laurus Alex.
Daucus sylvestris	Leontopetalum
Dictamnus	Lencoium

Libano-

Libanotis	Petroselinum
Ligusticum	Peucedanum
Lytospermum	Phaselus
Lonchitis	Phu
Malum Cydonium	Piper
Mala orbiculata	Polium
Mala citria	Porrum capitatum
Malabathrum	Porrum agreste
Milium	Pseudobunium
Moly	Pseudodictamnus
Myrrhis	Prarmica
Napum	Pulegium
Narcissus	Radicula
Nardum	Ranunculus
Nardum Celticum	Raphanus
Nardum montanum	Rapum
Nepeta	Ricinus
Nigella	Rubia
Ocimum	Ruscus
Oesypus	Ruta
Olea Athiop. lach.	Ruta sylvestris
Onobrychis	Sabina
Ononis	Sagapenum
Origanum	Salis flos
Orminum sativum	Salvia
Paliurus	Sampuscum
Panax	Sardonia herba
Pancratium	Satyrium
Pastinaca erratica	Satirium alterum
Peonia	Scandix
Periclymenum	Scilla
	G 2 Sciricus

De Facultatibus

Sciricus	Thlaspi
Scordium	Thymbra
Scorodoprassum	Thymus
Scolymus	Tilia. i. phyllirea
Serpyllum	Tordilum
Seseli	Tragium
Silique	Tragoriganum
Sinapi	Trichomanes
Sison	Trifolium
Sifer	Trixago
Sisymbrium alterum	Veneris umbilicus
Sium	Veratrum album
Smilax hortensis	Veratrum nigrum
Smyrniun	Vetonica
Solanum somnificum	Vitis alba
Solanum uesticarium	Vrtica
Solaris maior	Xyris
Terra lemnia	Zingiber

Contrahentia.

Arbutus	Galla
Acatia	Glandes
Aescrematum	Glans unguentaria
Agrestis olea	Lapis gagates
Alumen	Lapis Thracius
Atramentum sut.	Lapis morochius
Balaustium	Lysymachia
Chalcitis	Malicorium
Empetron	Mespila
Flos eris	Melanteria
Flos salis	Misy

Myrtus

Myrtus	Rubus
Myrtidanum	Sorbus
Nitrum	Sori
Palma	Spina alba
Palma elate	Spina Arabica
Pinus	Squama æris
Piraster	Struthia cydonia
Quercus	Spongiæ

Deleteria.

Aconitum	Chamaeleo
Aeris squama	Chrysocollo
Aerugo	Cholchicum
Agaricus niger	Colocyntis
Anacardium	Conandrum
Apocymum	Cyclaminus
Argenti spuma	Daphnoides
Argentum uiuum	Dorycnium
Arsenicum album	Dracunculi semen
Auripigmentum	Elaterium
Buprestis	Eruca pinorum
Bryonia	Euphorbium
Calx	Flammula
Canis piscis fel.	Fellis cerebrum
Cantharides	Ferri scobs
Costoreum malum	Fungi
Cerusa	Gypsum
Chalcantum	Geniste semen
Chalcitis	Hyoscyamus
Chamaedaphne	Ixia
Chamaelea	Lapis Armenius
	G 3 Lapis

De Facultatibus

Lapis Cæruleus	Salamandra
Lapis Magnes	Sandaracha
Latyris	Sanguis menstruus
Lepus marinus	Sanguis taurinus
Mandragoras	Sardonia herba
Mel heracleaticum	Scamonium
Minium	Scilla
Nerium	Solanum manicum
Nux vomica	Staphisagria
Opium	Sudor quadrupedum
Opocalpasum	Taxus
Papauer cornic.	Thapsia
Pardi fel.	Thymelea
Pityusa	Toxicum
Pharicum	Turpetum
Plumbi scobs	Viperæ fel
Psorium	Veratrum alb.
Psyllium	Veratrum ni.
Rana rubeta	Vitis alba
Ricinus	

Discutientia.

Abrotonum	Anisum
Acanthus sat.	Anthemis
Acanthus sylvest.	Aparine
Acetabulum	Apium omne
Adiantum	Apiastrum
Ammi	Apocinum
Anagyris	Argemone
Androsaces	Aristolochia ros.
Anethum	Aristolochia longa
	Asclepias

Asclepias	Crocodilium
Asphodelus	Cucumis sylvest.
Aster Atticus	Cyclaminus
Atriplex	Cuminum
Beta	Cuminum sylvest.
Bitumen	Daucus
Brassica agrest.	Dictamnus cres.
Bromus	Ebulus
Buphthalmum	Elatarium
Butirum	Fex
Canabis utraq;	Fusus agrestis
Capparis	Galbanum
Carum	Galiopsis
Cassia	Geranium
Cassius nectus	Gladiolus
Castoreum	Gutta ammoniac
Caucalis	Halcyonium
Cedrus	Harundo
Cera	Hauena
Chamaeleo alb.	Hemerocallis
Chamaeleo ni.	Hordeum
Chamaepitys	Hydropiper
Chamaefice	Iasme
Chelidonium ma.	Iris
Chrysanthemum	Isatis sativa
Cicer	Iuglundes
Cytisus	Ladanum
Clynopodium	Lampsana
Coagulum	Lanaria herba
Colus rustica	Lapis Phrygius
Coriandrum	Lapis pyrites
	G 4 Lapis

Lapis gagates	Oleum ricininum
Lapis thracius	Oleum raphaninū
Lapis alabastrites	Oleum melanthinum
Leontopetalum	Oleum picinum
Leucas	Olus atrum
Libanotis	Onobrichis
Libanotis alb.	Paliurus
Ligusticum	Panax
Ligustrum	Pancratium
Lilium	Paronychia
Lini semen.	Personata
Lolium	Petroselinum
Lupini	Peucedanum
Lycium	Piper
Malua	Pix liquida
Marrubium	Pix sicca
Melilotus	Pix Zopissa
Menta	Pseudo bunium
Meum	Psarmica
Mercurialis	Pycnocomum
Moly	Quinquefolium
Muscus	Radicula
Nastusium	Radix rhodia
Nepeta	Rhamnus
Nerium	Raphanus
Nigella	Raphanus agrest.
Nitrum	Ricinus
Nitri spuma	Rotundus odiuncus
Ocimum	Rumex
Oculus botis	Ruta
Oleum uetus	Ruta sylvestris

Sabina

Simpl. Medic. 77

Sabina	Terra ampelius
Sal	Testa marina lota
Salis spuma	Tapfia
Salis flos	Tragium
Sambuchus	Tragoriganum
Sampsuchum	Trichomanes
Sandaracha	Veneris umbilicus
Scamonium	Verbasum
Senecio	Viscum
Sisymbrium utrunq;	Vitis
Sium	Vrtica
Smyrnum	Vua
Spongia	Xyris
Terra cimolia	Xanthium
Terra pinguis	Zingiber

Emollientia.

Acanthus	Butyrum
Adeps omnis	Cepa cocta
Althæa	Cucumis sylvest.
Ammoniacum	Cydoniorum semen.
Amurca	Ficus sicca
Anthemis	Fenogracum
Aqua tepida	Galbanum
Bdellium	Hemerocallis
Beta alba	Hippoglossum
Bitumen	Iris
Brassica	Lac
Bulgosum	Ladanum
Buphtalmus	Lana succida
	G 5 Lilium

De Facultatibus

Lilium	Opopanax
Lini semen.	Paneratium
Loti sylvestris semen.	Phaselus
Malua	Psyllij semen.
Mastiche	Resinae omnes
Medulla	Sapa
Mel	Scilla
Melilotus	Sesamnum
Oesypus	Stercus bubulum
Oleum oliuarum	Viola purpurea
Oleum amygd. dul.	Vlmi radix.
	Vnae passae

Emplastica.

Adeps omnis recens	Lilium
Alibea	Lupini
Amylum	Malua
Bdellium	Medulla
Butyrum	Mel
Cacalia	Mucago omnis
Cerussa	Myagrum
Cera	Nuclei pinei
Cachlea	Oesypus
Chondrus	Oleum
Fermentum	Sarcocolla
Fenogrecum	Sesamum
Ficus	Thus
Gummi	Tragacantha
Gypsum	Triticea farina
Iris	Triticus panis
	Vnae passae

Aeris

Epulotica.

Aeris squama	Eupatorium
Aerugo	Fæx uini usta
Aes uſtum	Fornacea teſtæ uſta
Aloe	Galla omphacitis
Alumen uſtum	Malicorium
Aquæ aluminosæ	Miſy
Argentis puma	Mituli uſti eloti
Aſy lapidis flos	Molybdena
Balaustiā	Myrobalani
Buccinæ putamen	Myrti bacca
Cadmia	Oſtreorū putamina
Calx lota	Ponpholyx
Ceruſſa	Plumbum elotum
Chalcitis	Pumex
Concula Indica	Purpura cremata
Corallia	Spodium
Diphryges	Scoria plumbi
Eryſimi Sem.	Stibium

Exedentia.

Adarces	Arsenicum
Aerugo	Aſius lapis
Aeris flos	Aſy lapidis flos
Aeris squama	Auripigmentum
Aes uſtum	Calx
Alumen	Cantharides
Aqua ſaponis	Ceruleus lapis
Argentum uiuū ſub.	Chalcantium
Argent. ui. præcip.	Chalcitis

G 6 Di.

De Facultatibus

Diphryges	Psoricum
Melanteria	Sori
Misy	Stibij oleum
Ochra	

Expurgantia.

Absinthium	Centaurium mi.
Adiantum	Cæpe
Amygdala ama.	Chamæpitys
Anagallis utraq;	Chelidonium ma.
Anemone	Chelidonium mi.
Apiastrum	Chrysocolla
Apios	Cicer
Aqua maris	Cinnamomum
Argemone	Circea
Aristolochia rot.	Clematis altera
Arum	Cnicus
Asclepias	Colocynthis
Atramentum sutoria	Colymbades
Ballote	Concula Indica
Balsamum	Crocodilion
Beta	Cucurbita usta
Buccina	Cucumis sativus
Butyrum	Cucumis sylvest.
Capparis	Cyclaminus
Cardui succus	Cyclaminus alt.
Caries lignorum	Daphnoides
Carpesium	Dictamnus Cretensis
Cedrinus liquor	Dictamnus
Centaurium ma.	Dracunculus maior
	Ebulus.

Ebulus	Linifemen.
Elaterium	Lotus sativus
Empetrum	Lichnis agrestis
Epithymum	Mandragora
Eruum	Marrubium
Eupatorium	Mel
Faba	Melantheria
Ficus	Mercurialis
Flos aris	Mora matura
Fumaria	Mori rad. decoctum
Gentiana	Myagros
Genista	Myrrha
Glans unguent.	Myrrhis
Granum Cnidium.	Narcissus
Gutta Ammoniaca	Nasturcium
Hedera	Nitrum
Hedysarum	Oenanthe herba
Hippophaesum	Oleumel
Hippophaes	Olus atrum
Hyssopus	Orobis
Iris	Origanum
Iris	Orminum
Isopyrum	Cithonna
Juniperi bacca	Paliurus
Lactuca sylvest.	Pancratium
Lanaria herba	Papaver cornic.
Lapis Armenius	Papaver spumeum
Lapis Indicus	Parthenium
Lapis chalcitis	Pastinaca
Leucantha	Paonia
Libanotis	Peplis
	Peplos

De Facultatibus

Peplos	Sambucus
Peucedanum	Scamonium
Piper	Scandix
Pistacia	Scilla
Pityusa	Scordium
Polium	Sesamoides ma.
Polygonatum	Sesamoides mi.
Polypodium	Siliqua
Porrum capitatum	Solaris maior
Porrum agreste	Spartum
Pruna	Spodium
Pseudodictamnium	Sphondylium
Ptarmica	Squama aris
Pulegium	Staphylinus
Pumex	Staphysagria
Purpura	Stibium
Pychnocomum	Stachas
Radicula	Sulphur
Rha ponticum	Symphitum petraeum
Rha barbarum	Terebinthus
Recrementū plumb.	Testiculus
Recrementum argēsi	Testiculus alter
Ricinus frutex	Terra melia
Rubia	Thlaspi
Ruscus	Thaspia
Sabina herba	Tholypieris
Sagapenum	Thymelea
Sal	Thymbra
Salis spuma	Thymus
Salis flos	Tubymalus
Salvia	Tordylum
	Tragoriga-

Tragoriganum	Verbenaca
Trichomenes	Vetonica
Trifolium	Vitex
Tripolium	Vitis alba
Trixago	Vitis nigra
Thus	Vitis sylvestris
Thuris manna	Vlmus
Thuris faligo	Vrtica
Veratrum album	Zingiber
Veratrum nigrum	

Extenuantia.

Abrotonum	Balsamum
Absinthium seriph.	Brassica agrestis
Acetum	Butyrum
Acorus	Canchamum
Adiantum	Castia
Allium	Castoreum
Anni	Cedrinus liquor
Anomum	Cinnabaris
Aparine	Cinnamomum
Apium sativum	Clinopodium
Apium sylvestre	Coris
Apium palustre	Cucumis sylvest.
Apium magnum	Cuminum
Austolochia rot.	Cuminum sylvest.
Asarum	Daucus
Asphodelus	Daucus sylvest.
Asplenos	Dictamnus
Baccharis	Dictamnus cret.
	Dracunculus

De Facultatibus

Dracunculus ma.	Piper
Dracunculus mi.	Polemonia
Elaterium	Populus niger
Fel	Pseudodictamnus
Ferula	Ptarmica
Ficus	Pulegium
Gentiana	Quinquefolium
Iris	Sabina
Irio	Sagapenum
Iuglandes	Sal
Iuniperi fructus	Salis spuma
Lapis chalcitis	Sampsuchum
Lapis spongie	Sinapi
Lasertium	Sisymbrium
Ligusticum	Sisymbrium als.
Marrubium	Stachas
Opopanax	Symphytum pe-
Origanus	tracum
Panax	Thymbra
Panonychia	Thymus
Pastinaca sylu.	Tragoriganus
Peucedanus	Trichromanes

Extrahentia.

Acute spine ra-	Bulbi
dix	Cochlea terre st.
Ammoniacum	Dictamnus
Anagallis utraq;	Dictamnus cret.
Aristolochia rot.	Dracunculus ma.
Arum	Dracunculus mi.
	Elaterium

Elaterium	Pichnocomum
Eryngium	Pix sicca
Galbanum	Resinae omnes
Gladioli radix	Sagapenum
Harundo	Sinapi
Lacerae caput.	Tragium
Narcissi radices	Verbasci semen.
Opopanax	Xyridis radix
Orminum	

Glutinantia.

Achillea	Coccum infect.
Aloe	Cupressus
Althaea	Cyclaminus
Amurca	Dracunculi folia
Andosemum	Equisetum omne
Anthyllis	Erigerum
Argemone	Fagus
Betonica	Filix
Bitumen	Glycyrrhizae suc.
Brassica	Graminis radix
Brassica sylvest.	Gypsum
Britannica	Hedera
Bulbus esculentus	Hypericum
Cesius	Hypocistis
Centaurium ma.	Illicis pilula
Centaurium minus	Isatis
Costus	Lapis gagates
Clymenum	Lapis Thracius
Conyza	Lapis morochtus

Lens

De Facultatibus

Lens	Querna folia
Lonchitis alt.	Resinae omnes
Lisimachia	Salix
Malicorium	Sambucus
Mel	Sarcocolla
Mespili folia sic.	Scordium
Millefolium	Sideritis omnis
Myrrha	Smyrniū
Narcissus	Spongia
Ocini semen.	Stabe
Oesypus	Stratiotes millefoliū
Olea syluest.	Sycomorus
Oua	Symphytum magnū
Palmula immatura	Symphitum petraeū
Papyrus	Terra lemnia
Picea	Terra erethria
Pirus	Thuris manna
Pix sicca	Thus
Plantago	Tiliae cortex
Polium	Tragoriganum
Polychnemum	Verbascum
Potamogetum	Verbena
Polygonatum	Vitex
Polygonum utrunq;	Vlmi cortex
Poterij radix	Vlmi folliculorū hu-
Punicorum cytini	mor
Quinque folium	

Incidentia.

Abrotonum	Acanthus
Absinthium seriphum	Acetum

Agari.

Agaricum	Iuniperi baccæ
Allium	Lepidium
Amygdalæ amara	Leucacantha
Anagryis	Labanotis
Anemone	Libanotis alt.
Arum	Ligusticum
Casia	Marrubium
Castoreum	Marum
Cedria	Meum
Chamæpityis	Moly
Chelidonium ma.	Nasturcium
Chelidonium mi.	Nepeta
Cepa	Nigella
Cicer	Nitrum
Coagulum	Nitri spuma
Conyza	Orobus
Cucumis sylvest.	Ononis
Cyclaminus	Origanum
Cyclaminus alt.	Palmarum
Cuminum	Pancratium
Cyperus	Papaver cornicu-
Dictamnus cret.	lare
Elaterium	Pastinaca erratica
Eruum	Periclymenum
Eupatorium	Petroselinum
Fel	Peucedanum
Gentiana	Piper
Glans unguenta.	Pityusa
Hyssopus	Polium
Iris	Porrum capitatum
Isopirum	Porrum agreste
	Pseudodi-

De Facultatibus

Pseudodistamnus	Sphondylium
Radicula	Staphylinus
Raphanus	Teucrium
Rubia	Thlaspi
Ruta	Thymbra
Salis flos	Thymus
Scandix	Tragorigonum
Scilla	Trissago
Scordium	Vetonica
Scorodoprasum	Vinum
Sinapi	Zingiber

Repellentia.

Acatia	Lycopsis
Acetabulum	Lycium
Ambrosia	Malicorium
Apollinaris herba	Meli punici flos
Balaustia	Mespilus
Caseus recens	Muscus marinus
Centuntulus	Myrtus
Cerussa	Olostium
Cistus	Omphacium
Cucurbita	Omphacomele
Cytinus	Oxyacantha
Ephemerum	Palma
Hordeum murinum	Palma elate
Lens palustris	Papauer sativum
Lentiscus	Papauer sylvest.
Leporinus pes	Persea
Limonium	Phyllitis
	Picea

Picea	Salis spuma
Pirus	Sanguinalis mas
Plantago	Sanguinalis fem.
Plumbum	Sedum maius
Portulaca	Sedum minus
Potamogetum	Sentis canina
Punica mala	Solanum
Quercus	Stratiotes millefolia
Radix Idea	Stratiotes aquatica
Rhus	Symphytum petrae
Rubrica sinopis	Tamarix
Rubrica fabrilis	Terra cimolia
Rubus	Terra pinguis
Rubus Idens	Thuris cortex
Rumex	Thuris manna
Sal	

Roborantia.

Absinthium	Coccum infectarium
Acatia	Colymbades
Agallochum	Corallium
Aloë	Coriandrum
Alumen	Coronopus
Amaracus	Cornu ceruinum
Arbutus	Cornus
Balaustium	Crocum
Bryon	Costus
Calamus odorat.	Coronea mala
Castanea	Cupressus
Centaureum ma.	Cyperus

De Facultatibus

Cytinus	Nardum celt.
Ebur	Oenanthe
Equisetum	Olea sylvestris
Fagus	Oliua salsa
Galla	Omphacium
Galline ius	Oriza
Gypsum	Palma
Hedysarum	Palma elata
Iaspis	Piper
Ilex	Pistacia
Inrybus sylvestr.	Plantago
Iuncus odoratus	Plantanus
Labruscae flos	Quercus
Ladanum	Quinquefolium
Lagopus	Rha ponticum
Lentiscina resina	Rha barbarum
Limonium	Rhodia radix
Lycium	Rhus
Lysimachia	Rosa
Malabathrum	Rosmarinum als.
Malicorium	Rubus
Mala sylvestris	Rubus Ideus
Manna	Salvia
Menta	Spina alba
Mespilus	Spina Arabica
Milium	Stacchas
Morus	Succinum
Muscus arboreus	Symphytum petraei
Myrrha	Terebinthus
Myrtus	Thus
Nardum Indicum	Thuris cortex
	Sarcosin

Sarcotica.

Aloe	Pix arida
Butyrum	Pix liquida
Cadmia	Resina pinea
Hypericum	Resina Strobilin.
Iridis radix	Resina terebinth.
Lachryma abieg.	Sanguis draconis
Lapis asius	Sarcocolla
Mastiche	Thus
Myrrha	Thuris manna
Panacis cortex	Thuris cortex

Sistendi vim habentia

Acatia	Coagulum
Achillea	Condrylla
Acinus	Corallium
Adiantum	Cornus
Agrestis olea	Cornucervi
Alisma	Coronopus
Althæa	Cupressus
Alumen	Cynobatus
Astragalus	Fex
Brassica	Ferula medulla
Britannica	Fagus
Bromus	Feniculum sylvest.
Cinnabaris	Galla
Cistus	Gallium
Clematis p.	Glans ynguent.
Clymenum	Glyciss
	Gramen

48 De Facultatibus

Gramen Harund.	Medium
Gypsum	Menta
Hordeum murinum	Mespila
Hyacinthus	Milium
Hypocistis	Mora immatura
Intybum	Muscus marinus
Isatis sativa	Myrtus
Ilex	Nardus
Labruscæ flos	Nitri spuma
Lactuca sativa	Nymphaea
Ladanum	Olea agrestis
Lapis Indicus	Oleum omphacinum
Lens	Oleum Myrteum
Lentiscus	Oleum lentiscinum
Leporinus pes	Oliua falsæ
Limonium	Olostium
Lotus arbor	Omphacium
Lycium	Palinurus
Lyncurium	Palma
Lysimachia	Palma elate
Malum punicum acic- dum	Panicum
Mali punici flores	Peonia
Mali punici putamē	Persea
Mali pun. sylue. flos	Phyllitis
Malum Cydonium	Phœnix
Mala orbiculata	Phu
Mala syluestria	Picea
Mala persica	Pirus
Manna thuris	Plantago
Marum	Plumbarius lapis
	Plumbum elotum
	Pluy

Simpl. Medic.

85

Plumbum crematum	Sorba
Poma Cydonia	Spina alba
Portulaca	Spina Arabica
Potamogetum	Stibium
Pruna	Stæbe
Punica mala	Stomoma
Quercus	Stratiotes millefoliū
Radix Idea	Succinum
Recrementum plūbi	Sympitum petreum
Recrementum argēti	Testiculus alter
Rhus	Tilia
Rosæ	Tomentum
Rubrica sinopica	Tragium alterum
Rubrica fabrilis	Tragus
Rubus	Tribulus
Rubus Idæus	Trichomanes
Sanguinalis mas.	Thuris cortex
Sanguinalis fæm.	Thuris fuligo
Sarcocolla	Verbascum
Sentis canina	Verbenaca
Solanum	Vua acerba

Soporifica.

Amygdalæ ama.	Iris
Baccharis	Iunci Aethiop. sem.
Cicuta	Lactuca
Dorychnium	Lapis Memphites
Halicachabum	Ladanum
Hyosciamus	Lolium
Hypecooum	Mandragoras
	H Man-

De Facultatibus

Mandragoræ poma	Papauer erraticum
Mandragoræ liquor	Persicorum nucei
Muscus arb. recens	Solanum somnificum
Opium	Vitex
Papauer sativum	Vinum recens

Venerea.

Allium coctum	Garyophylli
Amigdalæ dulc.	Lac omne
Anisum	Mala insana
Auellana	Menta
Asphodeli radix	Muschus
Belzium	Nasturcium
Bulbus esculentus	Nux Indica
Ceparum semen.	Nux myristica
Cervi genitale.	Nux Pontica
Cicer	Orchis
Cinara fructus	Orminum
Costus	Oua
Crocus	Palma cerebrum
Cynosorchis	Palma flos
Dracunculi ma. ra.	Passerum cerebrum
Encephalos	Pastinaca
Eruca sem.	Personata radix
Faba	Phaseli
Ferula corculum	Pineæ nuce
Eraxini semen.	Piper longum
Galanga	Pistacia
Gallij radix	Porri semen.
Gladiolus	Rapum
	Satyrium

Satyrion primum	Testiculi gallorum
Satyrion alterum	Testiculi aprugni
Scyncus	Tubera
Semen lini	Vrtica semen.
Sepia cum allio	Xyli semen.
Testiculus herba ra.	Xyphij radix
Testiculus alter	Zibetum

Spermatica.

Amygdale	Oua recentia
Anisum	Passerum cerebrum
Asparagus	Pastinaca
Cicera	Phaseli
Cynosorchis	Pistacia
Encephalos	Rapum
Lac omne	Satyrion utrunq;
apus	Semen lini.
Nuclei pinei	Sifer
Nux Indica	Testiculi gallorum
Oriza in lacte cocta	

Vretica.

Ammi	Apium montanum
Amydale	Apium grande
Androsaces	Asphodelus
Anisum	Baccharis
Apium sativum	Balsamum
Apium palustre	Bdellium


H 2 Bitu-

De Facultatibus

Bitumen	Iris
Calamus odoratus	Iuniperus
Cantharides	Iuniperi baccae
Capnos	Lactuca sylvest.
Capparis	Lanaria herba
Carduus	Laurus Alex.
Carpesium	Leontopetalum
Cari semen.	Libanotis
Casia	Ligusticum
Caucalis	Lithospermum
Chamaepitys	Lonchitis
Cinnamomum	Malum cydonium
Cytisus	Mala orbiculata
Daucus	Malabattrum
Dictamnus Cret.	Mel
Dictamnus	Menta sativa
Dracunculus ma.	Meum
Dracunculus mi.	Milium
Epithymum	Moly
Eruum	Napum
Eruca	Nardus
Fumaria	Nardus Gallica
Feniculum sat.	Nardus Montana
Feniculum sylv.	Nepeta
Folium	Nigella
Gingidium	Ocimum
Gramen harund.	Olea sylv. lachry.
Gutta ammonica	Ononis
Iasme	Origanum
Inula	Palurus
Iris	Panax

Pan

Pancratium	Seseli
Pastinaca erratica	Siliquæ
Periclymenum	Sinapi
Petrofilinum	Sison
Peucedanum	Sisymbrium albe -
Phu	rum
Piper	Sium
Polium	Smilax
Porrum capitatum	Smyrnium
Porrum agreste	Solanum uesticarium
Pseudobunium	Solanum sonnificum
Pseudodictamnus	Sphondylium
Pulegium	Testiculus alter
Radicula	Thlaspi
Raphanus	Thymbra
Rubia	Thymus
Ruscus	Tilia
Ruta	Tordilum
Ruta sylvestris	Tragoriganum
Rumicis acut. rad.	Trichomanes
Sabina	Trifolium aspliat.
Salvia	Trixago
Sampsuchum	Veneris umbilicus
Scandix	Veronica
Scilla	Vitis alba
Scordium	Vitis nigra
Scolymus	Vrtica
Schoenianthum	Xyris
Serpyllum	Zingiber



SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM
FACVLTATES,

SECVNDVM LOCOS

ex Dioscoride, & Mat-
thioli Commen-
tarijs.

CAPITIS.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis dolores ex frigidityte.



R i s Illyrica cum
aceto, & rosaceo il-
lita.

Oleum sylvestris oli-
uæ inunctum.

Oleum Amygdala-
rum inunctum.

Viticis semen empla-

stri modo adhibitus.

Amygdalæ amaræ cum aceto uel rosa-
ceo fronti, uel temporibus illitæ.

Torpedo marina uiua admota.

H 4 Lana

Capitis

Lana succida cum aceto, & rosaceo imposita.

Silymbrium fronti, & temporibus adalligatum.

Hederacei corymbi, uel foliorū hederaceorum succus, cum aceto, & rosaceo perfusus.

Aloe temporibus frontiꝑ; ex aceto, rosaceoꝑ; illita.

Menta fronti adalligata.

Serpyllum coctum rosaceo acetoꝑ; madefactum, & adhibitum.

Melilotus cū rosaceo, & aceto subactus.

Baccharis folia per se illita.

Ruta ex rosaceo, & aceto.

Scammonia ex aceto, & rosaceo perfusa.

Anisum per se potum.

Sphondylium cum ruta illitum.

Aquæ marinæ uapor operto capite perceptus.

Peucedanum ex rosaceo, & aceto.

Melanthium fronti adalligatum.

Coniza minor adalligata.

Anagyris tenera folia drachmę ponderis ex uino pota.

Rhodia radix recens cum rosacei momento imposita.

Hippoglossum coronamenti modo adhibitum.

Chamedaphnes folia trita, & illita.

Elaterium ex lacte naribus infusum.

Rusci folia, & baccę in uino potę.

MATTH-

Galanga naribus indita.

Nardum Italicum.

Lauendula.

Phu vires cum radicibus contusum & illitum.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Cubebe deuoratę.

Balsamum factitium, & eius aqua illita.

Moschus.

Zibetum.

Ambarum

Laurium oleum

} linimenti modo
adhibita.

Mumia ex amaraci aqua naribus infusa,
aut ex castoreo, Caphura, & oleo balanino.

Mastiche mansa cum odorata cera.

Dictamni albi florentis aqua naribus infusa.

Persicorum nucleorum cremor ex aqua
uerbenacę paratus fronti, temporibusq; illitus.

Amygdalarum amararũ lacteus cremor
eodem modo paratus.

Mustellarum combustarum cinis aqua
subactus, & illitus.

Capę squama feruenti cinere tosta, &
calida in dolentis lateris aurem intro
ducta additis rosaceo, laurino, & succida lana.

H & Flores

Flores Caryophylli uocati saccharo as-
feruati, & deuorati.

Ciclamini succus in errhinis additus.

Hederæ folia septem, totidemq; ossium
persicorum nuclei a cortice delibrati
ex oleo & aceto cocta, & temporibus,
& fronti illita.

Agaricum in potu sumptum.

Graminis genus septem internodiis dis-
tinctum capiti accommodatum.

Rhodia radix recens contusa ex amaraci
aqua fronti & temporibus illita.

Verbenacę aqua, aut oleum capiti adhibi-
tum.

Verbasci stillatitia aqua fronti illita.

Fungi qui ad imā sambuci sedem oriun-
tur in aqua rosaceo macerati, & il-
liti.

Colocynthis in catapotiiis addita.

Quinta essentia nostra libr. 5. capite de
uino descripta tum pota, tum exterius
fronti illita.

MATTHIOLI.

Ad diuturnum capitis dolorem.

Ligni Guaiaci.

Chinę radiceis

Zarze parille.

Punicę arboris folia, aut eorum succus
illitus.

decoctū diebus cō-
tinuis 40. potum.

Hederæ

Hederæ folia septem, totidemq; ossium
perficorum nuclei a cortice delibrati
ex oleo, & aceto cocta, & fronti, & té-
poribus illita.

Agaricum in potionibus aut catapotiis
additum.

Colocynthis in catapotiis aut potione
vsurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis dolores a calida
causa genitos.

Oleum sylvestris oliuæ inunctum.

Vnguentum rosaceum illitum.

Ligustri flores ex rosaceo illiti fronti.

Rosarum aridarum ex uino dilutum ad-
hibitum.

Viticis semen appositum.

Portulaca per se imposita.

Melilotus cum aceto, aut rosaceo asper-
sa & adhibita.

Nymphææ radix pota, & naribus indita.

Rhodia radix cum rosaceo, & fronti, &
temporibus adalligata.

Papaueris liquor frōti cū rosaceo illitus.

Psyllium ex rosaceo acetoq; , aut aqua
impositum.

Hippoglossi sertum capite gestatum.

Sedum maius cum rosaceo illitum.

H 6 Solani

Capitis .

Solani hortulani folia adalligata.
Viniferæ uitis folia, & capreoli adhibita.
Ophites lapis adalligatus.

MATTHIOLI.

Arboreus, lapideusve muscus recens ro-
faceo, imbutus, & impositus.
Populneum unguentum toti capiti inun-
ctum.
Betulæ aqua quæ per se è perforato cau-
dice fluxit illita.
Ligustrinum oleum illitum.
Rosæ, & præsertim purpuræ austero ui-
no incoctæ & illitæ.
Pomorum acidorum succus cum santa-
lis adhibitus.
Cochlearum uiuentium mucus fronti
ex rosaceo illitus.
Punicorum acidorum uinum potum &
impositum.
Anguium senecta aceto decocta, & fron-
ti adhibita.
Oui recentis utellus, albumq; ex rosa-
ceo & rosacea aqua.
Mica tritici panis amygdalino, papaue-
rinoq; oleo imbuta, & fronti adalli-
gata.
Portulaca contusa, & fronti imposita.
Plantaginis succus ex rosacco illitus.
Cucurbitæ, & cucumeris recentis ramen-
ta fronti adalligata

Lactucæ

Lactuce succus cum rosaceo, & aceto im-
positus.

Fabaria contusa & aceto.

Nymphææ recentia folia capiti superpo-
sita.

Polygoni maioris succus illitus

Hyoscyami recentia folia fronti adalli-
gata.

Psyllii seminis mucago fronti ex rosaceo
adhibita.

Solani hortulani succus fronti impositus.

Mandragoræ recentia folia capiti super-
posita.

Al sine contusa, & adhibita.

Sedi cuiuscunq; succus, aut herba ipsa
contusa, & admota.

Cotyledonis utriusq; succus impositus.

Cimbalaria vulgaris contusa, & illita.

Momordicæ fructus amygdalino oleo in-
solatus contusus, & illitus.

Santalū albū cū aqua rosacea adhibitū.

Ca hura, & rosacea aqua imposita.

Rosaceum oleum tepidum.

Sylvestris oliuæ oleum inunctum.

Punicæ folia contrita, aut eorum succus
cum rosaceo illitus.

Amygdalæ dulces ex aqua rosacea con-
trita, & illita.

Oleum in quo cucurbitæ flores insolati
fuerint illitum.

Mustelarum exustarum cinis aqua sub-
actus, & illitus.

Senæ

Capitis.

Senę decoctum, uel dilutum potum.
Eiusdem folia in lotionibus addita.

MATTHIOLI.

Ad emicraneam.

Thuris & Myrrhę puluis oui albo exceptus & fronti, & temporibus illitus.

Mumia ex amaraci aqua naribus immissa.

Sagapenum ex Betonicę decocto potū.

Cucumeris syluestris radix in aqua elixa tusa, & oleo subacta, & cum absinthio applicata.

DIOSCORIDIS.

Ad expurgandum caput.

Brassicę succus.

Anemonis succus.

Betę succus

Chelidonii ma. su.

Cyclamini succus.

Cepę succus.

Pyrethrum.

Staphisagria.

Colocynthis in catapotiiis deuorata.

Vua passa cum pipere manducata.

Atramentum sutorium lanis naribus inditum.

} naribus infusus.

} diu mansa.

MATTH.

MATTHIOLI.

Iridis radice succus naribus infusus.

Cubebæ cum mastichæ manse.

Mastiche unâ cum cera odorata com-
mansa.

Gattariæ succus naribus infusus.

Ammaraci succus naribus inditus.

Imperatoriae radix commansa.

Senæ decoctum uel dilutum potum.

Sagapenum in catapotiis deuoratum.

Sinapi, & nasturtii semen commansum.

Cyclamini succus naribus infusus.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis dolores faciunt.

Stiracinum oleum olfactum.

Oliuæ flauæ.

Glandes.

Palmulæ Phœniciæ.

Iuglandes nuce.

Arbuti fructus.

Ferulæ caules.

Mei radices largius sumptæ.

Absinthii liquamentum haustum.

} in cibis acceptæ.

} deuorati.

MATTHIOLI.

Vinum generosum largius sumptum.

Sinapis in cibis usurpata.

Ponticæ

Capitis.

Pontice nuces largius deuorata.
Lac abunde potum.

DIOSCORIDIS.

Ad veternosos.

Viticis semen cum rosaceo, & aceto per-
fufum.

Castoreum ex aceto, & rosaceo naribus
infufum.

Cepa decocta, & in cibum sumpta.

Sinapi derafo capiti appositum.

Sphondilium suffitum, & ex oleo capiti
illitum

Peucedanum cum aceto, & rosaceo inun-
ctum.

MATTHIOLI.

Nardus Italica } cum pota, tū illita.
Lauendula }

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua po-
ta.

Balsami factitii aqua, secundarius liquor,
& oleum inunctum.

Sisymbrii succus ex aceto illitus.

Caryophylli flores saccharo conditi &
deuorati.

Agaricum potum cum purganti medi-
camento.

Oleum e floribus, & foliis hyssopi para-
tum,

tum, & illitum.

Stēchas addita scilla aut eius aceto pota
Dictānus albus quomodolibet adhibitus
Saluia tam in potionibus quā in fo-
mentis usurpata.

Saccharum ē floribus saluix paratum.

Gattaria & bibita & fotu adhibita.

Amaracus introrsum, & extrorsum acce-
pta.

Imperatorix radix quoquo modo usur-
pata.

Rosmarinum, uel saccharum ex eius flo-
ribus paratum.

Euphorbium occipiti affricum.

Chamedrys in potionibus addita.

Quinta essentia nostra libr. 5. comment.
de uino descripta tum pota, tum nari-
bus iniecta.

DIOSCORIDIS.

Ad somnum conciliandum.

Iris Illyrica pota.

Ammonium fronti illitum.

Amygdalæ amaræ deuorata.

Viticis semen potum.

Lactuca in cibum sumpta.

Aloe illita per sese, uel ex rosaceo.

Baccharis odorata.

Iunci Aethiopici semen potum.

Papaueris erratici quinq; sexve capita
in

Capitis.

in uini cyathis tribus ad dimidiū decocta, & potui data.

Hyoscyami semen potum, ac appositum.

Solani somnifici radicum cortex drachmæ pondere in uino potus.

Mandragoræ radicis ex uino decoctum cyathi unius mensura potum.

Mandragoræ poma olfacta naribus.

Mandragoræ liquor sedi pro balano subditus.

MATTHIOLI.

Arborei, lapideiue musci dilutū ex uino paratum potum.

Salicis recentia folia in lotionibus addita.

Perficorum nucleorum cremor fronti, & temporibus adhibitus.

Amygdalæ dulces cum rosacea aqua illitæ.

Lactucæ succus ex rosaceo fronti, & temporibus illitus.

Corallium potum.

DIOSCORIDIS.

Somnia terribilia faciunt.

Fabæ.

Lentes.

Picnocomi semen comæ drachmæ pondere

} in cibū acceptæ.

dere potum.

Smilacis lævis semen cum dorycnio potum ternis singulorum obolis.

MATTHIOLI.

Phasioli in cibum sumpti.

DIOSCORIDIS.

Sternu tamenta cient.

Sinapi semen tritum, & naribus admotum.

Ptarmicę flores admoti.

Struthii radix trita, admota.

Ranunculi radix sicca, & in puluerem trita, naribus indita.

Daphnoides naribus indita.

Veratri albi radix trita & imposita.

MATTHIOLI.

Piper tritum naribus inditum.

Cyclamini radix indita.

DIOSCORIDIS.

Ad vertiginosos.

Balsami semen per se potum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo illitū.

Galbanum

Capitis.

Galbanum olfactum.

Brioniae radix pota per cōtinuum annū
quotidie drachmæ pondere.

Vitis nigræ uiticulæ primæ recentes decoctæ & in cibis acceptæ.

Vinum

Acetum

} Scillinū potum.

MATTHIOLI.

Cinnamomi uulgaris stillatitia aqua
pota.

Balsami factitii primus, secundus, & tertius liquor inunctus.

Mumia ex amaraci aqua naribus immissa

Cochleæ cum suis testis trite & aceto pota.

Scorzoneræ radix, aut succus potus.

Caryophyllorum flores saccharo asseruati, & frequenter deuorati.

Cubebæ grana quinq; quotidie sumpta.

Agaricum potioni infriktum, & pro sapone usurpatum.

Salvia tã in potu, q̃ in fomentis sumpta.

Saccharum Saluæ floribus paratum.

Gattaria potui data, & fornifecus illita.

Amaracus tũm pota, tũm illita.

Imperatorie radix in potiones, & loca-
lia medicamenta adhibita.

Senæ decoctum, uel dilutum potum.

Rosmarinum quocunq; modo usurpatũ.

Saccharũ è floribus Roris marini paratũ

Sagapenum

Capitis.

95

Sagapenum in potu sumptum, & exterius
inditum.

Chamedrya quoquo modo usurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad comitiales.

Cardamomum ex aqua potum.

Cancamum per se potum.

Balsami semen haustum.

Bitumen Naphtha suffitum comitiales
deprehendit.

Populi nigri semen ex aceto.

Ficus sicce in cibum accepte.

Coniculę Indicę suffitę excitant.

Coagulum Leporinum potum.

Mustelę uentriculus coriandro infarctus
inueteratusq; , deuoratus.

Mustelę eiusdem sanguis potus.

Asininum Iecur tostum in ieiuno sum-
ptum.

Vngula asini combusta pota.

Equorum lichenes triti, & ex aceto hau-
sti.

Lapis in hyrundinum pullorum primę
feturę uentriculo inuentus pro amu-
leto in cerui aluta suspensus.

Semen lactis potum quousq; alui citet.

Phocę coagulum bibitum.

Vrsinum fel ad mlingendu datum.

Testudinis fel naribus inditum.

Testudinis

Capitis

Testudinis terrestris sanguis potus.

Ciconiæ finum ex aqua potum.

Plantago cum lenticula decocta in cibis sumpta.

Sinapi tritum naribus inditum.

Piper diu mansum.

Scilla hausta.

Agaricus drachmæ pondere cum oxime lite haustus.

Eryngii radix ex dulci aqua ebibita.

Rutæ sylvestris semen potum.

Seselis Massiliensis radix, & semen potum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo capiti inunctum.

Sagapenum potum.

Laserpitii liquor cum aceto mulso bibitus.

Ladanum olfactum.

Ammoniacum in eclegmate cum melle datum.

Trifolii semen, & folia data.

Coniza cum aceto bibita.

Anthyllis altera ex oximente pota.

Betonicæ folia hausta.

Quinquefolium triginta diebus haustum.

Papaueris spumei semen cum malsa aqua potum.

Veratrum nigrum potum.

Hippophesti succus trium obolorum pondere haustus.

Vitis alba drachmæ pondere anno toto quotidie

quotidie hausta.

Vitis nigre uiticulę primę uirentes co-
ctę, & in cibis sumptę.

Acetum mulsum potum.

Vinum, & acetum scillinum potum.

Selenites lapis tritus ebibitus.

Actites lapis cum Cyprino ungueto aut
gleucino, uel alio excalfaciente illitus.

Cotes naxia pota.

MATTHIOLI.

Nardus Italica.

Lauendula.

Asarina, & eius decoctum potum.

Cinnamomi uulgaris stillatitia aqua pota

Balsami factitii liquor omnis illitus.

Mumia ex amaraci aqua naribus immissa

Cranium humanum potum.

Leporis coagulum cum aceto bibitum.

Lapis in felle bubulo inuentus tritus len-
tis quantitate, & in errhimis additus.

Aqua stillatitia humani stercoreis pota.

Scorzonerę radix, aut eius succus potus.

Caryophyllorum flores ex betonicę, aut
amaraci decocto poti.

Iidē saccharo asseruati frequenter deuo-
rati.

Cyclaminus ī potione, uel clysmate infu-
sus, aut eius succus in errhimis additus

Agaricum potioni ingestum.

Aristolochia rotunda.

Hyssopum

Capitis.

Hyssopum quoquo modo sumptum.

Stachas cum scilla aut eius aceto usur-
pata.

Dictamnus albus.

Salvia tam pota, quam trita adhibita.

Amaracus quouis modo usu ueniat.

Galegæ succus fescuncię p on dere potus.

Imperatorię radix in potionibus addita.

Senæ dilutum, uel decoctum potum.

Rosmarinum, uel saccharum ex eius flori-
bus paratum.

Sagapenum deuoratum.

Quercini uisci lignum in tenuissimū pul-
uerem redactum, & diebus quadragin-
ta potum.

Vincetossici radices tritæ una cum pœo-
nię semine.

Cardui benedicti decoctum, aut stillati-
tia aqua pota.

Chamædris in potionibus addita.

Filipendulę radices puluis cibi inspersus.

Palmę Christi seminis puluis drachmę
ponderę ex uino potus.

Eiusdem radicum decoctum diutius ui-
no mistum potum.

Pœonia Galeni collo suspensa.

Pœonię semina filo traiecta, & collo cir-
cumligata.

Hyperici florentis aqua stillatitia pota.

Chamepitys decoctū ex rhodomelle, &
oximelite diebus pluribus potum.

Ellebori nigri dilutum potum.

Colocynthis

Colocynthis in catapotiiis addita aut in
portionibus.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment.
de uino descripta hausta.

Acetum scillinum frequenter haustum.

Stibium nostrum proprio comment. de-
scriptum.

Corallium tam suspensum, quàm bibitū.

MATTHIOLI.

Ad obliuiosos, & deperditam
memoriam.

Anacardia.

Quinta essentia nostra lib. 5. commen. de
uino descripta frequenter usurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad Apoplexiam.

Vitis albæ radix continuo anno drach-
mæ pondere hausta.

MATTHIOLI.

Nardi Italicæ.

lauendulæ.

} stillatitia aqua pe-
ta.

Cinamomi uulgaris aqua stillatitia po- a

Balsami factitii liquor primus, secundus,
& tertius illitus.

I Agaricum

Capitis.

Agaricum in potu sumptum, aut in cata-
potiis deuoratum.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment.
de vino descripta pota.

DIOSCORIDIS.

Ad Phrenesim.

Vnguentum crocinum perfusum, aut na-
ribus illitum.

Vitex aceto, & oleo instillatus.

Asparagus in vino albo potus.

Serpyllum cū aceto, & rosaceo impositū.

Sphondilium suffitum, impositum, & ca-
piti ex oleo inunctum.

Peucedanum ex oleo, & rosaceo inunctū.

MATTHIOLI.

Maluæ succus octo vnciarum pondere
potus.

Solani hortensis tum foliorum, tum bac-
charum succus sincipiti cum linteolis
superpositus.

Borraginis, aut buglossi stillatitia aqua.

DIOSCORIDIS.

Ad cerebri inflammationes quas
Syriasim uocant.

Cucurbitæ ramenta sincipiti apposita.

Peponis

Peponis ramenta sincipiti adhibita.

Heliotropii folia fronti admota.

Acetum fronti illitum.

MATTHIOLI.

Agaricum potui datum.

Santala omnia ex aceto, rosaceo, & capthuræ momento illita.

DIOSCORIDIS.

Ad melancholicam.

Ocimi semen }
Veratrum nigrum } potum.

Betonice folia ebibita.

Epithymum haustum.

MATTHIOLI.

Poma dulcia.

Citria mala.

Santalum omne.

Maluæ succus vnciarū sex pōdere potus.

Scorzoneræ radix aut eius succus bibit⁹.

Agaricum sumptum.

Thymus drachmarum duarum pondere
ex oximelite potus.

Senæ decoctum, uel dilutum potum.

Vincetossici radices tritæ cum ocimi se-
mine, aut cū citrei mali cortice aut cū

Capitis.

margaritis haustæ.

Melissophyllon quocūq; modo frequen-
ter potum.

Aspleni decoctum haustum.

Borraginis, aut buglossi decoctum ex ui-
no, aut ex aqua paratum potum.

Ellebori nigri dilutum ebibitum.

Sirupus e polipodio, & præsertim ad hy-
pocondriacam, uide libr. 4. comment.
de polipodio.

Acetum scillinum haustum.

Quinta essentia nostra libr. 5. comm. de
uino descripta, pota.

Stibium nostrum quatuor granorū pon-
dere haustum.

Argentum uiuum præcipitatum octo gra-
norum pondere bibitum.

Aurum.

Corallium.

Margaritæ.

Oleum e lapide gagate tum potum tum
illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad crapulam, ebrietatemq;
tollendam.

Crocum ex passio præsumptum.

Punicorū malorū succus. } haustus.

Myrti baccharū succus. }

Brassica summo cibo sumpta.

Absinthium præsumptum.

MATTH.

Capitis.

99

MATTHIOLI.

Acetū testiculis cū linteolis adhibitum.

Croci florum stillatitia aqua pota.

Amygdalæ amaræ sex ante potum deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis fluxiones.

Vnguentum irinum naribus illitum.

Styrax illita suffitaq;

Bitumen naphtha suffitum.

Cinnamomum potum.

Mei radices trite cum melle eclegmate deuorata, ubi fluxio pectus afficiat.

Nuces auellanae toste, & cum exiguo piperis pot.

Dracunculi maioris radix tosta nel elixa deuorata.

Tragacatha in eclegmate cū melle supra

Hyssopum cū fico, ruta melleq; ex aqua decoctum potum.

Helichrysi coma trium obolorum pondere in uino diluto pota.

Hyosciami semen oboli pondere, addito papaueris semine haustum.

MATTHIOLI.

Juniperinum gūmi suffitum, & capiti inspersum.

I 3

Santalum

Capitis.

Santalum rubrum capiti inspersum.
Caryophylli aromatici suffiti fumo naribus excepto.
Agaricum in potionibus additum.
Rosmarinum.

DIOSCORIDIS.

Ad cerebrum roborandum.

Agalloecum potum.

MATTHIOLI.

Cubebæ deuoratz. (ta.
Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua po
Balsami factitii vnusquisq; liquor illi- (tus.
Moscus.
Zibetum.
Ambarum.
Caryophyllorū puluis capiti inspersus.
Caryophylli flores saccharo conditi frequenter deuorati.
Stoechas.
Menta græca.
Saluia.
Sena in capitis perfusionibus addita.
Rosmarinum atque saccharum ex eius floribus paratum.
Caryophyllatæ radix olfacta.
Rhodia radix olfacta, uel quomodo libet usurpata.

Quinta

Quinta essentia nostra commento de vino descripta.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis vlcera manantia.

Thus cum nitro confricatum.

Fici, & caprifici lacteus succus cum polenta appositus.

Vrina inueterata apposita.

Fœnum græcum appositum.

Cicer adhibitum.

Malua ex vrina humana emplastrata.

Allii cinis ex melle inunctus.

Cyclamini decoctum fomēti modo adhibitum.

Bulbi cum cremato nitro adhibiti.

Melilotus ex aqua cū creta chia, vinoq; aut galla inuncta.

Rubi folia imposita.

Lilii cremata radix ex melle adhibita.

Adiantum in lixiuio decoctum.

Acida muria inspersa.

MATTHIOLI.

Hederę helicis folia in pilcum confuta, & capiti imposita.

Centaurii minoris succus illitus.

Mentha illita.

Nervorum.

DIOSCORIDIS.

Ad convulsionem.

Iris Illyrica ex aceto pota.
Acori decoctum bibitum.
Cardamomum ex aqua potum.
Iūci odorati radicis drachma unā cū pari
pondere piperis per dies aliquot data.
Costus ex uino, & absinthio exhibitus.
Balsamum ex aqua haustum.
Helenium ex melle in eclegmate exhi-
bitum.
Vnguentum sampsuchinum more cata-
plasmatis appositum.
Vnguentum metopium illitum.
Bdellium illitum.
Iuniperi baccæ bibitæ.
Cedrides deuorata.
Halimi radix drachmæ pondere in aqua
mulsa hausta.
Ficulneus cinis ex oleo illitus.
Erinacci terrestres caro in cibū sumpta.
Castoreum inunctum, & potum.
Serpillum potum.
Finum caprinum cum aceto bibitum.
Dracunculi radix tosta, & elixa deuorata
cum melle.
Asphodeli radix drachmæ pondere pota.
Capparis

Capparis semen potum.

Capparis cortex pariter haustus.

Argemone emplastrata.

Agaricus sumptus trium obolorum pondere cum mulso.

Rhaponticum potum.

Galbanum deglutitum.

Gentianę radix drachmę pondere pota.

Aristolochia rotunda pota.

Centaurii maioris radix ex uino pota.

Spinę albę semen potum.

Acanthii radices potę.

Abrotani semen cum aqua potum.

Laucacanthę radicis ex uino decoctum haustum.

Origanum estum cum fico.

Eringii radix pota cum aqua mulsa.

Pulegium cum posca potum.

Calaminthę decoctum haustum.

Baccharis radix in aqua decocta, & pota.

Panaces herculeum linitum.

Libanotis radices cum loliacea farina emplastratę.

Peucedanū ex aceto, & rosaceo inunctū.

Clinopodium bibitum.

Chamędrys decoctum epotum.

Lasar oboli pondere datum, & deuoratū.

Sagapenum potum.

Galbanum deuoratum.

Betonice folia denarii pondere cum hydromelite data.

Xyridis radix ex passo bibita.

I 5 Symphy-

Neruorum.

Symphytum ex aceto mulso bibitum.
 Psyllium illitum.
 Serpyllum potum aut illitum.
 Verbasci decoctum bibitum.
 Brioniae eclegma ex melle.
 Vinum scillinum haustum.
 Vinum chamaedrytes bibitum.
 Vinum tragoriganites bibitum.
 Satyrii radix ex vino nigro austero bi-
 Coris ex vino pota. (bita.

MATTHIOLI.

Oleum irinum inunctum.
 Nardus Italica.
 Lauendula.
 Cinnamonomi vulgaris stillatitia aqua po-
 Balsami factitii liquores omnes. (ta.
 Helenii radice farina.
 Oleum nucum inunctum.
 Mumia tum foris, tum intus usurpata.
 Oleum ex semine lini illitum.
 Cyclaminus in potione sumptus uel cly-
 stere infusus, aut in errhynnis additus.
 Agaricum potu usurpatum.
 Oleum è floribus, & foliis hyssopi paratum.
 Stœchas in balneis, fomentis, & laconi-
 cis addita.
 Pulegii decoctum tum potum, tum fotu
 adhibitum.
 Salvia tam pota quam fotu usurpata.
 Gattaria.

Amaracus

Amaracus.

Imperatorie radix.

Euphorbium ex Leucoii oleo illitum.

Vnguentum è uisci in pyro nascētis syl-
uestri foliis, & recenti capi pinguedine
paratum, vide visci commento.

Chamedrys in fomētis, & vnguētis addi

Liliorum alborū oleum illitum. (ta.

Cannabis radix decocta, & deinde tusa
& illita.

Colocynthis in catapotiis addita.

Stibium nostrum quatuor granorū pon-
dere sumptum.

Oleum è lapide gagate illitum.

MATTHIOLI.

Ad stuporem.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua po
Balsami factitii liquores omnes. (ta.

Oleum sinapinum.

Nuclei pinei frequenter deuorati.

Oleum è foliis, & floribus hyssopi illitū.

Stœchas in balneis, laconicis, & fomen-
tis addita.

Pulegii decoctum.

Salua tam intus sumpta quam exterius
admota.

Amaracus.

Imperatorie radix.

Rosmarinum.

I 6

Euphorbium

Neruorum.

Euphorbium ex leucoii oleo exterius il-
litum.

Chamædrys.

Chamepithys decoctum ex rhodomelle
potum.

Quinta essentia nostra commento de ui-
no descripta tam pota quam illita.

DIOSCORIDIS.

Ad Paralyfim.

Peucedanū ex aceto, & rosaceo inunctū.

Capparis semen, & cortex potus.

Sagapenum potum.

Rubiæ radix hausta.

Colocynthis clystere perfusa.

Vitis nigræ uiticulæ primæ recentes co-
ctæ comestęq;.

Vinum scillinum haustum.

MATTHIOLI.

Iridis radices conditæ deuorata.

Nardus Italica.

Lauendula.

Asarina per se aut eius decoctum poti.

Cinnamomi uulgaris stillatitia aqua
pota.

Balsami factitii liquores omnes illiti.

Helenii radice farina bibita.

Oleum sinapinum inunctum.

Nuclei pinci frequenter deuorati.

Mumia

Mumia ex amaraci aqua illita.
Iugladium oleum illitum cū calce lota.
Anacardia.
Castoreum cum mulsa potum.
Flores caryophylli ex betonicę, aut amaraci decocto poti.
Idem saccharo asseruati, & frequenter deuorati.
Cyclaminus in potione, uel clysteri sumptus aut eius succus in errhinis additus.
Agaricū ī catapotiiis, aut potione sūptū.
Oleum ē floribus, & foliis hyssopi paratum inunctum.
Stēchas in balneis laconicis, & fomentis addita.
Pulegii decoctum tūm haūstū tū fotum.
Saluia tam potione q̄ fomētis usurpata.
Gattaria.
Amaracus.
Imperatorię radix.
Senę decoctum, uel dilutum.
Euphorbiū ex leucōi oleo exterius illitū.
Chamędrys.
Oleum liliorum alborum.
Bellidis genera omnia.
Hyperici florentis stillatitia aqua pota.
Chamępithys decoctū ex rhodomelle, & oximelite potum pluribus diebus.
Conditū, & pilulę cōtra neruorū resolutionē, vide chamępitys cōmentariū.
Colocynthis in catapotiiis addita.
Quinta essentia nostra lib. 5. comment.
de

Nervorum.

de vino descripta, pota & illita.
Stibium nostrum quatuor granorū pon-
dere sumptum.
Oleum è gagate lapide inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad tremorem.

Cerebrum leporinum tostum comestū.
Castoreum potum, & inunctum.
Brassica in cibis sumpta.
Althææ decoctum potum.

MATTHIOLI.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia
pota.

Balsami factitii liquor, & oleum.

Nuclei pinci frequenter deuorati.

Saluiā tum pota, tum fotu vsurpata.

Amaracus.

Imperatorix radix.

Chamædrys.

Chamæpitys decoctum cum rhodomel-
le haustum.

Quinta essentia nostra tam pota quam
illita. parandi rationem habes lib. 5.

comment. de vino.

Diosc.

Neruorum.

104

DIOSCORIDIS.

Ad fluxiones.

Farina tritici cū Apollinaris herbę suc-
co apposita.

Farina hordęi ex aceto adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad ægritudines, & dolores.

Oleum ficyonium inunctum.

Oleum laurinum illitum.

Elęomeli illitum.

Vnguentum cyprinum

Vnguentum Gleucinum

Vnguentum Metopium

Vnguentum Amaracinū.

} inunctum.

Bdellium malagmati insertum.

Lixiuum ex cinere ficus, ex oleo il-
litum.

Castoreum potum, & illitum.

Erinacei terrestres caro deuorata in ci-
bis.

Viperinę carnes decoctę, & esui datę.

Poterii radice decoctum potum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo illitū.

Laser oboli pondere deuoratum.

Centaurium minus ebibitum.

Lilii radix inassata melleq; excepta im-
posita.

Satyrii

Neruorum.

Satyræ radix ex uino nigro austero pota.

Althææ radix per se, uel decocta in uino aut aqua mulsa emplastri modo imposita.

Coccum infectorium cum aceto illitum præcisos iuuat neruos.

Senecii folia ad eadem præstant illita.

Narcysi radix illita ad eadem utiliter imponitur.

Hypopheesti succus trium obolorum pondere potus.

Aqua marina perfusa.

Acetum scillinum potum.

Vinum de stæchade haustum.

Vinum de thymo potum.

Sesamum illitum crassitiem iuuat.

MATTHIO LI.

Oleum larignæ resinæ, uel terebinthinæ illitum.

Nuclei pinei frequenter in cibis usurpantur.

Terebinthina resina } deuorata cum chamæpithi.

Largina resina.

Abiegna resina.

Nucis Indicæ.

Nucis Myristicæ.

Fabarum caulium, & filiquarum cinis cum uetere axungia illitus.

Stachas in balienis, fomentis, laconicis addita.

Pulegium.

Pulegium.

Amaracus.

Aiuga.

Cortusæ herbæ flores in amygdalino
oleo recenter presso, & rosaceo com-
pleto pari pondere commisti diu inso-
lati & illiti.

DIOSCORIDIS.

Ad nervorum vulnera.

Cochleæ terrestres tussæ & impositæ.

Terreni vermes tusi, & illiti.

Butyrum illitum.

Senecionis folia emplastri modo impo-
sita cum thuris manna.

Dracunculi minoris folia illita.

Poterii radix tusa, & illita.

Lilii radix ex melle subacta, & illita.

Coccum insectorium cum aceto illitum.

Narcissi radix illita.

MATTHIOLI.

Balsamum factitium impositum.

Terebenthinæ.

Laricæ.

Abiegne.

Abiegna lachryma.

juglandium oleum.

Cochlearum caro cum farinæ polline
imposita.

Oleum

Nervorum.

Oleum è terrenis vermibus addito præsertim factitio balsamo, aut oleo è terbinthina confecto.

Hyperici oleum.

Oleum è fructu momordicæ illitum.

MATTHIOLI.

Ad contractionem & duritiem.

Muris montani pinguedo illita.

Taxi pinguedo inuncta.

Oleum ex ouorum vitellis perunctum.

Ceruina, & vitulina medulla.

Oleum ex lini semine.

MATTHIOLI.

Ad contusiones.

Cochlearum terrestrium caro cum farina polline imposita.

Farina fabarum cum oximelite subacta.

Dracunculi radix cum melle, & caprino fimo illita.

DIOSCORIDIS.

Ad nervorum crassitiem.

Sesamum emplastri modo impositum.

Sarmétitius cinis cum axungia uel oleo illitus.

OCVL.

Oculorum.

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum defluuium.

Nardi Indicę decoctum fotu adhibitum.

Cochleæ terrestres acu traiciuntur, ut effluat humor, quo postea palpebræ illinuntur.

Oesipus illitus.

Condrillæ gūmi, ac pariter lac impositi.

Lapis armenius illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum, oculorumq; scabritiem.

Thuris cortex tostus, & appositus.

Picis fuligo illita.

Licium appositum.

Sepiæ os leuigatum, & illitum.

Fel	{	Marini scorpionis	}	illitum.
		Marinæ testudinis		
		Perdicis		
		Aquilæ		
		Gallinæ albæ		
	{	Syluestris capræ	}	

Sinapi tritum ex melle inunctum.

Ompa-

Oculorum .

Omphacium impositum.

Squama æris illita.

Rubigo ferri illita.

Chalcitis inuncta.

Hematites lapis melle exceptus adhibitus

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum fluxiones.

Amaraci folia cum polenta illita.

Alfine cum polenta imposita.

Ricini folia cum polenta trita, & emplastrum modo adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum crassitiem.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus, & illitus.

Conchule Indice cinis inunctus.

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum scabiem.

Cape succus cum pario spodio impositus.

Aloe illita.

Fici lac inunctum.

MATTHIOLI.

Tragacanthæ lachryma lacte macerata
&

Oculorum.

107

& illita.

Sagapenum cum aceto superpositum.

MATTHIOLI.

Ad palpebrarum inflammationes.

Duum gallinaceum crudum admisto rosaceo impositum.

Colani Halicacabi baccæ musto dilutæ & impositæ.

mentis palustris stillatitia aqua illita.

borraginis vulgarisq; buglossi stillatitia aqua adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum albugines.

Opobalsamum illitum, instillatumq;.

Lancamum uino maceratū, & impositū.

Lyrria illita.

nitumen naphtha impositum.

litulorum cinis plumbi modo lotus, & illitus.

onchulæ Indicæ cinis oculis inditus.

ochlearum putaminum cinis melle exceptus linitus.

marini scorpionis fel instillatum.

eq; præstat fel testudinis, perdicis, aquilæ, gallinæ albæ, & sylvestris capræ.

arina humana æreo vase decocta illita.

Lactucæ

Oculorum.

Lactuce sylvestris lacteus succus instilla-
Dracunculi succus immisus. (tus.

Cæparum succus perfusus.

Gingiber illitus.

Chamæsyces succus cū melle munitus.

Argemones folia imposita.

Ammoniacum impositum.

Horminium ex melle impositum.

Loti domestici succus ex melle illitus.

Sal impositum.

Salis flos eodem modo adhibitus.

Sapphyrus lapis appositus.

Aeris squama imposita.

MATTHIOLI.

Mofcus impositus.

Radix ebeni trita, & cū aqua instillata.

Mustellarum crematarum cinis oculis
iniectus.

Chameleōtis dexter oculus viuo anima
li erutus, & cum caprino lacte mistus.

Centaurii minoris succus cum melle il-

Hieracii succus iniectus. (litus.

Sagapenum rutæ succo, & auium rapa-
cium felle diutius maceratum, & in
colliriis additum.

Sarcocolla in cratere vitreo asinino la-
cte quinque diebus macerata & dein-
de instillata.

Scabiosę succus cum chrysocollæ, & ca-
phuræ momento illitus.

Antirrhinum fronti ad alligatum.

Corallii cinis in collyriis additus.

Dioscor.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorū cicatrices delendas.

Cancamum vino maceratū, & infusum.

Myrrha illita.

Tumen naphtha instillatum.

Cedria illita.

Cochlearum terrestrium cinis cum mel
le impositus.

Rina humana exeo vase decocta infusa.

Cenigræci oleum cum myrto impositū.

Gagapenum inditum.

Hamēfices succus cum melle illitus.

Rugo immissa.

Sini sex adusta imposita.

Corallium tritum inditum.

Lematites lapis immissus.

Sapphyrus lapis adhibitus.

MATTHIOLI.

Lieracii succus instillatus.

Marcocolla asinino lacte macerata in-
stillata.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum nubeculas.

Cocori succus instillatus.

Casia

Oculorum.

Casia aliis medicamentis ocularibus ex-
cepta, & iniecta.

Cinnamomum impositum.

Cerasi gummi inditum.

Acacalis dilutum ad collyria additur,
quæ oculis claritatem faciunt.

Acaciæ succus elotus, & infusus.

Punicorum malorum cytini tres quan-
tumvis minimi deuorati anno ab om-
ni lipitudine præseruant.

Thus immixtum.

Crocomagma illitum.

Ebeni tenuissima ramenta uino optimo
macerata, & in collyria addita.

Lycium inditum.

Cedria inuncta.

Pruni arboris gummi illitum.

Viperæ caro decocta, & in cibis sumpta.

Hirundines ficedularum modo in cibis
deuoratæ.

Cinis hirundinum collyriis adhibitus.

Adeps piscium inunctus.

Fœniculi succus infusus.

Fel	{	Marini scorpionis.	}	infusum.
		Marinæ testudinis.		
		Perdicis.		
		Aquilæ.		
		Gallinæ albæ.		
	{	Syluestris capræ.	}	

Vrina humana greo uase decocta instil-
lata.

Lactucæ syluestris lacteus succus illitus.
Dracunculi

Dracunculi mai. radix succus inunctus.
Ceparum succus inditus.
Loti domestici succus infusus.
Hirundinariæ mai. succus æreo vase cū
melle decoctus inunctus.
Othonne succus instillatus.
Centaurei minoris succus impositus.
Ruta in cibis sumpta.
Omphacium instillatum.
Panaces Heracl. inunctum.
Libanotis foliorum, & radice succus
cum melle infusus.
Laser ex melle inunctus.
Apiaſtri succus cum melle inditus.
Marrubii succus ex melle illitus.
Pumex indita.
Salis flos immiſſus.
Vini ſex cremata imposita.
Pyrites lapis inditus.
Thyites lapis impositus.
Geodes lapis impositus.
Sapphyrus lapis impositus.

M A T T H I O L I.

Viperæ totius cum thure, & ſucco ſœ-
niculi cōbuſtæ cinis per ſe inſperſus,
aut collyriis additus.
Leporinum fel ſaccharo exceptum, &
illitum.
Muſtellarum fel cum ſœniculi ſucco in-
ſtillatum.
Stercoris humani ſtillatitia aqua idita.
K Scor.

Oculorum.

Scorzonere radicis lac instillatum.

Caryophylli in tenuissimum puluerem triti, & inditi.

Chelidonii maioris succus cum lacte muliebri instillatus.

Hieracii succus instillatus.

Sagapenum rutæ succo, & auium rapacium felle diutius maceratum, & in collyriis additum.

Sarcocolla in cratere vitreo asinino lacte diebus quinque macerata, & instillata.

Vinum è fragis instillatum.

Euphrasia quouis modo intus sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum vngulas.

Sepiæ piscis os tritum, & impositum.

Glicyrrhizæ radicis puluis inspersus.

MATTHIOLI.

Tragacanthæ lachryma lacte macerata, & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum ictus, & vulnera.

Lac humanum cum thure iniectum.

Palumbi

Oculorum.

110

Sanguis { Palumbi
Columbe } illitus.
Turturis
Perdicis.

Stœbis folia emplastri modo imposita.
Hematites lapis cum lacte iniectus.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum vlcera.

Fuligo { Thuris
Terebinthinæ } illita.
Butyri

Thuris cortex impositus.

Myrrha iniecta.

Cornu ceruinum vltum, & lotum impositum.

Amylum linitum, & peculiariter cauis vlceribus.

Stimmi iniectum.

lapis { Galactites
Sapphyrus } cum lacte
Sanius. infusus

DIOSCORIDIS.

Ad erosos oculorum angulos.

Oesypum inunctum.

Omphacium illitum.

K 2

Matth.

Oculorum.

MATTHIOLI.

Picis fuligo imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad ægilopas, & sinus.

Iuglandium ueterū nuclei triti, & illiti.

Myrti decoctum infusum.

Malua cruda commanducata cum exiguō sale adhibita.

Plantago emplastri modo imposita.

Auricula muris altera illita.

Baccharis folia emplastri modo in principio indita.

Anthemis illita.

Solani hortulani cōcisa folia imposita.

Eiusdem succus cum rubēti gallinarum fimo illitus.

Aegilops adhibita.

Oenanthes.v. labruscæ flos impositus.

Cadmia illita.

Aeris squama indita.

Stimmi inditum.

DIOSCORIDIS.

Ad procidentes oculos, & vuas.

Fabarum farina cū rosis, ouorum albo
& thure emplastri modo imposita.

Rub

Oculorum.

III

Rubi folia trita, & imposita.

Sapphyrus lapis admotus.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum inflammationes.

Amomum ex vva passa illitum.

Fuligo. } Thuris } illita.
 } Picis }

Cupressi pilulae cum polenta illite.

Myrti baccæ cū polline polētæ ipositæ.

Cotoneorum malorum flores emplastri modo.

Caseus illitus.

Saccharum infusum.

Sesame herba ex vino decocta, & imposita.

Portulaca cū polenta illita.

Intybus per se, & cum polenta adhibita.

Cucurbitæ ramenta imposita.

Anemones radix illita.

Auricula muris cum polenta emplastri modo adhibita.

Gentianæ succus inunctus.

Abrotanum cū cydonio malo decoctū, aut pane, & emplastri modo adhibitū.

Melilotus cataplasmatibus addita.

Baccharis folia illita.

Sedi maioris folia imposita.

Apium cum pane aut polēta impositū.

Rubi Idei flos ex melle inunctus.

Elatine folia cum polenta apposita.

K 3 Papa-

Papaueris liquor cum tosto oui vitello,
& croco impositus.

Hyoscyami semē & folia cum farina polenta
lentaue imposita.

Mandragoræ folia recentia cum polenta
adhibita.

Verbasci aureum florem ferētis folia im-
posita.

Aster atticus illitus.

Violæ purpureæ folia illita.

Ricini folia cum polenta imposita.

MATTHIOLI.

Lac muliebre vnā cum aqua rosacea in
qua accensum thus trigesies extinctū
fuerit oculis instillatum.

Caphura in collyriis addita.

Cochleæ in nitido mortario tuse vna cū
ouo gallinaceo incocto, & ex succida
lana fronti adalligatæ.

Cyami succus instillatus.

Hieracii succus cum muliebri lacte in-
stillatus.

Betonice folia contrita, & fronti ad-
alligata.

Consolidæ regalis flores triti, & ex ro-
sacea aqua illiti.

Vinum è fragis adhibitum.

Solani hortensis tum foliorum tum bac-
carum succus illitis linteolis fronti su-
perpositus.

Solani

Oculorum. 112

Solani Halicacabi baccæ musto dilutæ,
& impostæ.
Lentis palustris stillatitia aqua illita.
Borraginis, & buglossi vulgaris stillati-
tia aqua tam extra q̃ intus imposita.
Lapis Achates inspectus.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum dolores.

Oui vitellus tostus addito rosaceo, &
croco illitus.
Sesame herba in vino decocta illita.
Ocimi succus infusus.
Absinthium ex passo decoctū adhibitū.
Ruta cum polenta emplastri modo im-
posita.
Aconiti Pardalianches radix permisce-
tur oculariis medicamentis, quæ do-
loribus oculorum auxiliantur.

MATTHIOLI.

Lac muliebre & aqua rosacea in qua ac-
censum thus trigesies extinctum fue-
rit oculis instillata.
Caphura in collyriis addita.
Cochlex in nitido mortario tuse vnâ cū
ouo gallinaceo incocto ex succida la-
na fronti adalligata.
Cyani succus instillatus.

K 4 Con-

Oculorum.

Consolidæ Regalis flores triti, & ex ro-
facea aqua illiti.

Solani hortensis cum foliorum, tum
baccarum succus illitus linteolis frō-
ti adhibitus.

Solani Halicacabi rubentes bacce mu-
sto dilutæ, & impositæ.

Lentis palustris stillatitia aqua imposi-

Lapis Achates inspectus. (ta.

DIOSCORIDIS.

Ad lusciosos.

Iecoris [Caprini] emanās succus dum
[Hircini] affatur iniectus.

Caprinum iecur tostum in cibis sum-
ptum.

Sylvestrium caprarum fel inunctum.

Sanguis { Palumbi
Columbe
Turtuis
Perdicis } illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad suffusiones.

Fel marini scorpionis inditum.

Viperæ adeps admixto cedrino liquo-
re, Attico melle, & uetere oleo. Ga-
len. uerò non probat.

Testudinis

Oculorum.

113

Fel { Testudinis marine
Perdicis
Aquilæ
Gallinæ albæ } illitum.
Capræ sylvestris.

Fabarum farina vino macerata & illita.

Ceparum succus instillatus.

Cyclamini succus iafusus.

Sagapenum impositum.

Euphorbium impositū, cum cautela tñ.

MATTHIOLI.

Hieracii succus instillatus.

Polium fronti adalligatum.

DIOSCORIDIS.

Ad lippitudines.

Portulaca, & eius succus impositus.

Plantaginis succus impositus.

Sedi maioris folia illita.

Chalcitis inditus cum cautela tamen.

Spongiarum crematarum cinis illitus,
& præsertim in arida lippitudine.

Hematites lapis tritus cū lacte iniectus.

MATTHIOLI.

Aqua rosacea in qua thus incensum tri-
gesies extinctum fuerit instillata.

K 5 Cri

Oculorum.

Crispini baccarum succus cum pōpho-
lige & aqua rosacea instillatus.
Margaritæ in collyriis additæ.
Bubuli fellis lapis naribus inditus.
Fœnugræci decoctum fronti illitum.
Rumicis sylvestris radix luna decrescen-
te effossa gestata.
Ophioglossi ex vino austero decoctum
ablutione adhibitum.
Hieracii succus instillatus
Euphrasia quoquo modo usurpata.
Vinum euphragiatum vide lib. 4. c. 38.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum caligines.

Chamedrys trita inspersa, aut ex oleo
inuncta.
Loti domestici succus cum melle im-
positus.
Veratrum nigrum in ocularibus colly-
riis additum.
Flos æris inditus.

MATTHIOLI.

Phu ex vino albo decoctum, & oculis in-
stillatum.
Vinum ex helenio paratum frequenter
potum.
Lentiscinum oleum in cibis additum.
Eruçæ succus oculis infusus.

Ebenum

Oculorum. 114

Ebenum ad cotem tritum, & cum passo inditum.

Salicis florentis succus, qui inciso cortice fluxerit instillatus.

Nux Myristica commansa.

Margaritæ in collyriis additæ.

Lapis ex felle bubulo naribus inditus.

Brassicæ succus ex melle coctus, & oculorum angulis illitus.

Asparagi in cibis sumpti.

Sium in cibis deuoratum.

Scorzonere radicis lac instillatum.

Caryophyllorum puluis tenuissimè tritus oculis inspersus.

Hieracii succus instillatus.

Rosmarini flores recenter decerpti & cum sale, & pane quotidie deuorati toto tempore quo planta floret.

Sagapenum rutæ succo, & felle auium rapacium diutius maceratum, & in collyriis additum.

Sclareæ feminis granū in oculo delatū.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum hebetudinem.

Cancamum ex vino maceratū infusum.

Populi albæ pilulæ quæ primo foliorum exortu exiliunt ex melle illitæ.

Marini scorpionis fel inunctum.

Brassica in cibis sumpta.

K 6 Sinapi

Oculorum.

Sinapi cum melle inunctum.
Anagallidis succus naribus exceptus.
Absinthium cum melle impositum.
Thymus in cibo usurpatus.
Thymbra obsoniis accepta.
Rutæ succus i malicorio feruefactus ad-
dito fœniculi succo, & melle infusus.
Rutæ syluestris succus cum vino, melle
gallinaceo felle, & fœniculi succo in-
iectus.
Solani somniferi succus inunctus.
Flos salis inditus.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum fluxiones.

Crocum illitum cum humano lacte.
Thus ex oui vitello impositum, uel eius-
dem albo.
Thuris fuligo imposita.
Picis fuligo illita.
Platani tenerrima folia in vino decocta,
& illita.
Ebeni ramenta tenuissime trita indita.
Oleæ syluestris foliorū succus iniectus.
Cornu ceruinum ustū, lotum & iniectū.
Butyri fuligo illita.
Amylum impositum.
Pompholix lota iniecta.
Fabæ sine cortice cōmanducatę & fron-
ti impositę.

Ocimi

Aurium.

115

Decimi aquatici semen duarum drachmarum pondere ex quatuor mellis cyathis temperatum inunctum.

latine folia cum polenta imposita.

quama æris elota iniecta.

lumbum elotum iniectum.

Galactites

Morochthus

Samius

} lapis cum lacte

iniectus

Iyoscyami seminis cremor expressus infusus.

Sarcocolla infusa.

Alumen impositum.

Corallium iniectum.

umex impositus.

hematites lapis iniectus.

MATTHIOLI.

Moschus in puluerē tritus & impositus.

Aqua florum ligustri instillata.

Fragacanthę lachryma in collyriis addita.

Aurium.

DIOSCORIDIS.

Ad aurium dolores.

auri baccarum succus vino uetere, & rosaceo exceptus instillatus.

o pulneorum foliorum succus infusus.

Ladanum

Aurium.

Ladanum ex vino illitum.

Rosarum aridarum decoctum ex vino infusum.

Salicis foliorū, & corticis succus cū rosaceo in malicorio feruefactus illitus.

Malorum acidorum punicorum succus cum melle coctus infusus.

Opium cum amygdalino oleo, croco, myrrhaq; inunctum.

Anguium senecta in vino decocta instillata.

Millepede, sine onisci concisi, & cum rosaceo in malicorio calefacti infusi.

Vulpini pulmonis adeps instillatus.

Vermes terreni cum anserino adipe elixi inditi.

Anserinus

Gallinaceus

Vulpinus.

} adeps instillatus.

Vrina [Tauri] cum myrrha cocta

[Apri.]

instillata.

Mel cum trito fossili sale impositum.

Sesami semen ex rosaceo inunctum.

Betæ succus inditus.

Plantaginis succus immixtus.

Cucurbitæ ramentorum succus cum rosaceo infusus.

Dracunculi utriusque succus impulsus.

Porri succus cum aceto, thure, & lacte iniectus.

Sinapis succus, uel eius decoctum instillatus.

Hederæ,

Hederæ, & eius corymborum succus cū
oleo inditus.

Absinthium suffitum, & cum melle im-
positum.

Origani uirētis succus cū lacte infusus.

Menthę succus inditus.

Meliloti succus inditus.

Meliloti succus cum passo iniectus.

Rutę succus in malicorio feruefactus
infusus.

Peucedani succus cum rosaceo inditus.

Aparinę succus iniectus.

Marrubii succus cum rosaceo impulsus.

Cannabis domesticę succus impositus.

Poligoni maris succus infusus.

Helxing succus inditus.

Ocini aquatici succus cum sulphure, &
nitro iniectus.

Hyoscyami cremor instillatus.

Solani hortensis succus impositus.

Alsinę succus infusus.

Cucumeris asinini foliorū succus indi-

Sal cum aceto iniectum. (tus.

MATHIOLI.

Oleum Irinum instillatum.

Oleum Hyoscyaminum cum castoreo,
aut croco impositum.

Mumia ex Leucoii oleo aut hyoscyami-
no infusa.

Oleum è nucleis persicorum instillatū.

Oleum scorpionum immissum.

Castorium

Aurium.

Castorium cum meconio infusum.
Baccarum sambuci succus, cum melle co-
ctus, & instillatus.
Oleum ex ouorum vitellis
Oleum e colocynthide infusum.
Gliris caro melle subacta, & deuorata.
Malue succus instillatus.
Sonchi lacteus succus e caule manans,
& praesertim in malicorio cum oleo
coctus, instillatus.
Ari semen tritum, vel baccarum succus
ex rosaceo impositus.
Amaraci succus instillatus.

DIOSCORIDIS.

Ad internas aurium inflam-
mationes.

Crocum iniectum.
Sesamum cum rosacco impositum.

MATTHIOLI.

Ouum gallinaceum crudum cum rosa-
cco impositum.
Oleum ex ouorum vitellis inditum.
Cucurbitae ramentorum succus ex rosa-
cco instillatus.

DIOSCORIDIS.

Ad parotidas.

Oesipum impositum.

Caprarum

Caprarum montanarum fimus vino uel
aceto decoctus emplastratus.

Lini semen tritum, & emplastri modo
impositum.

Fabarū farina cū melle, & scēnugrēco il-
lita. (lita.

Rumex decoctus adhibitus.

Plantago emplastri modo adhibita.

Irionis semē tūsum, decoctūq; appositū.

Hyslopū suffitu incensum, & impositū.

Viscum cum pari resinæ ac ceræ cōmis-
stum adhibitum.

Althēa decocta illita.

Psyllum ex rosaceo, acetoque aut aqua
adhibitum.

Solani hortutani folia cum sale illita.

Galiopsis ex aceto adhibita.

Cimolia terra imposita.

MATTHIOLI.

Iridis radices recentes decoctæ, tuscq;
ex hordeacea farina illitæ.

Fœnogrēci farina in hydromelite de-
cocta, & cum axungia applicata.

Asphodeli radix decocta, & illita.

Eryngii radix decocta emplastri modo
adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad tinnitum, & incertos sonos.

Cedria infusa.

Lauri

Aurium.

Lauri baccarum succus cum vino uetere
& rosaceo instillatus.

Ficus siccae tritae cum sinapi, & liquore
aliquo exceptae iniectae.

Taurinum fel infusum.

Mel cum trito fossili sale inditum.

Porri succus cum thure, aceto, lacteque
instillatus.

Cape succus impositus.

Sinapi tritum, & cum fico iniectum.

Acerum calidum suffitum per traiecto-
rium instrumentum.

MATTHIOLI.

Lauri, & nardi in vino decocti vapor
per infundibulum immisum.

Cyclamini concisae radices in rosaceo,
amygdalino, chamemelino, & vini
modico calefactae auribus instillatae
oleo prius immisso.

Cyclamini item contusarum radicum
cum persicorum, amararumq; amyg-
dalarum nucleis, & deinde triduo aqua
vitae maceratarum expressus succus
& auribus infusus.

Oleum è colocynthide instillatum.

DIOSCORIDIS.

Ad purulentas aures.

Myrrha cum Meconio, Castoreo, &
glaucio iniecta.

Thus

Thus ex vino dulci infusum.

Refina	{	Terebinthina	{	ex melle, & oleo idita.
		Larigna		
		Abiegna		
		Picea		

Lycium infusum.

Rhois decoctum iniectum.

Myrti baccarum succus instillatus.

Olee sylvestris foliorum succus ex vino impulsus.

Taurinum fel cum caprillo, humanoque lacte instillatum.

Vrina infusa.

Umbilicus veneris cum medulla ceruina iniectus.

Asphodeli radicum succus per se, & additis thure, melle, vino, & myrrha instillatus.

Cepæ succus impositus.

Absinthium cum melle inditum.

Anisum cum rosaceo instillatum.

Sphondilii florum succus immixtus.

Poligoni succus infusus.

Stæbis decoctum iniectum.

Psyllii succus inditus.

Omphacium cum melle impositum.

Alumen sanguinalis herbe succo exceptum infusum.

Fos salis iniectus.

MATTHIOLI.

Persici foliorum succus instillatus.

Oleum

Aurium.

Oleum è vitellis ouorum.
Bursæ pastoris succus infusus.

DIOSCORIDIS.

Ad contusas aures.

Bulbi cum polenta impositi.
Sulphur cum vino, & melle illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad exulceratas aures.

Oesipum impositum.
Suillum fel instillatum.

MATTHIOLI.

Porrum non transplantatum cum terrenis vermibus in oleo decoctum.

DIOSCORIDIS.

Ad surditatem.

Hastulæ regiæ radicum ex oleo decoctum iniectum.

Cepæ succus instillatus.

Veratrum nigrum immissum, & relictum vsque in diem tertium.

Bryoniæ succus cum melle instillatus.

Flos eris conditus per fistulam flatu impulsus.

Sulphur raptim per fistulam suffitum.
Matth.

MATTHIOLI.

Oleū resinæ laricæ, aut stillatitia eiusdem aqua infusa.

Fraxini spuma è uiridi ligno in igne posito emanans instillata.

Raphani radice succus, vnà cum oleo dulcium, & amararum amygdalarū vino albo, & colocynthidis momento calefactus, & infusus.

E cæpa excauata, & cymini puluere repleta, & sub seruēti cinere cocta expressus cremor instillatus.

Oleum è colocynthide infusum.

DIOSCORIDIS.

Ad vermiculosas aures.

Cedria cum aceto instillata.

Vrina humana in malicorio decocta instillata.

Capparidis radice succus iniectus.

Calaminthæ succus instillatus.

Psyllii succus inditus.

Acetum infusum.

MATTHIOLI.

Oleum è laricea resina destillatum, aut eiusdem aqua infusa.

Foliorum persici succus instillatus.

Ficulneum lac infusum.

Persicariæ

Narium.

Perficariæ succus inditus.
Centaurii minoris succus infusus.
Menthastri succus instillatus.
Triflaginis succus impositus.
Cannabis decoctum aut eius succus infusus.

Narium.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinis profluuium.

Thus in puluerem tritum iniectum.
Cochleæ terrestres cum suo putamine trite, & impositæ.
Porri succus cū thuris polline instillatus.
Ruta trita indita.
Vrticæ utriusq; folia cū succo imposita.
Cuminum ex aceto impositum.
Ferulæ medulla intromissa.
Lisimachia imposita.
Clymeni succus inditus.
Galyopsis flos impositus.
Equiseti succus infusus.
Acetum tum potum, tum iniectum.
Stratiotes adhibita.
Chalcitis succo porri instillata.

MATTHIOLI.

Thus cū tela aranæ, oleo, & oui vnius albo mistum, & cum licinio naribus introductum.

Pannus

Pannus in annosis laricum caudicibus
reperitus intromissus.

Mastiche cum thure, sanguine draconis,
leporinis pilis combustis, oui albo
excepta, fronti q; applicata.

Caphura cum vrticæ semine immissa,
aut fronti ex sedi, aut plantaginis
succo illita.

Sandaracæ pulvis ex oui albo fronti tē-
poribusq; illitus.

Suberis cortex ex aqua calida potus.

Gallæ combustæ inditæ.

Pili ē ventre viui leporis euulsi, & vsti
intromissi.

Plantaginis stillatitia aqua cum equali
acerrimi aceti portione manuum volis
pedum plantis, & iocinori applicata.

Cepæ succus ex aceto per quam acerrimo
infusus.

Cyclamini stillatitia aqua naribus sur-
sum attracta.

Menthæ florentis stillatitia aqua balneo
calentis aquæ destillata vnciarum qua-
tuor pondere pota.

Betonicæ folia cum salis momento con-
tusa naribus immissa.

Clematis recens collo, gulæq; circūdu-

Consolida minor, & media. (cta.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Pirola.

Mille

Narium.

Millefolii sicci farina naribus indita.

Exusta sambuci folia, & in puluerem trita imposita.

Gypsum tritum, & oui albo exceptum, & fronti illitum.

Iaspis lapis suspensus, & in manu gestatus.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinem è naribus eliciendum.

Crocodilii radice decoctum bibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad polypum.

Cupressi pilule cū fico tuse, & impositæ.
Dracunculi maioris radix imposita.

Laserpitii liquor cum chalcanto aut rasili ærugine illitus, forcipe prius exciso polypo.

Flos eris inditus.

Sandaracha cum rosaceo immissa.

MATTHIOLI.

Ari radice succus.

Ari folia combusta.

DIOSCORIDIS.

Ad nariū vlcera & carcinomata.

Dracunculi maioris radix imposita.

Hederæ

Narium.

121

Hederæ succus infusus.

Sandaracha cum rosaceo iniecta.

DIOSCORIDIS.

Ad narium tædia.

Aurantiorum florum aqua infusa.

DIOSCORIDIS.

Ad narium destillationes.

Melanthii semē tritum, & linteolo colligatum ac sæpius olfactum.

DIOSCORIDIS.

Ad sternutamenta cienda.

Fibrorum testiculi iniekti.

Ocymi semen, aut succus naribus infusus.

Sinapi tritum inditum.

Ranunculi radix sicca, tritaque, iniecta.

Parmicę flores olfacti.

Struthii radix imposita.

Veratrum album tritum iniectum.

MATTHIOLI.

Be:ę succus infusus.

L ORIS

Oris & lingua.

MATTHIOLI.

Ad foetorem oris.

Iridis radix mansa.

Acorum deuoratum.

Galanga in ore detenta.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua
pota.

Moschus in ore contentus.

Moschardina ita vulgo uocata in ore
seruata.

Caryophylli mansi.

Angelicae radix mansa.

Aurum in ore contentum.

MATTHIOLI.

Ad pustulas.

Bellidis folia commansa.

DIOSCORIDIS.

Ad erodentia vlcera.

Cyperi radice farina in os indita, etiam
si vlcera depascentur vorentque.

Aspalathi ex vino decoctum, ore collu-
tum, ad tetra oris vlcera.

Acacia

Acacia indita.

Plantaginis succus in ore detentus.

Capparis in aceto decocta i collutione.

Glicyrrhyzæ succus in ore detentus.

Origani succus in ore contentus.

Leucoii flores ex melle impositi.

Testiculus serapias impositus.

Anthemis mansa.

Britannicæ succus infusus.

Tribuli succus ex melle delinctus.

Rubi decoctum in ore contentum.

Quinquefolii radiceis decoctum ore collutum.

Verbenaca altera ex vino affusa.

Staphisagria cum melle indita.

Labruscæ flos oris inspersus.

Alumen cum melle impositum.

Sal cum polenta tostum, & iniectum.

MATTHIOLI.

Aqua quæ è perforato betulæ caudice distillat in ore contenta.

Ligustri folia commansa.

Aurum in ore contentum.

Malorum puniceorum vinum cum aqua plantaginis collutum.

Oleum è calcantho illitum.

Diphryges.

Corallium.

Achates lapis in ore detentus.

Fagi folia esitata.

L 2

Pruni

Oris & linguæ.

Pruni sylvestris baccarum, & radicum
decoctum in ore contentum.

Mororum succus in collutionibus, aut
gargarismatibus additum.

Portulaca commansa.

Cyani maioris succus in ore detentus.

Flos salis in vino decoctus.

Bellidis folia commansa.

Consolidæ mediæ minorisq; folia, uel
eorum succus.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Virgæ aureæ decoctum.

Pilosella.

Potentilla.

DIOSCORIDIS.

Ad oris halitum cōmendandum.

Refina lentiscina manducata.

Myrrha commansa.

Mala medica manducata.

Anisum mansum.

Bromus cum ficcis rosis decocta, & in
ore retenta.

MATTHIOLI.

Citri decoctum collutum.

Nux myristica commanducata.

Sonchi folia commansa.

Caryophylli mansi.

Anethum

Oris & linguæ.

123

Anethum commansum.

Imperatorix radix commanducata.

Rosinarinum mansum.

DIOSCORIDIS.

Ad linguæ scabritiem.

Mentha confricata.

Rhois semen cum melle confricatum.

MATTHIOLI.

Mucago seminis cydoniorum illita.

Sebestena delibrata, & superposita.

Tamarindorum pulpa confricata.

Saccharum candi in ore detentum.

Cucumeris recentis segmina imposita.

Anguriæ pulpa adinota.

Phyllithidis stillatitia aqua.

Solidaginis minoris decoctum.

MATTHIOLI.

Ad linguæ inflammationem.

Cucumeris recentis, uel Anguriæ segmina imposita.

Anguriæ pulpa adhibita.

Lentiscinum oleum.

Trinitas herba in vino austero decocta:

L 3

Matth.

Oris & linguæ.

MATTHIOLI.

Ad paralyſim linguæ.

Mumia tum bibita, tum confricata.

Cinnamomi ſtillatitia aqua in ore de-
tenta.

Pyrethri, & longi piperis decoctum ad-
dito amaraci ſucco, & in ore retentū.

Sagapenum.

Pæoniæ ſeminis triginta grana à puta-
mine repurgata contritaque, & ex vi-
no pota.

MATTHIOLI.

Ad impeditam loquelam.

Nardi Italicæ aut Iauendulæ ſtillatitia
aqua pota.

Cinnamomi vulgaris ſtillatitia aqua tū
pota, tum in ore contenta.

MATTHIOLI.

Ad puſtulas.

Malorum punicorum vinum ex Rho-
domelle, & aqua plantaginis adhi-
bitum.

Plantaginis ſuccus illitus.

Dentium

Dentium, & gingi- varum.

DIOSCORIDIS.

Ad dentes purgandos.

Cinis	{	Purpuræ	{	dentibus affrica- tus.
		Buccinæ		
		Mitulorum		
		Conchulæ		
		Cochlearum ter- restrium.		
		Sepiæ piscis		
		Ceruini cornu.		

Plantaginis radicis decoctum in collu-
tionibus.

Aristolochia rotunda confricata.

Alcyonium quintum

Pumex

Arabicus lapis

Samius lapis.

{ dentibus affri-
cata.

MATTHIOLI.

Camarorum lapilli in puluerē affricati.

Maluæ radix sub cineribus decocta ma-
dida papyro circumoluta, deinde sic-
cata, & pro dentifricio usurpata.

Cyclamini succus cum melle illitus.

L 4 Diosc.

Dentium, & gingivarum.
DIOSCORIDIS.

Ad dentium dolores.

Piceæ & pini folia trita ex aceto decocta frequenti collutione.

Cedria dentium cauis indita.

Platani corticis ex aceto decoctum ore collutum.

Tamaricis foliorum ex vino decoctum in ore detentum,

Olei amurca in cupreo vase ad mellis crassitiem decocta ex aceto, aut vino, aut mulso colluta.

Mori corticis decoctum, aut pariter foliorum in collutionibus additum.

Ficulneum lac lana exceptum, & cauis dentibus inditum.

Anguium senecta ex aceto decocta in collutionibus.

Pastinacę piscis aculeus in eius cauda prominens dentibus adhibitus.

Ranarum ex aqua, & aceto decoctum in collutionibus.

Lacertę iecur cauis dentibus impositus. Vermes terreni oleo elixi, & in contrariam aurem instillati.

Rumicis decoctum in collutionibus.

Asparagi radicum decoctum in ore contentum.

Asphodeli radicum succus in contrariã aurem infusus.

Allii,

Dentium, & gingivarū. 125

Allii, tedę, thurisq; simul decoctum in ore contentum.

Ononis radicis ex posca decoctum in collutionibus.

Capparidis seminis decoctum in collutionibus.

Idem præstant capparidis cortex, Quin & radix commanducata.

Lepidii (vt aiunt) radix collo suspensa.

Ranunculi radix imposita.

Anagallidis succus in contrariam narium partem infusus.

Hederę corymborum acini quinque cū rosaceo in malicorio feruefacti in contrariam aurem instillati.

Chamæleonis nigri decoctum in ore contentum.

Spinę albę decoctum in collutionibus.

Leucacanthę radix commanducata.

Absinthii decoctum suffitum.

Hyssopi ex aceto decoctum in ore retentum.

Panaces heracleum dentiū cauis inditū.

Pyrethri decoctum ex aceto in ore acceptum.

Peucedani succus cauis dentiū inditus.

Laserpitii liquor cauis dentiū impositus.

Galbanum illitum & eorum cauis inditum.

Apiastri decoctum in collutionibus.

Althę decoctum ex aceto in ore retentum.

L 3 Betonicę

Dentium, & gingiuarum.

Betonice decoctum, ex vino, uel aceto.

Clematis prima commanducata.

Polemonii radix commanducata.

Quinquefolii radice decoctum in ore retentum.

Hyoscyami radice ex aceto decoctum in collutionibus.

Solani somnifici ex vino decoctum in ore retentum.

Ephemerii radice decoctum in collutionibus.

Verbasci decoctum collutum.

Arctii ex vino decocta, & in ore detenta.

Cucumeris sylvestris decoctum in os sumptum. (bus.

Colocynthis decoctum in collutionibus.

Staphisagrie decoctum ex aceto in ore contentum.

Tithymali caracie lac dentium cauernis inditum, de te prius cera munito, ne lac in fauces incidat.

Acetum calefactum in collutionibus.

Sori dentium cauis inditum.

MATTHIOLI.

Mastiche cum cera odorata manfa.

Cupressi conorum decoctum ex aceto collutum.

Sandaracæ suffitus per infundibulum receptus.

Iuni-

Dentium, & gingivarū. 126

Iuniperinum oleum calidum ore contentum.

Quinta essentia nostra lib. 5. cōment. de vino descripta in ore contenta.

Betonicæ decoctum ex uetere vino paratum in ore detentum.

Iuniperinarum baccarum ex vino albo decoctum, additis cupressi pilulis, & myrti foliis, & aquæ vitæ momento sæpe collutum.

Myricæ decoctum ore uersatum.

Castoreum ex oleo auri dolentis lateris infusum.

Calli equorum cruribus innati triti, & per aurem oleo infusi.

Plantaginis radix cōmansa, quinetiam dentium collusionibus incocta.

Sinapis semen mansum.

Nasturtii succus calidus in aurem dolentis lateris instillatus.

Cyclamini succus cum melle in ore detentus.

Iridis radix mansa, & eius decoctum collutum.

Nardi Italicæ, aut lauendulæ decoctum ore contentum.

Hyoscyaminum oleum tepidū ore contentum.

Imperetoriæ radicum decoctum ex vino austero in ore detentum.

Rosmarini decoctum ex vino austero, & aceto.

L 6 Bistortæ

Dentium, & gingiuarum.

Bistortę radicū puluis, cū aluminis, & py-
rethri momento cauis dētiū inditus.

Potentillę decoctum ore collutum.

Millefolii folia commanducata.

Angelicę radix mansa, & dentium ca-
uis imposita.

Calthę aridę puluis dētiū cauis inditus.

DIOSCORIDIS.

Ad dentes cariosos frangendos.

Cedria dentium cavitatibus indita.

Amurca olei cum omphacio recocta ad
mellis crassitudinem, & imposita.

Pastinacę piscis aculeus impositus.

Ramunculi radix iniecta dentium cavi-
tatibus indita.

Chameleonis nigri radix cauernis den-
tium imposita.

MATTHIOLI.

Cyclamini succus cum melle in ore de-
tentus.

Chelidonii maioris succus inditus.

DIOSCORIDIS.

Ad firmandos commotos dētes.

Lentisci decoctum in ore contentum.

Syluestris oleę oleum in ore contentū.

Sory

Dentium, & gingivarū. 127

ory in collutionibus.

lumen cum aceto, & melle solutum,

& adhibitum.

olymbadū muria in collutionibus ad-
dita.

MATTHIOLI.

rispini baccarum succus ore detētus.

iburni foliorum ex posca decoctum
collutum.

espilorum decoctum ore contentum.

irgæ sanguineæ bacce admote.

cornorum, & sorborum decoctum.

ammarorum lapilli contriti, & leui-
ter affricti.

ortulaca commansa.

elenium à ieiunis commanducatum,

sed illud esse oportet, quod erutum
terram non contingat.

irgæ aureæ decoctum.

otentilla.

ragaria & eius radicum decoctum ex
vino austero.

Corallii pulvis affrictus.

MATTHIOLI.

Ad dentitionem facilitandam.

lapis è capite limaciarū sine testis exi-
stentium ademptus, & alligatus.

Diosc.

Dentium, & gingiuarum.

DIOSCORIDIS.

Ad dentium torporem.

Portulaca commauducata.

DIOSCORIDIS.

Ad fluuidas gingiuas.

Cyperi farina imposita.

Rosarum aridarum ex vino decoctarū
expressus liquor in collutionibus im
positus.

Colymbadum muria in ore contenta.

Oleum syluestris oleæ in ore detētum.

Gallæ quoquo modo adhibitæ.

Mali punici florentis cytini in decoctis
macerati, & in collutionibus additi.

Prunorum foliorum decoctum in ore
detentum.

Lac asininum in collutionibus.

Pulegium siccatum, crematumque & in
puluerem tritum appositum.

Rubi decoctum in ore detentum.

Staphis agriæ decoctum in collutio-
nibus.

Omphacium cum melle impositum.

Acetum in collutionibus adhibitum.

Rubigo ferri adhibita.

Alumen quocunque modo adhibitum.

Sal tostum cum polenta impositum.

Alaba-

Dentium, & gingivarū. 128

Alabastrites } lapis tritus impositus.
Smyris }

DIOSCORIDIS.

Ad erosas putridasq; gingiuas.

Cancamum impositum.

Lycium atritum impositum

Plantaginis succus in ore detentus.

Aloe ex vino, & melle illita.

Tribuli vtriusque fructus ex melle impositus.

Labruscæ florum cōbustorum cinis cum melle illitus.

Acetum in collutionibus.

Chalcitis

Alumen

Pumex

Aerugo

} trita & imposita.

MATTHIOLI.

Cochlearum putaminum exustorum cinis infrictus.

Cicer columbinum aqua maceratum, & deinde contusum, & illitum.

Potentilla quouis modo usurpata.

Fragariæ herbæ & radicum decoctum.

Punicorum malorum vinum ex rhodomelle & plantaginis aqua.

Corallii pulvis adhibitus.

GVTI

Gutturis, & Gula.

DIOSCORIDIS.

Ad Anginam.

Pix liquida peruncta.

Mori fructus succus i ereo vase decoct⁹,
insolatusq; cū mellis exiguo illitus.

Millepede, siue onisci ex melle inuncti.

Cinis crematarum hirundinum ex mel-
le more emplastri adhibitus.

Hirundines sale inueteratae drach. i.

pondera cum aqua pote.

Fel taurinum cum melle inunctum.

Fel testudinum inunctum.

Acetum gargarizatum.

Mel gargarizatum.

Cepē succus inunctus.

Piper cum melle appositum.

Absinthium cum melle, & nitro illitū.

Raphani semen ex aceto mulso garga-
rizatum.

Hyslopi cū fico decoctum gargarizatū.

Laserpitii liquor cum mulsa aqua gar-
garizatum.

Violæ purpureæ ex aqua coctæ potæ.

Elaterium efficacissime illinitur cū mel-
le, uetere oleo, aut felle taurino.

Sal ex melle, & oleo, acetoq; illitum.

Sparthii succus è ramis in aqua macera-
tis, & mox tuis extractus & illitus.

Matth.

Gutturis, & gulæ. 129

MATTHIOLI.

Mumia cum oximellite gargarizata.

Mororum succus illitus.

Succinum suffitum & eius fumus per infundibulum in os receptum.

Cochleæ cum acu vulneratæ succus cum penna illitus.

Viperæ caput in linteolo colligatus collo suspensus.

Caminum stercus fistula insufflatum.

Virgæ auræ decoctum gargarizatum.

Ebuli radicum succus circa gulam calidus cum linteolis illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad gutturis inflammationes.

Cinis crematarum hyrundinum ex melle more emplastri applicitus.

Lac gargarizatum.

Ranæ oleo elixæ ceruicis & colli abscessibus illitæ.

Mel illitum.

Origani uirentis succus gargarizatus.

Helxine succus gargarizatus forisq; inunctus.

Urticæ utriusque succus gargarizatus.

Chalcitis imposita.

Alumen illitum.

Sal tostum cum melle inunctum.

Acetum

Gutturis, & gulæ.

Acetum gargarizatum.
Aloe cum vino, aut melle imposita.
Britannicæ succus illitus.
Tribuli fructus ex melle impositus.
Rubi mororum succus gargarizatus.
Ficuum siccarū decoctum gargarizatū.

MATTHIOLI.

Cassię solutiue pulpa insumpta.
Crespini baccarum succus gargarizatus.
Vux spinæ succus.
Ribis vulgaris succus.
Lactucæ succus cum punici mali succo
gargarizatus.
Trinitas herba in vino austero decocta.
Virgę aureę decoctum gargarizatum.
Ebuli radicum succus circa gulam cali-
dus cum linteolis illitus.
Malorum punicorum vinum ex rosarū
aut plantaginis aqua gargarizatum.

DIOSCORIDIS.

Ad prolapsam columellam.

Lasertii liquor cum melle inunctus.
Pruni foliorum ex vino decoctum gar-
garizatum.
Omphacium impositum.
Flos eris in puluerem subtilissimum im-
positus.

Matth.

Gutturis, & gulæ. 130

MATTHIOLI.

Pix liquida calefacta vnâ cum thure & mastiche deraſo occipitio applicita.

Lauri baccæ cum cumino, hyſſopo, origano, & euphorbio melle exceptæ & ſummo capiti calidè adhibitæ.

Viburni decoctum gargarizatum.

Cochleæ putamen uſtum, & inſperſum.

Phyllitidis ſtillatitia aqua gargarizata.

Virgæ auræ decoctum gargarizatum.

Conſolida minor, & media.

Sanicula.

Auricula vrſi.

Piloſella.

Potentilla.

Pyrola.

Punicorum malorum vinum cum aqua plantaginis gargarizatum.

DIOSCORIDIS.

Ad gulæ deſtillationes.

Papaueris vaſculorum decoctum ex melle in eclegmatis forma redactum, ſæpiusq; linctum.

Acetum gargarizatum.

Bdellium cum ieiuna ſaliua dilutum & illitum.

Verbenaca altera ex vino gargarizata.

Omphacium impositum.

Flos

Gutturis, & gulæ.

Flos eris pulverizatus, & inditus.
Alumen impositum.

MATTHIOLI.

Crespini baccarū succus } in gargarif-
Mespilorum decoctum. } matibus.

Pruni sylvestris baccæ, & eius radices in
gargarismis addite.

Tragacanthæ lachryma delincta.

Punicorum acidorum malorum vinum
gargarizatum.

DIOSCORIDIS.

Ad faucium, & tracheæ arteriæ
asperitates.

Myrrha linguæ subdita ibiq; liquata.

Ptisana hordeacea gargarizata.

Amylum delinctum.

Sinapis succus gargarizatus.

Glycyrrhizæ succus linguæ subditus.

Tragacantha in eclegmate cum melle
sumpta.

Laserpitii liquor aqua dilutus in de-
linctu.

Symphitum petreum cōmanducatum.

Quinquefolii radice decoctum garga-
rizatum.

Aethiopis cum melle in eclegmate.

Lac gargarizatum.

Licium attritum, & delinctum.

Matth.

Pectoris, & pulmonis. 131
MATTHIOLI.

Cassie solutiue pulpa insumpta.

Oleum amygdalarum dulcium.

Oleum sesaminum.

Cochlee illotæ coctæ, tritæ, & ex passo
potæ.

Oui album insumptum crudum.

Maluæ cum foliorum, tum radicum de-
coctum gargarizatum.

Atriplex coctum deuoratum.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Solidago minor ex aceto, & aqua rosa-
cea decocta, & in ore colluta.

Pectoris, & pulmonis.

DIOSCORIDIS.

Ad cruenta sputa, & sanguinis
reiectiones.

Ouum tepidum bibitum.

Cornu ceruini cinis lotus, & ebibitus
cum tragacantha.

Clymenum potum.

Serpylli succus drachmarum duarum pon-
dere cum aceto potus.

Fimum caprinum in vino aquaue po-
tum tritum.

Triticea farina glutinis modo elixa in
delinctu data.

Amylum

Gutturis, & gulæ.

Amylum potum.

Ferulæ uiridis medulla pota.

Portulaca ad summum cocta deuorata.

Plantago quoquo modo exhibita, præfertim succus.

Eiusdem semen potum.

Porri semen drachmarum duarum pondere cum paribus myrti baccis.

Agaricus trium obolorum pondere cum aqua mulsa potus.

Rhaponticum haustum.

Lyfimachiæ succus haustus, & perfusus.

Centaurii maioris radix pota.

Spinæ albe radix hausta.

Arabice spinæ radix ebibita.

Aloe cochearium duorum pondere cum frigida aqua uel sero pota.

Poligoni maris succus epotus.

Saluiæ succus in orbiculos concretus cum melle sumptus.

Symphitum petreum cum aqua potum.

Menthæ succus cum aceto haustus.

Altheæ decoctum potum.

Betonice folia trium obolorum pondere in diluta uini portione hausta.

Symphiti alterius radix pota.

Achillea hausta.

Tragi cacumina decem in vino bibita.

Personatæ radix cū pineis nucibus pota.

Isopyri semen potum.

Adiantum potum.

Tricomanes pota.

Vitis

Gutturis, & gulæ. 132

Vitis vinifere foliorum, & capreolorum
succus haustus.

Labruscæ flores poti.

Omphacium parcè potum.

Corallium sumptum.

Hematites lapis

Morochthus lapis } cum mali punici
 } succo pota.

Samia terra.

MATTHIOLI.

Thus epòtum.

Mastiches in potu.

Mumia hausta.

Iuniperi gummi bibitum.

Succinci pastilli exhibiti.

Ligustri florum aqua pota.

Crespini baccarum succus haustus.

Hypocistis potui data.

Rhodofaccharum.

Quercus foliorum stillatitia aqua pota.

Glandes, & gallæ in potionibus datæ.

Suberis corticis cinis haustus.

Castanearum tenuior tunica in pulue-
rem hausta.

Perfici lachryma ex aqua plantaginis,
aut portulacæ pota.

Mespili folia in puluerem trita, & po-
tui data.

Virgæ sanguineæ bacca.

Corna

Sorba

} commanducata.

Cochleæ elixæ, & in cibo sumptæ.

Plan-

281 Pectoris, & Pulmonis.

Plantaginis succus addito Armenio bo-
lo aut hematite lapide.

Cyclamini radice stillatitia aqua fena-
rum vnciarum pondere vna cum sac-
chari albissimi vncia pota.

Ophioglosson ex aqua equiseti potum.

Rhabbarum drachmæ pondere cum
mumiæ momento haustum.

Tragacanthæ lachryma insumpta.

Saluæ succus potus.

Flos solis vnâ cum radicibus contusus
& potus.

Hyperici seminis farina è polygoni suc-
co hausta.

Pilosella

Consolida minor

Consolida media

Sanicula

Auricula vrsi

Caryophyllatæ radix

Lagopi semen

Virga aurea

Potentilla

Pyrola.

quouis modo
hausta.

Pulmonariæ succus potus, & herba ipsa
quocunque modo usurpata.

Amaranthi purpurei flos potus.

Millefolii succus, aut sicci farina ex sym-
phiti maioris, aut plantaginis aqua
pota.

Punicorum malorum vinû ex aqua por-
tulacæ, aut rosarum ebibitum.

Armenia

Pectoris, & pulmonis. 133

Armenia terra insumpta.

Corallium epotum.

Iaspis lapis suspensus, aut iocinori admo-
tus.

DIOSCORIDIS.

Ad phthisim.

Pistacia } per se aut ex melle
Pineæ nuces } sumpta.

Terebinthina resina per se, uel ex melle
more eclegmatis deuorata.

Pix liquida in eclegmate ex melle cya-
thi mensura deuorata.

Iuniperi bacce haustæ.

Lauri bacce trite cum melle, & cū passio
deuorata.

Ficus sicca cum hyssopo feruefactæ,
& potæ.

Cancro fluuiatiles elixi cum suo iure in-
sumpti.

Lac humanum ex vbere suctum.

Ius esculētum omnium adipum datum.

Plantago in potu exhibita.

Porrum cum melle decoctum.

Agaricus drachmæ pōdere cū passio sum

Acanthi radices potæ. (ptus.

Marrubii folia siue expressus succus po-
tus.

Betonice folia cum melle data.

Myrrhis in sorbitione pota.

Asii lapis flos ex melle delinctus.

M

Matth.

Pectoris, & pulmonis.

MATTHIOLI.

Larigna resina in eclegmate delincta.

Pinei nuclei cum melle, aut saccharo comesti.

Cochleæ nemorales à mucagine repurgatæ, & ex lacte bubulo decoctæ vnâ cum tussilagine, & cibi loco propinatae.

Ranæ ex capi, aut gallinæ iure decoctæ deuoratae.

Gallorum iuuenum testes in cibo usurpati.

Brassica percocta frequenter deuorata.

Melopeponum seminū cremor haustus.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Veronica mas.

Saluiæ catapotia, vide saluiæ comment.

Geranii primi radix ex vino pota.

Pulmonariæ succus frequenter potus, aut herba ipsa quocunque modo usurpata.

Vuë passæ in cibis deuoratae.

Armenia terra quoquo modo sumpta.

Corallium potum.

Hematites lapis sumptus.

DIOSCORIDIS.

Ad pulmonis abscessus.

Semen cyclamini secundæ speciei quadraginta diebus potum.

Trago-

Pectoris, & pulmonis. 134

Tragoriganum cum melle in eclegmate exhibitum.

Tussilaginis siccae incenseq; fumus ore haustus apostemata interna pectoris rumpit.

MATTHIOLI.

Mustellarum pulmo deuoratus.

Vulpinus item pulmo in puluerem tritus & assumptus.

Fœnugræci decoctum potum.

Pulmonaria frequenter sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad suspiriosos.

Lauri baccae tritæ cum melle, vel passo & exhibitæ.

Ficus sicce cum hyssopo decoctæ, potæ.

Vulpinus pulmo exiccatus bibitus.

Ius senum gallorum potum.

Vinum hyssopites bibitum.

Plantago cū lenticula decocta comesta.

Rhaponticum bibitum.

Aqua mulsa pota.

Aristolochia rotunda bibita.

Centaurii maioris radix pota.

Hyssopum decoctum cum fico, aqua, melle, Rutaq; potum.

Stechas ex aqua decocta pota.

Pulegium cum melle, & aloe potum.

M 2 Scylla

Pectoris, & pulmonis.

Scylla ex melle trium obolorum pon-
dere delincta.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia eodem modo pota.

Baccharis radice decoctum haustum.

Ruta ebibita.

Peucedani succus in ouo sumptus

Nigella in vino pota.

Galbanum deglutitum.

Marrubii decoctum, siue expressus suc-
cus epotus.

Parthenium ex oximelite sumptum.

Anagyris folia cum passio bibita.

Peryclimeni semen potum cum vino.

Adiantipotum decoctum.

Fidicula, siue trichomanes hausta.

Elateriū optima suspensio est purgatio

Taphiæ succus exhibitus.

Brionia cū melle in eclegmate sumpta.

Sadaracha nō resina in catapotiiis data.

Sulphur in ouo sumptum, uel suffitum.

Agaricum drachmæ vnius pōdere datū.

Cācamum haustum ex aqua uel mulso.

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum potum.

Iridis radices saccharo cōditę comestę.

Phu, siue valeriana, præsertim cum dul-
ci radice, vuis passis, & anisi semine
cocta.

Cochleæ deuorata.

Cinnamomi

Pectoris, & pulmonis. 135

Cinnam. vulgaris stillatitia aqua pota.
Cassia solutiue pulpa cum decocto hyssopi epota.

Balsami factitii liquores & oleum.

Helenium conditum saepe deuoratum.

Oleum amygdalinum.

Oleum cnicinum.

Pinei nuclei melle aut saccharo excepti & deuorati.

Larigna, aut terebinthina resina epota.

Pix ex melle lincta.

Persici lachryma ex mulso aut becchii decocto pota addito croci mometo.

Amygdalæ.

Nuclei pinei.

Oleum de nucibus Indicis.

Cochleæ magnæ semicoctæ deuoratae prima die vna, sequenti duæ, tertio tres, quarto duæ, quinto vna.

Brassicæ caulium medulla ex cremore amygdalino decocta, & cum melle in eclegmate parata.

Sonchi lacteus succus in potu sumptus.

Traforum cremor è carniū iure paratus potus.

Porrum coctum, & ex melle delinctum.

Cepa elixa, aut sub prunis tosta, & cum saccharo deuorata, & butyri recentis momento.

(bitū.

Sinapis semen in cibo uel portione exhi

Ari radix decocta, melleq; excepta deuorata.

M 3

Eadem

Pectoris, & Pulmonis.

Eadem cineribus tosta, & ex amygdalino oleo exhibita.

Agaricum in potionibus additum.

Gentiana, & eius aqua stillatitia.

Aristolochia rotunda.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Veronica mas.

Salvia.

Gattaria.

Hyssopum.

Menthastrum.

Calamintha.

Amaraci decoctum.

Imperatorizæ radix.

Senæ decoctum uel dilutum potum.

Sagapenum ex Helenii aut hyssopi decoctum haustum.

Botrys decoctum aut ipsa herba, ex dulcis radicis decocto pota.

Armenia terra delincta.

Vtriusque securidacæ semen ex melle, aut defruto delinctum.

Stibium nostrum potum.

Scabiosa quoquo modo usurpata.

Cnici seminis medulla saccharo eclegmatis modo assumpta.

Quinta essentia nostra cum iulapio violaceo frequenter epota.

DIOSCORIDIS.

Ad tussim.

Iris Illyrica assumpta.

Carda-

Pectoris, & pulmonis. 136

Cardamomum ex aqua potum.
Cinnamomum deuoratum uel bibitū.
Calamus odoratus suffitus per se, uel ex
resina terebinthina.
Helenii eclegma ex melle deglutitum.
Myrrha ad quantitatem fabæ deuorata.
Stirax
Bdellium] data in eclegmate.
Terebinthinę resinæ ex se, uel ex melle
eclegma delinctum.
Mastix pota.
Iuniperi bacce potę.
Cedri fructus deuorati.
Paliuri semen potum.
Ladanum in medicamentis, & malag-
matibus insertum.
Cerasi gummi cum uino diluto haustū.
Amygdalę amaræ cum melle, & lacte
in illinctu data.
Gummi amygdalarum amararum cum
uino diluto potum.
Nuces auellanę cum aqua mulsa potæ.
Ficus siccæ deuoratæ.
Chamedri decoctum potum.
Scordium ebibitum.
Tussilago sicca sumpta, siue incensa ac-
cepto fumo per os.
Propolis suffita.
Mel deglutitum.
Farina tritici glutinis modo elixa, &
ad lingendum cum mentha & buty-
ro data.

M 4 Farinæ

Pectoris, & Pulmonis.

Farinæ auenæ cremor in sorbitione receptus.

Semen lini cum melle, & pipere sumptum.

Fabæ in cibis acceptæ.

Raphanus elixus manducatus, præsertim in uetere tussi.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa deuorata.

Asphodeli radix trium drachmarum pondere pota.

Allium crudum, & coctum assumptum in ueteri tussi.

Irionis semen cum melle linctum.

Piper delinctum acceptum.

Scilla cum melle in eclegmate in diuturnis tussibus. (qua.

Centaurii maioris radix huasta in anti Tragacantha in eclegmate cum melle.

Hyslopum cum melle, fico, rutaque ex aqua decoctum bibitum.

Sthæchas eodem modo parata.

Origanum in eclegmate cum melle linctum.

Tragoriganum eodem modo paratum.

Baccharis radicum decoctum potum in diutina tussi.

Panaces cum vino dulci potum.

Seselis massiliensis radix, & semine haustum.

Smyrniæ radix comesta.

Dauci semen potum in diutina.

Peucedani succus in ouo sumptus.

Laserpitii liquor in sorbili ouo exhibitus.

Marrubii

Pectoris, & pulmonis. 137

Marrubii decoctum, siue expressus succus bibitus.

Galbanum deglutitum in uetere.

Helsing succus cyathi pondere bibitus in diutina.

Equiseti radix, & herba pota.

Iunci decoctum bibitum.

Papaueris vascula aqua ad dimidiū decocta, decoctoq̃ue addito melle, ut eclegma fiat ad lingendum.

Hyoſcyami semen potum.

Verbasci decoctum epotū in antiqua.

Cacalię radix vino madefacta, comesta.

Bryonia cum melle in eclegmate delincta.

Vuę passię albę caro exiccata deuorata.

Aqua mulsa pota.

Thapsia illita.

Vinum hyssopites bibitum.

Sandaracha suffita cum resina, accepto vapore per fistulam, uel traiectorium in os.

Sulphur in ouo sumptum, uel suffitum.

MATTHIOLI.

Acori decocti uapor hiati ore exceptus.

Phu radix cum dulci radice, uis passis & semine anisi cocta.

Cassię solutiue pulpa cū decocto hyssopi sumpta.

Helenium conditum deuoratum.

M 5 Eiusdem

Pectoris, & pulmonis.

Eiusdem sicci farina sumpta.
Oleum dulcium amygdalarum potum.
Capotia decem ex thuris drachma, &
agarici scrupulis quaternis cum hyf-
sopi succo formata, & ex iis vnum ad
introitum lecti sumptum.
Larigna resina in eclegmate delincta.
Nuclei pinei melle, & saccharo exce-
pti, & deuorati.
Mumia ex zizypharum hordei, & my-
xorum decocto epota, uel pectora-
li decocto.
Cupressini coni impari numero minu-
tissime triti, & ex vino uetere hausti.
Siliquarum decoctum potum.
Persici lachryma ex malsa, aut hordei
decocto pota.
Sebestena.
Zizyphę.
Saccharum candi uocatum.
Fœnugręci decoctum potum.
Melopeponum seminum cremor.
Eruca cocta, & cum saccharo sumpta.
Traforum cremor haustus.
Porrum coctum ex melle delinctum.
Cępa elixa, aut cineribus tosta ex sac-
charo, & butyro deuorata.
Ari radix cocta ex amygdalino oleo
sumpta.
Lac potum in quo Ari radix fuerit in-
cocta.
Agaricum in potionibus additum.
Glycyr-

Pectoris, & pulmonis. 138

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Veronica mas in sua ipsius stillatitia
aqua hausta.

Salvia.

Botrys herba ex dulcis radicis decocto
pota, aut eius decoctum.

Consolidæ regalis flores poti.

Vux passæ quoquo modo usurpatæ.

DIOSCORIDIS.

Ad pectoris asperitates.

Glycyrrhizæ succus in ore retētus quo-
usque colliquescat.

Radix cacaliæ in vino madefacta, & de-
linctæ.

MATTHIOLI.

Cassiz solutiuz pulpa hausta, & deuo-
Amygdalinum oleum. (rata.

Sesaminum oleum.

Perfici arboris lachryma ex mulsæ aut
becchii aqua hausta.

Porrum coctum ex melle delinctum.

Tragacanthæ lachryma.

DIOSCORIDIS.

Ad vocem expediendam.

Myrrha linguæ subdita quosque tota li-
quescat.

M 6 Tra-

Pectoris, & pulmonis.

Tragacantha ex melle in delinctu adhibita.

Lasir aqua dilutum, & in sorbitione sumptum.

Stirax delincta.

Brassica commanducata.

Vinum hyssopites.

MATTHIOLI.

Iridis radices decoctum potum.

Iridis radices condite deuoratę.

Amygdalinum oleum

Sesaminum oleum

Cnicinum oleum

} potum.

Stirax hausta.

Perfici arboris lachryma ex mulsā pota.

Oleum ē nucibus Indicis.

Malua cocta, & in cibis apposita.

Porrū coctum cum melle sumptum.

Glycyrrhizę radix, & eius succus.

Vuę passę in cibis deuoratę.

DIOSCORIDIS.

Ad pleuritim.

Suillus adeps ex vino lotus, & cum cinere, & calce coctus impositus.

Pastinacę erraticę semen potum.

Sagapenum emplastri modo illitum.

Matth.

Pectoris, & pulmonis. 139

MATTHIOLI.

Terebinthina resina hausta.

Pomum dulce cineribus incoctum, & glycyrrhizæ succo, amylo, & saccharo conspersum deuoratum.

Amygdalæ, & earum lacteus cremor cum saccharo.

Cochleæ testis exutæ ex ptisana hordeacea abfortæ.

Eedem contusæ, & loco dolenti adalligatæ.

Seminis lini oleum recens potum felibre pondere.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Cardui benedicti stillatitia aqua pota vnâ cum seminis semidrachma.

Antemidis decoctum potum, uel eiusdem florum stillatitia aqua.

Syrupus deiectorius ex violarum diluto paratus.

DIOSCORIDIS.

Ad lateris dolores.

Fimum caprillum cū cera, & oleo subactum impositum.

Hordeacea farina vnâ cū meliloto & papauerū vasculis ex multo elixa illita.

Brassicæ caules uirides cremati, & suillo adipe excepti, & impositi. (tū.

Leucacathæ radicis ex vino decoctū po-

Asphodeli

Pectoris, & pulmonis.

Asphodeli radix drachmæ pondere ex vino hausta.

Gentianæ radicis succus drachmæ pondere sumptus.

Aristolochia rotunda ex aqua bibita.

Centaurii maioris radix pota.

Lafer in sorbitionibus datum.

Galbanum illitum.

Marrubii folia ex melle adhibita.

Trifolii bituminosi folia, semēūe potū.

Aethiopis pota.

Acori decoctum potum.

Costus cum absinthio, & vino potus.

Agallocum ex aqua potum.

Myrrha fabæ pondere deuorata.

Bdellium haustum.

Resina terebinthina illita appositāe.

Bryonia ex melleo eclegmate delincta.

DIOSCORIDIS.

Ad purulentas excreationes.

Ocimum cum polenta illitum.

Vrticæ utriusque semen cum melle delinctum.

Tragoriganum ex melle in eclegmate sumptum.

Chrysocome pota.

Aqua mulsa hausta.

Pulmonaria.

Lentis palustris stillatitia aqua pota.

Diosc.

Pectoris, & pulmonis. 140
DIOSCORIDIS.

Ad pulmonis inflammationes.

Irionis semen cum melle delinctum.

Betonice folia drachmarum duarum
- pondere in aquæ mulse cyathis qua-
tuor pota.

Personate radix cū pineis nucibus sum-
Athiopis hausta. (pta.

Vinum hyssopites.

Sandaracha ex mulso data (hoc medi-
camentum ego nunquā probauerim.)

Sulphur in ovo potum, uel suffitum.

MATTHIOLI.

Larigna resina, & terebinthina in ecleg-
mate delincta.

Pinei nuclei melle, aut saccharo exce-
pti & deuorati.

Terebinthina resina deuorata.

Pix liquida cum melle mixta, & de-
uorata.

Ulmī folia quæ orientem spectant impa-
ri numero decerpta, & cum totidem
piperis granis contrita ex uino cre-
tico hausta.

Amygdalæ & earum lacteus cremor.

Nuclei pinei.

Tragacanthæ lachryma delincta.

Glycyrrhizæ succus.

Veronica

Pectoris, & pulmonis.

Veronica mas in sua ipsius aqua propinata.

Botrys decoctum diebus pluribus potum, aut herba ex glycyrrhizę decocto hausta.

Scabiosę farina pota, aut recentis herbe succus cum melle delinctus, & totius plantę decoctum pluribus diebus ebibitum.

Pulmonaria quomodolibet usurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad asthmaticos.

Lauri baccę ex melle uel passo sumptę.
Ficus ficcę cum hyssopo feruesactę, & bibitę.

Vrina impubis pota.

Ruta epota.

Cyclamini alterius semen potum.

Dracunculi maioris radis tosta, & elixa cum melle in eclegmate sumpta.

Aqua mulsa pota.

Sphondilii semen, & herba ipsa in sorbitione.

Equiseti radix, & folia insumpta.

Cnici seminis medulla ex saccharo eclegmatis modo sumpta.

Scabiosa, & eius succus, atque decoctum quomodolibet usurpatum.

Abrotani utriusque semen tritum, & cum aqua potum.

Hyssopum

Pectoris, & pulmonis. 141

Hyssopum cum fico, melle, rutaque ex
aqua decoctum potum.

Calamynthæ decoctum potum.

Vinum hyssopites haustum.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia cum melle hausta.

Seseli massiliense potum.

Fidiculæ siue trichomanis decoctum bi-
bitum.

Cuminum cum posca sumptum.

Smyrniæ radix comesta.

Thapsia illita.

Ammoniacum bibitum. (sta.

Melissophylli folia in eclegmate delin.

Tussilago sicca, & suffita adeo vt fumus
in os ingreditur.

Hippophesti succus trium obolorum pon-
dere haustus.

Botrys pota uel in eclegmate data.

Periclymeni semen potum.

Adianti decoctum bibitum.

MATTHIOLI.

Iridis radices conditæ deuoratae.

Phu radix cum dulci radice, & semine
anisi decocta.

Cubebæ assumptæ.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua po

Castiæ solutiue pulpa cum hyssopi deco-
cto epota. [stū.

Balsami factitii liquores, & oleum hau-
Amygda-

Pectoris, & pulmonis.

Amygdalarum amararum oleum potū.
Cnicinum oleum bibitum.
Myrrha hausta.
Stirax deuorata.
Terebinthina, siue larigna resina in-
sumpta.
Pix liquida ex melle pota.
Caricæ duę, aut tres in aqua uite ma-
ceratę deuoratę.
Eruī farina melle excepta delincta.
Sonchi lacteus succus potui datus.
Porrum coctum ex melle delinctum.
Cæpa elixa, aut cineribus tosta addito
melle, & butyro deuorata.
Sinapis, aut nasturtii semen in cibo, aut
potione exhibitum.
Ari radix cocta, & ex melle delincta,
aut ex amygdalino oleo.
Agaricum in potionibus additum.
Gentiana, & eius aqua stillatitia.
Aristolochia rotunda hausta.
Centaurii magni radix.
Veronica mas.
Hyssopum.
Salvia.
Menthastrum.
Gattaria.
Amaracus.
Senę decoctum uel dilutum.
Sagapenum ex helenii uel hyssopi deco-
cto potum.
Botrys herbe decoctum, addito uiola-
ceo

Pectoris, & pulmonis. 142

ceo melle, aut herba ipsa è glycyrrhizę decocto.

Securidacę utriusque semen ex melle, aut defruto delinctum.

Quinta essentia nostra lib. 5. commēto de vino descripta ebibita.

Stibium nostrum quatuor granorum pondere haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad renitentes excreationes.

Iris Illyrica pota.

Coagulum fere omne potum.

Raphanus elixus deuoratus.

Porrum cum ptisana coctum esui datū.

Nasturtium coctum in sorbitione acceptum.

Bulbi breui coctura elixi, & comesti.

Ammoniacum in eclegmate linctum.

Scordium potum.

Thapsia linita.

Lini semen in eclegmate delinctum.

Scillę siccę oboli tres ex melle in eclegmate sumpti.

Marrubium siccum potum cum iridis farina.

Vinum hyssopites haustum.

MATTHIOLI.

Iridis Illyricę radicis decoctum potum.

Oleum

Pectoris, & pulmonis.

Oleum amygdalarum.

Pinei nuclei melle, aut saccharo excepti, & deuorati.

Terebinthina resina in eclegmate delincta.

Erui farina melle excepta, & delincta.

Agaricum.

Veronica mas.

Hyssopum.

Pulmonaria quoquo modo sumpta.

Salvia.

Scabiosæ puluis, quinetiam succus, atq;
decoctum, hausta.

MATTHIOLI.

Ad purgandum pectus.

Terebinthina resina deuorata.

Agaricum in potionibus additum.

Hyssopum.

Salvia.

Senæ decoctum uel dilutum.

Scabiosa in puluerem trita, tum eius
succus cum melle delinctus, aut her-
bæ decoctum pluribus diebus haustū.

DIOSCORIDIS.

Ad pectoris destillationes.

Trionis semen cum melle delinctum.

Matth.

Pectoris, & pulmonis. 143
MATTHIOLI.

Agaricum.

Veronica mas.

Salvia.

Armenia terra ex rhodofaccharo de-
lincta.

DIOSCORIDIS.

Ad omnia pectoris incommoda.

Porrum cum melle decoctum comestū.

Glycyrrhizæ succus bibitus.

Thymus melli mistus indelinctu sum-
ptus.

Thymbra eodem modo parata.

Tordilii radix in eclegmate cum melle
sumpta.

Libanotis radices pote.

Symphitum petreum! in mulso decoctū
bibitum.

Quinquefolii radice succus potus.

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum potum.

Iridis radices conditæ, esitatae.

Terebinthina resina deuorata.

Veronica mas.

Glycyrrhiza.

Vae passæ quomodolibet usurpatæ.

Matth.

Pectoris, & pulmonis.

MATTHIOLI.

Ad empiematicos.

Pulmonaria; & eius succus ex melle deuorata.

Scabiosæ puluis; succus atque etiam decoctum potum.

MATTHIOLI.

Ad pectoris vulnera.

Caryophyllata

Potentilla

Alchimilla

Bistortæ

Tormentillæ] radices

Solidagines omnes

Sanicula

Auricula urfi

Pilosella

Amaranti purpureus flos potus.

Pirola in potionibus addita, potionem eius vulnerariam admirabilis operationis reperies lib.4. cap.16. comment. de Limonio.

Vux passæ deuoratæ.

CORDIS.

Cordis.

DIOSCORIDIS.

Ad deliquium animi.

Cucumis olfactus.

Pulegium ex aceto naribus admotum:

Buglossum potum.

MATTHIOLI.

Nardi Italicæ, aut lauendulæ aqua pota
& arteriis illita.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Santalum omne potum, & olfactum.

Moschus potus, & illitus.

Confectio è moscho deuorata.

Libetum illitum.

Ambarum potum, & impositum, aut
olfactum.

Cicum ex aceto naribus admotum.

Corzonere radix aut eius succus potus.

Caryophylli commansi, uel naribus
admoti.Caryophylli flores quocūq; modo sum
obedaria commansa. (pti.

Sesentha olfacta.

Melissophyllon, & eius stillatitia aqua.

Thyllitidis stillatitia aqua.

Caryophyllatæ radices olfactæ.

Gangelicæ radix pota.

Borraginis

Cordis.

Borraginis atq; etiam vulgaris buglossi decoctum potum, aut vino admistū & haustum.

Vinum odoratum, generosumq; in faciem proiectum, ac etiam potum.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment. de vino descripta, tā pota q̄ arteriis & naribus illita, & in faciem proiecta.

DIOSCORIDIS.

Ad cardiacam.

Intybus per se, & cum polenta illita.

Absinthium in passō decoctum & appo

Rubi folia illita. (sitū.

MATTHIOLI.

Nardi Italicę aut lauendulę stillatitia aqua pota.

Cinnamomi stillatitia aqua hausta.

Santalum omne potum, & epithemati-
bus additum.

Moschus potus, & illitus.

Ambarum potum.

Agallochum.

Mumia ex aqua menthæ pota granorū
quatuor pondere.

Rosarum succus, & dilutum potum.

Caryophyllata olfacta.

Vinum in quo gagates lapis ignitus ex-
tinctus fuerit ebibitum.

Cardiaca

Cardiaca herba pota.

Angelica radix hausta.

Borrago aut uulgare buglossum quouis modo sumptum.

Rhodofaccharum deuoratum.

Myrti bacce quoquo modo haustæ.

Aurantii, limonumq; florum stillatitia aqua epota.

Citria mala.

Aurantia mala.

Limonia mala.

Poma Adami.

Pyra cocta deuorata.

Sericum in antidotis additum.

Margaritæ potæ.

Ceruini cordis os epotum

Scorzoneræ radix, aut succus ebibitus.

Caryophylli in cibis vsurpati.

Caryophyllorum flores ex melisophylli decocto poti.

Zedoaria commansa, aut in potionibus addita.

Eryngii radix ex buglossi, melisophylli decocto pota.

Saccharum è roris marini floribus paratum.

Vincetoxici radix cum citrei mali semine & buglossi aqua hausta.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Trifolium acetosum.

Melisophyllon quocunque modo haustum.

N

Mat-

Cordis.

MATTHIOLI.

Ad tremorem cordis.

Galanga è succo plantaginis pota.

Cinnamomi aqua stillatitia.

Myrti baccę quoquo modo sumptę aut
deuorata. (tus.

Scorzonerę radix, aut eius succus po-

Vincetoxici radix cum citrei mali se-
mine ex aqua oxalidis pota.

Melissophyllum.

Phylitidis stillatitia aqua.

Caryophyllata olfacta.

Quinta essentia nostra lib. ʒ. comment.
de vino descripta vncię pōdere pota.

Aurum haustum.

Corallium ebibitum.

Margaritę deuorata.

MATTHIOLI.

Ad pulsus cordis.

Scorzonerę radix aut eius succus pot.

Vincetoxici radix cum citrei mali semi-
ne ex buglossi aqua hausta.

Melissophyllum.

Phylitidis stillatitia aqua.

Quinta essentia nostra lib. ʒ. comment.
de vino descripta vncię pōdere pota.

Aurum haustum.

Corallium

Corallium in potu sumptum.
Margaritæ in potionibus additæ.

MATTHIOLI.

Ad cordis dolorem.

Viridis pinus aciculæ contrite, & ex vi
no meraco potæ.

Scorzonere radix, aut eius succus pot⁹.

Melissophyllum.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Quinta essentia nostra descripta lib. 5.
comment. de vino hausta.

Aurum tritum & ebullitum cum coral-
lio & margaritis.

DIOSCORIDIS.

Ad præcordiorum duritiem.

Rhaponticum potum.

Vinum absinthites potum.

MATTHIOLI.

Ad uetustas præcordiorum in-
flammationes.

Scordium cum cera coactum imposi-
tum.

N 2 MAM

Mammarium.

DIOSCORIDIS.

Ad mammarum inflammationes

Thus cum cimolia, & rosaceo inunctum
Cydonia mala cataplasmatibus adiecta &
apposita.

Nuces iuglandes cum ruta, & exiguo mel-
le impositæ.

Fabarum lomentum per se, & cum polen-
ta illitum.

Asphodeli radices & folia ex vino exhi-
bita.

Irionis semen illitum.

Hemerocallis radix emplastri modo im-
posita.

Althæa decocta, & superposita.

Vuarum uinanei cum sale illiti.

Ostracites lapis cum melle impositus.

Geodes lapis cum aqua illitus.

Terra samia ex rosaceo, & aqua imposita.

MATTHIOLI.

Hyoscyaminum oleum illitum.

Ouum gallinaceum crudum ex rosaceo
impositum.

Oryzæ farina decocta, & emplastri mo-
do adhibita.

Portulaca contusa, & illita.

Trifo-

Mammarum. 147

Trifolium acetosum impositum.

Lenticulæ palustris aqua tum pota tum
illita.

Oleum è fructu momordicæ illitum.

Vnguentum ex oleo in mortario plum-
beo, & pistillo paratum.

DIOSCORIDIS.

Ad rigentes à partu mammas.

Triticæi surfureis, ex rutæ decocto elixi
& appositi.

Baccharis folia emplastri modo adhi-
bita.

Epimedii folia concisa ex oleo cataplas-
matis addita.

Hyoscyami semen tritum ex vino illitū.

Ricini folia imposita.

Vuarum vinacei cum sale illiti.

MATTHIOLI.

Canceri crudi triti, & illiti.

Marrubium cum vetere axungia tritum
& illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad induratas mammas.

Erui farina emplastri modo imposita.

Chamæpytis prima ex melle illita.

Vuarum vinacei cum sale triti, impositi.

N 3 Diosco-

Mammarum.

DIOSCORIDIS.

Ad mammas exulceratas.

Conchule Indicę cinis illitus.

Asclepiadis herbę radices impositę.

MATTHIOLI.

Aparinę farina inspersa.

Vnguentum ex oleo cum mortario, &
pistillo plumbeo paratum.

MATTHIOLI.

Ad papillarum rimas.

Oleum è luteis ouorum illitum.

Pomata illita.

Aparinę succus illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad lac in mammis concretum.

Cerę grumi decem granorū milli ma-
gnitudine sumpti.

Fabarum lomentum per se, & cum po-
lenta impositum.

Lentium farina illita.

Apium, & eius succus illitus.

MATTHIOLI.

Mentha recens mammis illita.

Diosc.

Mammarum. 148

DIOSCORIDIS.

Ad extinguendum lac.
Cicuta mammis imposita.

MATTHIOLI.

Cucurbitæ recentia folia imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad lactis ubertatem præstādam.

Halimi folia in cibis sumpta.

Viticis semen potum.

Ptisana hordeacea cum fœniculi semi-
ne cocta, & in cibum sumpta.

Malux decoctum potum.

Sonchi succus haustus.

Lactuca in cibis recepta.

Ocimum deuoratum.

Eruca comesta.

Anemone, & eius caules cum ptisana
hordeacea deuorati.

Anisum potum.

Anethi aridi seminis, & comæ deco-
ctum potum.

Fœniculum in cibo sumptum.

Nigella pluribus diebus pota.

Circeæ semen in sorbitionibus potum.

Clematis prima in cibis accepta.

Echii radix in sorbitione, uel cum vino
hausta.

Glaux cū hordeacea farina, sale, & oleo
cocta, & deuorata in sorbitione.

N 4 Polygala

Mammarum.

Polygala pota.

Bryoniae succus cum tritico coctus in cibū sumptus, sed hic prudētia opus est.

MATTHIOLI.

Vngularum asini, aut vaccarum cinis potus ex ptisana.

Cicerum decoctum potum.

Brassica cocta, & longo pipere aspersa una cum iure deuorata.

Cardui benedicti radicis puluis addito fœniculi semine, & longi piperis momento ex ptisana haustus.

CrySTALLUM in tenuissimum puluerem tritum potum.

DIOSCORIDIS.

Ne lac in mammis concreseat.

Mentha cum polenta imposita.

Vini fex cum aceto peruncta.

MATTHIOLI.

Fabarum farina illita.

DIOSCORIDIS.

Ad mammas cohibendas ne nimis crescant.

Cicuta contrita, & imposita.

Cores naxia illita.

Matth-

MATTHIOLI.

Aqua è nucibus pineis immaturis destil-
lata, & cum linteolis imposita.

Alchimillæ, seu stellarię stillatitia aqua
aut succus, aut decoctum cum linteo-
lis adhibita admistis hypocistide, e-
quiseto, rosis, & alumine.

Ventriculi.

DIOSCORIDIS.

Ad vomitiones & nauseam.

Cotoneorum malorum maceratorum
liquor haustus.

Nardus { Indica } ex aqua pota.
 { Celtica }

Palmulæ in cibo sumptæ.

Palmularum inuoluerum cataplasmatibus
conferentibus adiectum.

Gallinaceorum vetriculi interior folli-
culus siccus tritusq; cum uino potus.

Succinum haustum.

Faba in posca decocta, & in cibum sum-
pta.

Lentis xx. grana sine cortice deuorata.

Phaselus in cibo acceptus.

Sisymbrium haustum.

Rubi folia exterius illita.

N

5

Lactu-

Ventriculi.

Lactuca illota deuorata.
Lens syluestris esui data.
Scilla sicca pota.
Agaricus trium drachmarum pondere
per se absque liquore sumptus.
Gentianæ radice succus cū aqua potus.
Albæ spinę radix hausta.
Menthę duo, tresue rami cum acidæ pu-
nicę succo poti.
Pęonię semen ex vino nigro potum.
Betonica cōmanducata moxque vino
aqua mixto superbibito.
Vitis viniferę foliorum capreolorumq;
succus potus.
Myrtites vinum potum.
Vini fęx illita.
Scillinum vinum haustum.

MATTHIOLI.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Musci arborei dilutum ex vino paratū
ebibitum.
Pseuoberberi baccæ.
Ribes vulgaris.
Vua spina. (rata.
Poma austera cineribus incocta deuo-
Cydoniorum pomorum vinum, oleum,
caro, confectio, Miua.
Eorundem succus in quo conferbuerint
corallium, rosarum semen, rhabar-
barum, hypocistis acacia.
Mespilorum

Ventriculi. 150

Mespilorum siccorū puluis, rosarum rubearum succo exceptus additis corallio, caryophyllis, & nune myristica.

Maluę semen ex rubro vino potum.

Caryophylli ex vino austero, aut malorum cydoniorum succo epoti.

Idem cum mastiche, rhoe, coralliis, & balauistiis uentriculo illiti.

Punicorum malorum vinum haustum.

Iaspis viridis lapis super os ventriculi gestatus.

Mētha sicca ē mali punici vino sumpta.

Menthæ gręcę succus tam potus quā illitus.

Rosmarinum in puluerem contritum cum pane deuoratum, aut meraco potum.

Lagopi folia, paniculę, ac semen ex vino austero, aut punici mali epota.

Sanguisorba, siue forbastrella hausta.

Pulmonaria altera.

DIOSCORIDIS.

Ad celiacos.

Lycium potum, & inditum.

Cotonea mala cruda comesta.

Mora immatura siccata, tusaq; obsoniis aspersa.

Ficulnei cineris lixiuium pondere cyathi exhibitum.

N 6

Myrica

Ventriculi.

Myrica in potu data.

Gallæ cum aqua, aut vino trita, & illita.

Rhois semen obsoniis inspersum.

Myrti folia trita, & ex aqua illita.

Oleæ sylvestris folia cum polenta illita.

Coagulum leporinum, & equinum triū obolorum pondere ex vino epotum.

Faba in posca decocta, & deuorata.

Aegyptiæ fabæ farina, & corticis ipsius decoctum, ex mulso datum.

Oxilapathi, aut oxalidis semen in aqua aut vino potum.

Plantago elixa in aceto, & cum sale sumpta.

Hyacinthi semen potum.

Coronopus.

Rhaponticum ebibitum.

Spinæ albæ radix epota.

Ferulæ viridis medulla bibita.

Lasertii liquor in uic acino sumptus.

Nymphææ radix siccata, & in vino hausta.

Clymeni succus potus.

Limonii semen herbæ acetabuli pondere ex uino sumptum.

Tragi herbæ acini decem ex vino poti.

Papauerum vasculorum decoctum ex melle in eclegmate redactum in delinctu; Si uero efficacius reddere uelis adiungito hypocistidis, & acaciæ succum.

Vua-

Ventriculi.

151

Vuarum vinaceorum decoctum potum.

Vinaceorum nuclei in farina polentæ modo inspersi.

Aqua vel uinum in quo ferrum extinctum fuerit potum.

Morochthus lapis potus.

Vinum myrtites epotum.

Adiantum ex uino ebibitum.

Trichomanes ex uino hausta.

MATTHIOLI.

Galanga ex succo plantaginis sumpta.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Musci arborei dilutum in uino austero paratum haustum.

Thus tam potum quàm illitum.

Mali punicæ e floribus paratum saccharum ex uino austeriusculo potum.

Myrteum condimentum.

Cydoniorum uinum, miua, & oleum.

Cydoniorum confectio.

Mespila.

Sorba.

Pyra syluestria.

Pruna syluestria.

Nux myristica.

Mora immatura.

Cochleæ duæ vnà cum testis tritæ & ovis gallinaceis totidem exceptæ ex uino passo, & aqua prius calefactæ potæ.

Angui-

Ventriculi.

Anguium senecta rosaceo incocta, & imposita.

Oryxa prius torrefacta, & in lacte in quo calculi fuerint extincti decocta in cibum sumpta.

Sonchi decoctum ex vino potum.

Caryophylli ex vino aut malorum cydoniorum succo hausti.

Mentha sicca cū amylo, & aqua pota.

Anethum tostum cum mentha exhibitum.

Coriandri semen ex aqua.

Rosmarini pulvis cum pane deuoratus, aut ex mero haustus.

Amaranthi purpurei flos potus.

Malorum, puniceorum vinum epotum.

DIOSCÒRIDIS.

Ad vomitiones ciendas.

Lauri folia pota.

Cochleæ vepribus inhærêtes deuoratæ.

Peponis radix sicca drachmę pondere ex hydromelite pota.

Bulbus uomitorius deuoratus.

Origanum cum rhois semine, & cepis in cupreo vase diebus quadraginta, dum caniculæ sydus flagrat insolatū epotum.

Lemnia terra insumpta.

Diosc.

Ventriculi.
DIOSCORIDIS.

152

Ad ventriculi dolores.

Iuncus odoratus potus.

Bulbi comesti.

Rhaponticum ebibitum.

Absinthium in passo decoctum epotū.

Melilotum ex vino decoctum haustum.

Artemisię tenuia folia ex oleo contusa
emplastri modo imposita.

Nymphę radix illita.

Senecionis caulis in passo decoctus de-
uoratus uel potus.

Alabastrites lapis cū cerato impositus.

MATTHIOLI.

Cassię solutię pulpa insumpta.

Ricinum oleū illitum, potū, & infusum.

Amygdalinum oleum potum.

Laurinum oleum illitum.

Mastiches grumi tres deuorati ab eun-
tibus cubitum.

Myristicę nucis decoctum ex rhodomel-
le, & aqua uitę potum.

Sysimbrium calefactum, & vino cretico
aspersum impositum.

Aloe deuorata, aut pota.

Quinta essentia nostra lib. ʒ. comment.
de vino descripta pota, ubi à frigidi-
tate prouenit dolor.

Diosc,

Ventriculi.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi erosiones.

Nardus { Indica } ex aqua pota.
 { Celtica }

Iuncus odoratus potus.

Sycomori succus potus.

Pineę nuces deuoratę

Lac humanum potum.

Sonchi succus bibitus

Pulegium cum posca sumptus.

Hieracii vtriusque succus haustus.

Scordium duarum drachmarum ponde
re cum mulla epotum.

Pœonię semen ex uino nigro potum.

MATTHIOLI.

Amygdalarum dulcium potum oleum.

Sesaminum oleum potum.

Pinei nucleii melle, aut saccharo exce-
pti, & cum succo portulacę hausti.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi ardores.

Portulaca cum polenta illita.

Sonchus emplastri modo impositus.

Vmbilici veneris succus illitus.

Intybus vtraque ex aceto deuorata.

Glycyrrhizę succus potus.

Api-

Fœniculum cum frigida aqua potum.

Polygonum illitum.

Solani hortulani folia apposita.

Chamædaphnes folia hausta.

Vitis viniferæ folia, & capreoli empla-
stri modo adhibita.

Labruscæ flos illitus.

MATTHIOLI.

Cassia solutiue pulpa insumpta.

Santala pota, uel aqua rosacea foris il-
lita.

Vux spinæ.

Crespini

Ribis vulgaris

} baccæ deuorata.

Rhodofaccharum assumptum.

Quercus recentia folia in ore contenta

Citria

Aurantia

Limonia

} mala esitata.

Melopeponum seminum lacteus cre-
mor haustus.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Phyllitidis puluis sua ipsius aqua exce-
ptus, & illitus.

Trifolium acetosum deuoratum.

Consolidæ Regalis flores epoti.

Fragæ deuorate.

Lenticulæ palustris stillatitia aqua po-
ta.

Dio-

Ventriculi.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi flatus.

Mei radices ex aqua feruefactæ, uel ci-
tra coctionem tritæ potæ.

Nardi Indicæ & celticæ ex aqua potæ.

Castoreum haustum.

Gallinaceorum senescentium ius potū.

Absinthium cum seseli, aut Gallica nar-
do potum.

Ligustici semen, & radix pota.

Smyrni semē haustum.

MATTHIOLI.

Cubebæ deuorata.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Calamus odoratus vulgaris haustus.

Oleum ricinum illitum, potum, & in-
fufum.

Balsami factitii aqua cum carniū iu-
re sumpta.

Cnicinum oleum potum.

Laurinum oleum illitum.

Mumia ex cumini, amni, & cari decocto
sumpta.

Oleum nostrum de scorpionibus illitū.

Castoreum ex oxycrato potum.

Milium torrefactum, cum sale mistum &
anthenide in sacculo impositum.

Mentha tam illita quam pota.

Menthastrum.

Mentha

Mentha græca.

Salvia.

Urtica.

Imperatoria.

Sanacetum.

Quinta essentia nostra lib. 5. cap. de vino descripta, epota.

DIOSCORIDIS.

Ad singultum.

Sysimbrii semen in vino potum.

Rhaponticum haustum.

Aristolochia rotunda ebibita.

Menthę duo, tresue rami cum acidę punice succo poti.

Anethi comę & seminis decoctū haustū.

Cuminum erraticum cū aceto potum.

Alysson potum, siue manibus gestatum vel naribus infusum.

Aspleni decoctum epotum.

Peryclimeni semen bibitum.

Saxifraga hausta.

MATTHIOLI.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Mumia hausta ex cumini, aut apii decocto.

Castoreum cum mulsā potum.

Rhabarbarum ex vino haustum.

Anethum cum haustum, tum olfactum.

Phylli-

Ventriculi.

Phyllitidis stillatitia aqua epota.

Quinta essentia nostra lib. 5. cap. de uino descripta vnciae pondere hausta ubi ex repletionem fuerit singultus.

DIOSCORIDIS.

Ad acidis ructus.

Agaricus drachmae pondere potus.

Tragoriganum potum.

Betonice folia fabae pondere ex despumato melle sumpta.

MATTHIOLI.

Coriandrum cochleari mensura exhibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinem, & lac in ventriculo concreta.

Ficulnei cineris lixiuium epotum.

Coagulum.	{	Equinum.	{	trium obolorum pondere ex vino potum.
		Leporinum.		
		Agninum.		
		Aedinum.		
		Hinnulinum.		
		Vitulinum.		
		Bubalinum.		

Helichrysi coma cum mulso hausta.

Lafer epotum.

Matth.

MATTHIOLI.

byclamini radicis stillatitia aqua senis
 unciis pota cum sacchari vncia vna.
 consolida mediae succus epotus.
 uricula vrsi.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi inflammationes.

hieracium maius, & minus emplastri
 modo impositum.

vitis viniferae folia, & capreoli cum po-
 lenta impositi.

olla purpurea ex polenta illita.

MATTHIOLI.

assiae solutiuae pulpa assumpta.

antala omnia tam sumpta quam illita.

osae illite.

consolida Regalis flores illiti.

antis palustris stillatitia aqua pota.

MATTHIOLI.

Ad famem caninam.

virium pinguium caro assa deuorata.

Diosco-

Ventriculi.
DIOSCORIDIS.

Ad appetentiam ciendam.

Piper comestum.
Acetum in obsoniis additum.
Absinthium potum.

MATTHIOLI.

Crespini baccæ.
Vua spina.
Ribes vulgaris.
Sinapis sumum.

DIOSCORIDIS.

Ad concoctionem iuuandam.

Eruca in cibo comesta.
Piper omne comestum.
Gingiberis vsus.
Scilla cum melle cocta, & deuorata.
Absinthium haustum, uel uetriculo ad-
hibitum.
Tragoriganum epotum.
Pulegium sumptum.
Ligustici semen & radix bibita.
Seselis Massiliensis semen cū vino hau-
Garum potum. (stum.
Betonice folia post cenā sumpta, addi-
to melle despumato fabæ magnitudi-
Vinum absinthite. (ne.
Matth.

Ventriculi.

156

MATTHIOLI.

Acori radice, & cinnamomi drachma
ex vino absinthite.

Galanga.

Nardus Italica.

Lauendula.

Cubebæ.

Cinnamomi stillatitia aqua hausta.

Caryophylli hausti.

Crocum.

Ladanum drachmæ pondere duabus ho-
ris à cœna deuoratum.

Pyrum uel cydonium cineribus tosta,
& deuorata.

Pistacia.

Citria condita.

Guglandes condite.

Nux myristica.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi fluxiones.

Adiantum cum vino haustum.

Perfici mali sicci decoctum, & ebibitum.

Cotonei mali macerati liquor potus.

MATTHIOLI.

Myrteum condimentum.

Matth.

Ventriculi.

MATTHIOLI.

Ad restringendam sitim.

Crespini bacca.

Vua spina.

Ribes vulgaris.

Citria

Limonia

Aurantia

Pyra.

} mala.

Portulacæ folia lingue subdita.

Melopeponum seminum lacteus cremor.

Anguriæ pulpa.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Trifolium acetosum.

Fraga matura deuorata.

Punicorum malorum vinum ex intybi stillatitia aqua, aut hordei decocto ebibitum.

Iecinoris.

DIOSCORIDIS.

Ad iecinoris obstructions.

Nardus } Indica } ex aqua frigida haui
 } Celtica } sta.

Lauri

Lauri cortex tribus obolis in vino odorato potus.

Piceæ folia drachmæ pondere in aqua aut mulla pota.

Amygdalæ amaræ cum melle, & lacte in illinctu datæ nucis auellane magnitudine.

Gentianæ radicis succus cū aqua potus.

Agaricum epotum.

Rhaponticum exhaustum.

Eryngium ex uino insumptum.

Anthemidis decoctum potum.

Betonica in aceto mulso drachmæ pondere epota.

Eupatorii herba, aut semē in uino potū.

Papaueris corniculati radix bibita.

Rubrica sinopica hausta.

Glycyrrhizæ succus delinctus.

MATTHIOLI.

Nardus Italica, & lauendula in decoctis addita.

Asari decoctum.

Carpesium.

Cinnamomi aqua stillatitia epota.

Cassia solutiua assumpta.

Acorum quocunque modo sumptum.

Amygdalarum amararum oleū haustū.

Cnicinum oleum potum.

Rosarum succus, & dilutum.

Tamarindorum pulpa.

O

Amyg-

Iecinoris .

Amygdalæ.

Pistacia.

Cicer nigrum, & rubrum decoctum & potum.

Ciceris farina ex intybi stillatitia aqua decocta, & illita.

Lupini cocti, & cum ruta, & pipere deuorati.

Napi semen drachmę pondere ex marubii decocto frequenter potum.

Brassicæ decoctæ ius.

Beta cum sinapi, aut aceto deuorata.

Cichorium ex vino albo tenui potum.

Cyclamini succus duarum drachmarum pondere potus cum oxymelite.

Rhabarbarum quocunque modo potum.

Gentianæ stillatitia aqua pota

Centaurii magni radix tum pota, tum in vino macerata.

Centaurii minoris decoctum, & succus.

Cardui radicum decoctum haustum.

Eryngii radicum decoctum epotum.

Aloe quocunque modo sumpta.

Veronica mas.

Mentha gręca.

Amaracus.

Imperatorię radix.

Senę decoctum aut dilutum haustum.

Rosmarinum frequenter vsurpatum.

Marrubium

Eupatorii vulgaris decoctum aut succus epotus

Lupuli

Lupuli flores in potionibus sumpti.

Frangulæ corticum decoctum potum.
parandi rationem inuenies lib. 4.
cap. de Sambuco.

Cuscutæ decoctum potum.

Quinta essentia ferri descripta. lib. 5. in
commento de ferri scoria siue sterco
re drachmæ pondere quotidie pota.

DIOSCORIDIS.

Ad morbum Regium.

Nardus { Indica } hausta.
 { Celtica }

Ceruinum cornu vstum, ac lotum, po-
tumque.

Millepedæ siue Onisci ex vino poti.

Cicer cum roremarino decoctum co-
mestum.

Rumicis radices in vino decoctæ & bi-
bitæ

Atriplicis semen cū mulsæ aqua epotū.

Asparagi radicum decoctum cum ficis,
& ciceribus, haustum.

Crithmi, & eius radicum, seminumq;
decoctum ebibitum.

Irio cum melle in eclegmate pondere
trium obolorum sumpta.

Hyrundinariz radix cum aniso, & vino
hausta.

O 2 Sphon-

Iecinatoris.

Sphondilii semen epotum.
Agaricus drachmæ pondere sumptus.
Rhaponticum haustum.
Absinthii decoctum, dilutum ve trium
cyathorum pondere quotidie hau-
stum.
Aloe drachmæ pondere pota.
Origani decoctum corpori persusum.
Calamintha cum uino pota.
Fœniculum erraticum potum.
Libanotis radices potæ cum uino, & pi-
pere.
Rorismarini decoctum potum.
Nigella trita cum irino vnguento nari-
bus apposita.
Chelidonii radix cum aniso ex uino al-
bo ebibita.
Laser cum caricis exhibitum
Marrubii succus naribus infusus.
Polii vtriusque decoctum haustum.
Conyze folia, & flores epoti.
Aspleni decoctum potum.
Lichen ex melle inunctus.
Adianti decoctum epotum.
Trichomanes decoctum haustum.
Anthemidis decoctum ebibitum.
Bupthalmum epotum statim a balneo.
Pœoniæ radix hausta.
Hyacinthi semen cum vino potum.
Rubiæ radix cum mulla aqua bibita.
Chamæpityos folia septem diebus in vi-
no pota.

Beto-

Betonice folia cum dulci aqua pota.
Elaterium epotum.
Anchuse radice decoctum haustum.
Quinquefolii succus cum trium cyathorum pondere aliquot diebus potus.
Osyris decoctum epotum.
Chrysanthemi decoctum balnei more adhibitum.
Vinum scillinum potum.
Verbenace supine folia drachmæ pondere cum thuris obolis tribus & uini ueteris hemina una ieiuno quadraginta diebus pota.
Lycii herba in aceto decocta & bibita.
Myrice decoctum potum.
Halycacabi fructus hausti.
Chamaecissi folia trium obolorum pondere senis diebus in aqua pota.
Rusci folia, & bacce in vino ebibita.
Ceraui cornu cinis potus binis ligulis.
Sulphur sorbili ouo haustum.

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum epotum.
Nardi Italice Lauenduleuè decoctum additis cinnamomo, asparagi, & feniculi radicibus.
Asari dilutum ex vino paratum.
Asarnia aut eius decoctum.
Cassie solutiue pulpa.
Rosarum succus, & dilutum.

O 3

Tama-

Iecinoris.

Tamarindorum pulpa.

Castoris anteriores dentes in poculo
contenti, e quo vinū biberit affectus.

Terrenorum vermiū cinis ex absinthii
decocto potus.

Bubuli fellis lapis & vino haustus.

Napi semen ex marrubii decocto potū.

Oxylapati ex vino decoctum bibitum.

Cicorii radices saccharo conditæ.

Melopeponū seminum lacteus cremor
haustus.

Erucae sylvestris tria folia leua manu
decerpta illicoq; deuorata.

Cyclamini succus cum saccharo hau-
stus addita mastiche, aut myristica
nuce, aut rhabarbari scrupulo.

Asphodeli radix ex vino sumpta.

Chelidonium maius in calceis subnu-
dis pedibus gestatum.

Aquilegiæ semen ex cretico vino, &
croci momento epotum.

Rhabbarum in potionibus additum.

Agaricum in potionibus adiunctum.

Centaury magni radix quoquo modo
vsurpata.

Centaureum minus.

Carduorum radicum decoctum.

Eryngii radicum decoctum.

Aloe quouis modo vsurpata.

Pulegii

Menthastri } decoctum haustum.

Marrubii }

Cumi-

Cuminum illico a balneo exhibitum.

Senæ decoctum, vel dilutum.

Radicum vincetoxici decoctum in potu propinatum.

Chamedryos semen drachmæ pondere ex meraco.

Eupatorii vulgaris decoctum potum.

Lupulorum florum decoctum ex vino albo haustum.

Frangulæ corticum decoctum, Parandi rationem habes lib. 4. commento de sambuco, & ebulo.

Cuscutæ decoctum epotum.

MATTHIOLI.

Ad hepaticum fluxum.

Quernorum foliorum tenellorum stil-
latitia aqua pota.

Lupinum iecur siccum in puluerem sum-
ptum.

Rhabarbarum tritum & propinatum.

DIOSCORIDIS.

Ad iecinoris dolores.

Acori decoctum potum.

Absinthii decoctum ex passo appositum.

Peryclimeni semen potum cum vino.

Iecinoris.

MATTHIOLI.

Irinum oleū ē floribus paratū illitum.
Amygdalinum oleum.
Laurinum oleum.
Eupatorii vulgaris decoctum aut eius
succus, epotus.

DIOSCORIDIS.

Ad Iecinoris duritiem.
Ammoniacum illitum, & ebibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad refrigeratum iecur.

Nardus } Indica } ebibita.
 } Celtica }
Amomi decoctum potum.
Pinorū & piceæ folia ex aqua, uel mul-
so epota.

MATTHIOLI.

Acori oxymel potum.
Cinnamomi aqua stillatitia hausta.
Acorum quocunque modo sumptum.
Balsamum factitium cum potum, tum
illitum.
Caryophylli in potu aut in cibo sūpti.
Rha-

Iecinoris. 161

Rhabarbarum tritum, & cum uuis pas-
sis deuoratum.

Mentha græca.

Imperatoriae radix.

Eupatorii vulgaris succus, aut eius deco-
ctum epotum.

MATTHIOLI.

Ad Iecinoris scyrrhum.

Asarum.

Amygdalinum oleum.

Sesaminum oleum.

Mastiche cū imposita, tū intus sumpta.

Centaurii minoris decoctum haustum.

Frangulae radicum decoctū potum, Pa-
randi modū inuenies lib. 4. commen-
to de sambuco.

Scillinum acetum epotum.

MATTHIOLI.

Ad cachesium. i. malum habi-
tum.

Cinnamomi aqua stillatitia pota.

Acorus quem calamum odoratum uul-
go uocat sumptum.

Balsami factitii liquores omnes.

Nux myristica intro sumpta.

O 5 Iecur

Iecinoris.

Iecur leporinum arefactum, & potioni
infriſtum.

Sium in cibis ſumptum.

Cichorium quoquomodo acceptum.

Rhabarbarum quauis ratione hauſtum,
& cum paſſis vuis comeſtum.

Agaricum.

Absinthii pontici comæ ſaccharo aſſer
uatæ, & deuorata. parandi rationem
habes commentario de abſinthio.

Pulegii decoctum potum.

Mentha græca.

Imperatoria radix.

Sagapenum exhibitum flauis myrobala
nis duplicato pondere additis.

Marrubii decoctum epotum.

Eupatorii vulgaris ſuccus, aut decoctū
hauſtum.

Frangulæ radicum decoctum hauſtum,
parandi rationem habes lib. 4. com
ment. de ſambuco.

DIOSCORIDIS.

Ad hydropem.

Aſarum epotum.

Cinnamomum ebibitum.

Calami odorati decoctum cum ſemine
apii epotum.

Erinacei terreſtris caro.

Cochlearum terreſtrium operimentū,
& caro

& caro simul contrita tumoribus hydropicorum imposita.

Amurca in villosa pelle peruncta, & imposita.

Vrina humana sui ipsius rebibita.

Vrina capre quotidie cum spica pota.

Cicer cum roremarino decoctum epotum.

Raphanus emplastri modo impositus.

Plantago cum lenticula decocta.

Ebuli radix in uino decocta epota.

Allium decoctum deuoratum.

Bulbi cum melle, & trito pipere emplastri modo impositi

Scilla preparata sumpta.

Anagallidis succus vino potus.

Chameleonis albæ radix cū vino pota.

Absinthium bibitum cum ficibus, nitro & loliacea farina.

Adianti decoctum haustum.

Trichomanes decoctum ebibitum.

Hyssopum cum fico, nitroq; emplastri modo impositum.

Fidiculæ decoctum potum.

Origanum cum fico decoctum haustum.

Sampsuchi decoctum ebibitum.

Ruta cum fico emplastrata, & eius decoctum ex uino tum potum, tum corpori perfusum.

Pastinacæ erraticæ semen epotum.

Anisum potum.

Smyrniæ semen haustum.

O 6 Laser-

Iecinatoris.

Lasertitii liquor cum caricis datus.
Chamædryi decoctum epotum.
Polii utriusque decoctum bibitum.
Androsaces in uino pota duarū drach-
marum pondere.
Betonice folia cum aqua dulci epota.
Cucumeris asinini radices succus ses-
quioboli pondere, & cortex eius ace-
tabuli quarta parte.
Aquæ marinæ balneum.
Vitis sylvestris radix in aqua feruefa-
cta, & in vini cyathis duobus marina
aqua diluti epota.
Vinum scillinum ebibitum.
Viticis semen epotum.
Ficus sicce in uino cum polenta, & ab-
sinthio decoctæ, & illitæ.
Sal.
Alcyonium tertium.
Arena è litoribus sole feruefacta capi-
te tenuis hydropici obruta.

MATTHIOLI.

Electuarium de succo iridis in cap. pro-
prio de iride.
Iridis radices condite.
Ciperi radicum, & baccarum lauri pul-
uis pari pondere ex impubis pueri u-
rina exceptis, & nentri adhibitis.
Asari dilutum ex uino paratū potum.
Asarina, & eius decoctum.

Cinna-

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Balsami factitii liquores omnes.

Cnicinum oleum potum

Lixiuum ex vino albo, & iuniperino cinere epotum.

Fraxini semen cum vino assumptum.

Ossicula acinorum sylvestris mali puniei trita & epota.

Humani stercoreis stillatitia aqua pota.

Bubulum caprillumve sterqus emplastri modo impositum.

Napi semen drachmæ pondere ex marubii decocto in dieb⁹ pluribus potū.

Brassicæ marinæ decoctum potum, & præsertim addita rhabarbaro.

Bassicæ marinæ puluis additis rhabarbaro, & cubebis pluries ex vino pot⁹.

Sinapis ex impubis pueri vrina illitus.

Caryophylli in cibo uel portione usurpati.

Cyclamini succus cum saccharo potus addita mastiche, aut myristica nuce, aut rhabarbari scrupulo.

Asphodeli radix ex vino pota.

Rhabarbarum frequenter usurpatum.

Agaricum in portionibus additum.

Gentiana.

Centaurii magni radix tum vino macerata, tum pota.

Cardui radicum decoctum

Cardui benedicti decoctū

Eryngii radicum decoctum

} haustum.

Zucca-

Iecinoris.

Zuccharum ex pontici absinthii coma
paratum. modum parandi habes cō-
mento de absinthio.

Pulegii decoctum ebibitum.

Mentha græca.

Imperatoria radix.

Sagapenum cum duplicato pōdere my-
robalanorum flauorum potum.

Euphorbium haustum.

Vincetoxici radicem ex uino albo de-
coctum bibitum.

Marrubii decoctum epotum.

Eupatorii uulgaris decoctum haustum.

Ricini semen ex caprino lacte macera-
tum, & haustum.

Sambuci, aut ebuli radicem stillatitia
aqua pota, hæc binis, illa quaternis
unciis simul mista, & diebus xxx. po-
ta.

Frangulæ corticem decoctum potum,
parandi rationem inuenies lib. 4. cō-
ment. de sambuco.

Colocynthis cum pota, tum clysmate
infusa.

Stibium nostrum granorum quatuor
pondere haustum.

Lienis

Lienis.

MATTHIOLI.

Ad inflammationem.

Cassiæ solutię pulpa deuorata.
 Caphura illita.
 Crespini baccarum succus potus.
 Rosę, & earum succus, seu dilutum.
 Cichorii radices conditę.
 Cichorii flores saccharo asseruati, & sepe deuorati.
 Melopeponum seminum lacteus cremor potus.
 Phyllithidis farina sua ipsius aqua subacta, & illita.
 Trifolium acetosum deuoratum.
 Consolidę regalis flores ebibiti.
 Fragarię, & radicum decoctum epotum

DIOSCORIDIS.

Ad induratos lienes.

Cotonea mala cruda cataplasmatibus addita, & imposita.
 Sycomori liquor haustus, & illitus.
 Raphanus emplastri modo impositus.
 Brassicę folia cum aceto deuorata.
 Chamędrys decoctum potum.

Lupi-

401 **Lienis.**
Lupinorum farina illita.

MATTHIOLI.

Helenii radice farina denarii pondere
diebus aliquot ex uino epota.

Amygdalinum oleum.

Terebinthina deuorata.

Sesaminum oleum.

Myrica ex uino decocta.

Cochlearum maiorum cinis cum lini
& urticæ semine & melle potus.

Stercus caprillum illitum.

Dracunculi radix contusa, & illita.

Cyclamini succus vnguentis additus.

Centaurii minoris decoctum, & succus
tam interius, q̃ exterius usurpatus.

Mentha græca ex oleo irino illita.

Oleum liliorum alborum inunctum.

Phyllitis quo cunque modo sumpta.

Oxymel ex floribus geniste paratum.

Saccharum è geniste floribus paratum
frequenter infusum.

Frangulæ corticum decoctum potum.
parandi rationem habes lib. 4. com-
ment. de sambuco.

Scillinum acetum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad lienis obstructions.

Nardus Celtica ex uino epota.

Adian.

Adiantum bibitum.

Trichomanes hausta.

MATTHIOLI.

Nardus Italica, Lauendulaq;.

Asari decoctum haustum.

Cubebæ.

Carpesium.

Helenii radice farina frequenter ex vino uetere sumpta.

Amygdalarum amararum oleum.

Cnicinum oleum.

Laurinum oleum.

Mumia ex cari decocto epota.

Tamarindorum pulpa.

Amygdalæ.

Ciceris rubri decoctum ebibitum.

Lupini cocti, & cum ruta, & pipere deuorati.

Brassicæ decoctum ius epotum.

Beta cum sinapi, aut aceto comesta.

Sium in cibis sumptum.

Cyclamini succus binis drachmis ex oxymellite sumptus.

Rhabarbarum potioni infriatum.

Agaricum in potionibus haustum.

Gentiana, & eius aqua stillatitia.

Cêtaurii minoris decoctum, & succus.

Eryngii radicum decoctum potum.

Veronica mas.

Mentha græca ex oleo irino illita.

Ama.

Lienis.

Amaracus.

Imperatoriae radix.

Senę decoctum, uel dilutum haustum.

Rosmarinum cum pane deuoratum.

Phyllitis quoquo modo sumpta.

Eupatorii uulgaris decoctum epotum.

Lupuli flores in potionibus additi.

Fragarię tum folia, tum radices.

Frangulę corticum decoctum epotum.

Parandi rationem habes lib. 4. comment. de sambuco.

Cuscuta, & eius decoctum.

Quinta essentia ferri descripta in 5. lib. cap. de scoria, seu stercore ferri diebus pluribus continuis drachmę pondere pota ex adianti, aut aspleni, aut myricę decocto.

DIOSCORIDIS.

Ad lienis inflammationes.

Iris illyrica ex aceto epota.

Acorum potum.

Nardus celtica ex vino hausta.

Nardus montana ex vino bibita.

Sarmentitius cinis ex aceto, rosaceo, & ruta illitus.

Myricę ex vino decoctum potum.

Viticis semen haustum.

Dio-

DIOSCORIDIS.

Ad lienis dolores.

Dictamnnum potum, & illitum.

MATTHIOLI.

Irinum oleum è floribus paratum, &
illitum.

Laurinum oleum inunctum.

Oleum liliorum alborum inunctum.

Phyllitis quouis modo sumpta.

MATTHIOLI.

Ad refrigeratos lienes.

Acori oxymel sumptum.

Cubebe.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Balsami factitii liquores omnes.

Amygdalarum amararum oleum cum
potu tum illitum.

Laurinum oleum.

Rhabarbarum intro sumptum.

Agaricum potum.

Mentha græca ex irino oleo inuncta.

Imperatoria radix deuorata.

Rosmarinum cum pane ingestum.

Phyllitis.

Dio-

Lienis.

DIOSCORIDIS.

Ad minuendos extuberantes
lienes.

Iris illyrica ex aceto epota.

Acorum epotum.

Nardus { Celtica } ex vino bibita.
 { Montana }

Myricę ex vino decoctum exhaustum.

Viticis semen ebibitum.

Cyclamini secundę semen quadragin-
ta diebus haustum.

Sagapenum epotum.

Ammoniacum drachmę pondere ex a-
ceto sumptum.

Chamedrys ex aceto pota.

Nasturtium haustum.

Piperis radix illita.

Polii utriusq; decoctum cum aceto potum.

Cyclamini succus inunctus.

Capparidis semen drachmarum duarum
pondere quadraginta diebus ex vi-
no bibitum.

Eiusdem radix ex vino bibita eodem
pondere.

Lepidium cum helenii radice impositum

Hederę tenella folia ex vino decocta.

uel arida ex pane cocta imposita.

Isatis sylvestris tum pota tum illita.

Agaricum drachmę pondere cum ace-
to mulso datum.

Rha-

Rhaponticum epotum.

Smyrniæ radix comesta.

Gentianæ radix duarum drachmarum
pondere hausta.

Aristolochia rotunda epota.

Crocodilii radice decoctum potum præ
sentaneo remedio prodest.

Hyssopum cum ficis, nitroq; illitum.

Trigoriganum cum aceto potum.

Pulegium cum sale illitum.

Sison epotum.

Pacedani succus haustus.

Viscum cum calce, gagateve lapide de-
coctum, & impositum.

Teuchrium cum posca potum, uel cum
ficis appositum.

Leucii radices cum aceto illitæ.

Nymphææ radix ex vino bibita.

Aspleni folia pota, uel eius decoctum
cum aceto quadraginta diebus hau-
stum, uel folia ipsa ex aceto illita.

Bunii semen epotum.

Hæmionitis cum aceto pota.

Rubiæ semen ex aceto mulso haustum.

Lonchitis alterius folia cum aceto epota.

Betonicæ folia ex oxymelite ebibita.

Polemonii radix ex aqua sumpta.

Periclymeni semen quadraginta die-
bus in uino haustum.

Xyridis semen ex aceto sumptum.

Anchusæ radix cum mulsâ aqua pota.

Urtica utraque cum cerato imposita.

Tricho-

Lienis.

Trichomanes epota.

Vini scillini vsus.

Glans vnguentaria cum erui farina pota ex malsa aqua.

Bryonia trium obolorum pondere triginta diebus ex aceto hausta, aut cū ficis illita.

Vitis nigræ viticulę primę recentes coctæ, ac comestę.

Filicis maris radix hausta.

Aqua vel vinum in quibus calybs, aut ferrum restinctum fuerit in potu.

Alcyonium tertium bibitum.

Corallium ex aqua bibitum.

Asius lapis ex aceto, & uiua calce illitus

Cotis naxię delimata à ferro scobes ex aceto ebibita.

MATTHIOLI.

Helenii radice farina è vino vetere frequenter denarii pondere pota.

Terebinthina, lariceaq; resina sepe deuorata.

Fraxini corticis decoctum epotum.

Myricę rami ex aceto illiti.

Nux myristica.

Eruum a ieiunis deuoratum.

Eruce semen potum.

Hederæ helice foliorum succus ex vino austero epotus.

Rhabarbarū quoquo modo sumptum.
Mentha

Intestinorum. 168

Mentha græca ex oleo irino illita.

Phyllitis quouis modo sumpta.

Eupatorii vulgaris decoctum epotum.

Lupuli flores in potionibus decocti.

Frangulæ corticum decoctum haustum,
parandi rationem habes lib. 4. com-
ment. de Sambuco.

Cuscuta, & eius decoctum.

Corallium frequenter epotum.

Intestinorum.

DIOSCORIDIS.

Ad colicos affectus.

Amygdalæ amaræ illinctu adhibitæ.

Cochlæ terrestres cum suo putamine
tusæ addita pauca myrrha ex vino
bibitæ.

Alauda avis tosta in cib. sumpta.

Suillus talus crematus ad albedinem
vsque potus vbi flatus excruciet.

Butyrum infusum, vbi colon exulceratū
fuerit.

Gallinæ fimum cum aceto vel vino hau-
stum.

Rutæ decoctum ex oleo infusum.

Petroselinum potum.

Colocynthis infusa clysmatibus.

Cnici decoctum infusum.

Matthioli

Intestinorum.

MATTHIOLI.

Galanga pota.

Cubebæ.

Cinnamomi stillatitia aqua.

Balsami factitii liquores omnes poti,
& illiti.

Oleum cum pari portione cretici vini
sumptum, aut clystere infusum.

Ricinū oleum potū illitum, & infusum.

Amygdalinum oleum utrunq;

Cnicinum oleum.

Laurinum oleum.

Succinum ex tepenti aqua epotum.

Perficorum nucleorum oleum tam po-
tum, quam infusum.

Amygdalinum oleum potum.

Nucum iuglandium oleum haustum.

Oleum è scorpionibus nostrū illitum.

Aqua in qua ceruinum genitale clotum
fuerit epota.

Ceruorum tenerrima cornua in taleo-
lis concisa, siccaq; & in puluerem tri-
ta, & cum pipere, & myrrha hausta.

Lupinum sinum quod terram non atti-
gerit ex uino albo, uel aqua potum,
& forinsecus ventri adalligatum.

Brassicæ semen crassiuscule contusum
& in carniū iure feruefactum, po-
tumq; vna cum ipso iure.

Ius decoctæ brassicæ cum vetere gallo
epotum.

Cycla-

Intestinorum. 169

Cyclamini succus trium drachmarum
pondere in clysteribus additus.

Imperatoria ex calido meraco epota.

Sagapenum bibitum aut clysteribus in-
ditum.

Verbasci flores in puluerē triti, & poti.

Trinitatis herba in puluerem trita, &
epota.

Ricini semen ex iure ueteris galli deco-
ctum, & haustum.

Colocynthis clysteribus infusa.

Momordicæ puluis haustus.

Quinta essentia nostra pota, & in cly-
steribus addita.

Stibium nostrum commentario pro-
prio descriptum sumptum quinque
granorum pondere.

Gagates lapis in puluerē tritus drach-
mæ pondere diebus septem epotus.

DIOSCORIDIS.

Ad Intestinorum dolores.

Iris Illyrica pota.

Acori decoctum ebibitum.

Mei radices tritæ cum melle in ecleg-
mate sumptæ.

Cardamomum ex aqua potum.

Agallocum ex aqua haustum.

Nuces iuglādes cum suo putamine per
vstæ & umbilico admotæ.

P Fi-

Intestinorum.

Ficuum cum ruta decoctum clysmate infusum.

Halimi folia drachmę pondere in aqua mulsa epota.

Crocum in potionibus bibitum.

Dauci semen epotum.

Libanotidis radices haustæ.

Ferulæ semen in potu sumptum.

Peucedani succus in ouo haustus.

Melissophylli decoctum clystere infusum.

Castoreum epotum.

Butyrum clysmatibus infusum.

Serpyllum ebibitum.

Calaminthæ decoctum haustum.

Eryngium ad potandum datum.

Cera in sorbitionibus data.

Ammi ex uino sumptum.

Triticei fursures ex decocto rutæ elixi, & illiti.

Milium calefactum in sacculis adhibitū.

Orobi farina aceto macerata imposita.

Sisymbrii semen in uino potum.

Piper cum lauri tenellis foliis haustum.

Scilla in eclegmate cum melle.

Rhaponticum epotum.

Sampsuchi decoctum ebibitum.

Centaurii maioris radix epota.

Ruta vnā cum ficcato anetho elixa in potu sumpta.

Panaces cum vino haustum.

Anethi comę, & seminis decoctū potū.
Ligu-

Intestinorum. 170

Ligustici semen, & radix pota.
Cumini decoctum cum oleo clystere in-
fusum.
Phalangii folia, flores, ac semen haustū.
Centunculum austero vino epotum.
Conyze folia, & flores poti.
Pæoniæ radix in vino pota.
Pseudo bunium ebibitum.
Aqua marina fotu adhibita.
Chamæpitys hausta.
Graminis decoctum ebibitum.
Chamædaphnes folia in potu data.
Sal calefactum in sacculis appositum.
Nitrum cum cumino ex hydromelite
haustum.
Seselis Mafsiliensis semen ex vino epo-
tum.
Asclepiades radices ex vino potæ.
Alisma per se, aut cum pari pondere se-
minis dauci haustum.
Suillus talus combustus ad albedinem
vsque, & ebibitus.
Lini seminis decoctum per sedē infusū.
Agaricum duorum obolorum pondere
sumptum.

MATTHIOLI.

Oleum { Oliuarum cum vino cretico
potum, & infusum.
Amygdalarum dulciū potū.
Laurinum inunctum.

P. 2 Ericæ

Intestinorum.

Ericæ florum decoctum potum.
Persici nuclei deuorati,
Cochlearum elixarum ius epotum.
Miliū cum sale, & anthemidis floribus mistum, & calidum cum sacculis adhibitum.
Brassicæ ius cum uetere gallo paratum epotum.
Cyclamini succus in clysterib⁹ additus.
Chelidonium maius vna cum radice tumsum, & oleo chamæmelino feruefactum, & umbilico adhibitum.
Dictamnū album ex meraco potum.
Menthastrium.
Imperatoria.
Vincetoxici radix ex meraco.
Verbasci flores in puluerem triti, & epoti.
Herba trinitatis, aut stillatitia eius aqua bibita.
Momordicę farina potui data.

MATTHIOLI.

Ad dysentericos.

Aspalathi decoctum clystere infusum.
Myrrha fabę magnitudine deuorata.
Lentiscus ebibita.
Piceæ cortex potus.
Maceris cortex in potu sumptus.
Paliuri folia, & radix hausta.

Acu-

Intestinorum. 171

Acutæ spinæ fructus deuorati, vel poti.

Rubi camini fructus deuoratus.

Cisti folia, & cytini in potu data.

Hypocistis hausta.

Ladanum cum vino vetere epotum.

Rosarum fructus in potu sumptus.

Lycium potui datum.

Acaciæ succus haustus.

Glandium interior, tenuiorq; tunica decocta epota.

Castanearum interior pariter tunica ebibita.

Galla omphacitis ex vino aut aqua trita illita, haustauè.

Rhois foliorum decoctum clystere infusum, vel potu acceptum.

Eiusdem semina pro sale cibus, obsoniisq; aspersa.

Palme inuolucris decoctum tum infusum, tum bibitum.

Punicorum acidorum nuclei siccati, & ebibiti, vel in defensionibus additi.

Myrti semen, & folia pota.

Cotonea mala comesta cruda, vel cocta vel eorum succus potus.

Pyra tam domestica, quam syluestria deuorata.

Mespila in cibum accepta.

Loti arboris baccæ comestæ, vel haustæ.

Corni arboris baccæ siue in eduliis, siue in defruto assumpta.

Sorba sicca quoquo modo sumpta.

P 3 Pru-

Intestinorum.

Prunorum syluestriū bacce deuoratę.

Siliqę siccate deuorate.

Cochleę terrestres suis cum putamini
bus vstę (vt Gal. inquit) esui datę.

Siluri piscis falsamentum fomento ad-
hibitum.

Leporinus sanguis frixus deuoratus.

Garum piscium clysmate infusum.

Ceruinum cornu potum duorum co-
chlearium mensura.

Cera in sorbitionibus sumpta.

Lac ignitis iniectis calculis decoctum
clystere infusum.

Leporinum } coagulum triū obolorū

Equinum } pondere ex vino potum.

Asparagus altilis elixus, vel assus in ci-
bo sumptus mitigat.

Idea radix bibita.

Altheę decoctę succus ex vino potus.

Alceę radices cū vino aut aqua potę.

Phyllitis ebibita.

Portulaca ad summum cocta in cibis
sumpta.

Plantago per sedem infusa.

Equiseti succus potus.

Caprillus adeps cum polenta, & rhoe
datus, vel clystere infusus.

Melissophyllum ebibitum.

Tragium scolopendrę simile elixum, &
in cibo sumptum.

Faba in posca decocta, & comesa.

Alismatis radix cum pari pondere se-
minis

minis sylvestris pastinacæ epota.

Oxylapathi, aut oxalidis semē in aqua,
aut in uino haustum.

Lyfimachia potui data.

Tragi cacumina decem in uino pota.

Clematis folia cum uino hausta.

Stœbis decoctum clystere infusum.

Limonii semen in uino potum.

Elatine elixa ebibita.

Polemonii radix ex uino sumpta.

Eupatorii semē, & folia in uino hausta.

Nymphææ siccata radix ex uino pota.

Sedum maius cum uino potum.

San-	{	Hirci	{	in sartagine srixus, & cibo sumptus.
guis		Capræ		
		Leporis		
		Cerui		

Vitis viniferæ foliorū, & capreolorum
succus epotus.

Vinaceorum decoctum ebibitum.

Vinaceorum nuclei in farinam polentæ
modo illiti.

Vua passa alba comesa per se cum suis
nucleis.

Omphacium clystere infusum.

Vinum	{	Oenanthinum	{	epotum.
		Cydonites		
		Rhoites		

Terra lemnia hausta.

Muria clysmatibus infusa ubi diutina
dysenteria intestina exulcerata exti-
terint.

Intestinorum.

Scordium duarum drachmarum pon-
dere cum aqua dulci haustum.
Hederæ flores trium digitorum carptæ
bis in die ex vino hausti.

MATTHIOLI.

Lentiscinum oleum infusum.
Rosaceum oleum potum.
Thus potum & clystere infusum.
Armeniū lutum vnà cum corallio, ma-
stiche, cornu ceruino, & hematite la-
pide epotum.
Pinorum nucum cotices ex aceto acer-
rimo decocti, & suffiti.
Mastiches epota.
Millesolii succus clysteribus infusus,
quin etiam sicci farina cum epota, tū
infusa.
Potentilla pota aut viridis in calceis
imposita sub nudis pedibus.
Succinei pastilli hausti.
Crespini vuarū succus in potu sumpt⁹.
Vua spina.
Ribes vulgaris.
Ligustrinorum florum aqua.
Cisti flores.
Rosaceum saccharum.
Rosarum vngues.
Rosarum calix.
Rosarum semen & lanugo circumstās.
Lycium infusum.

Quer-

Intestinorum. 173

Quernorū foliorū stillatitia aqua epota
Querna folia, glandes, & gallæ.

Fagineæ glandes.

Punicum malum in furno tostum, tri-
tumque potui datum.

Punicæ mali florum saccharum rosacei
modo paratum deuoratum.

Myrteum condimentum.

Cerasia austera saccharo condita.

Poma acerba sub calidis cinerib⁹ assa.

Cydonia mala tosta a ieiunis deuorata

Cydoniorum vinum, miua, oleum, hoc
illitum, & illa hausta.

Diacydonites confectio.

Cydoniorum pomorum succus in quo
conferbuerint rubrum corallium, ru-
bearum rosarum semē, rhabarbarū,
hypocistis, & acacia.

Corna cum cruda, tum saccharo cōdita

Mora immatura arida.

Cochleæ cum testis vltæ admistis galla
omphacitide, & pipere albo, & cibis
inspersæ, aut ex vino austero potæ.

Leporina caro assa deuorata.

Leporinus sanguis adhuc calens cum
hordeacea farina decoctus, & deuo-
ratus.

Leporinus fimus potus.

Cerui genitale ex vino austero sumptū

Ouum gallinaceum in aceto coctū, du-
rum deuoratum.

Ceruinus sanguis clysteribus infusus.

P. 5 Cami-

Intestinorum.

Caninum stercus album ex lacte potum
in quo igniti calculi extincti sint.

Oryzæ decoctum potum, aut infusum.

Oryza in lacte cocta in quo igniti cal-
culi extincti fuerint deuorata.

Milii Indici panicularum flores intro-
sumpti.

Milii granorum putamē oui vitello ex-
ceptum, & probe decoctum sumptū.

Amylum in cibo vsurpatum.

Bistortæ

Tormentillæ

Caryophyllatæ

Lagopi paniculæ pro sedis abstersorio
vsurpatæ.

Virga aurea epota.

Plantaginis vtriusque semen ouo exce-
ptū regulisq; inassatum deuoratum.

Traforū lacteus cremor ex aqua in qua
candens ferrum extinctum fuerit pa-
ratus, & epotus.

Bursa pastoris cum plantagine, luto ar-
meno ex pluuiali aqua cocta, & epota.

Rhabarbarum igne torrefactum ex ui-
no austero, & plantaginis succo hau-
stum.

Tragacanthæ lachryma tosta, & ex ui-
no cydoniorum pota, tum clysmate
infusa.

Flos solis vna cum radicibus ex uino
austero epotus.

Aparinæ stillatitia aqua ebibita.

Gna-

Intestinorum. 174

Gnaphalium ex uino austero.

Conyzæ mediæ pulvis drachmę pondere quotidie sumptus ex uino austero.

Palmae christi florū pulvis ex aqua plantaginis, aut in qua ferrum ignitum extinctum fuerit, epotus.

Lunaria minor quoquo modo sumpta.

Cānabis foliorum pulvis oui uitello ex ceptus deuoratus.

Hyperici oleum uentri illitum.

Pyrola

Pilosella } ex uino austero pota.

Fragaria

Amaranti purpureus flos epotus.

Punicorum malorum uinum ex aqua plantaginis haustum.

Armenia terra pota, aut in clysteribus addita.

Corallium rubeum in pollinem tritum ebibitum.

Cristallum tenuissime laeuigatum potui datum.

MATTHIOLI.

Ad tormina.

Oleum { Oliuarum cum uino Cretico potum, & infusum.
Amygdalinum haustum,
Laurinum illitum.

P 6 Ericę

Intestinorum.

Ericę florum decoctum epotum.

Perfici nuclei deuorati.

Cochlearum ius haustum.

Milium cum sale mistum, & in sacculis
calidum appositum ventri.

Brassicę ius cum vetere gallo decoctū
haustum.

Cyclaminis succus clysteribus additus

Chelidonium maius vna cum radice
tusum, & oleo chamemelino ferue-
factum, & vmbilico illitum.

Dictamnus albus ex meraco epotus.

Menthastrum.

Imperatoria.

Vincetoxici radices ex meraco.

Verbasci flores in puluerem triti, & po-
tionibus inspersi.

Herba trinitatis, aut stillatitia eius a-
qua epota.

Momordicę farina hausta.

DIOSCORIDIS.

Ad cohibendam aluum & diar-
rhœam.

Coagulum leporinum epotum.

Lac omne in quo igniti calculi marini
extincti fuerint.

Caseus elixus, & ab elixatione statim
sepositus, moxque inassatus in cibo
sumptus.

Fimus

Fimus caninus ardente syrio acceptus,
& in aqua ebibitus.

Panis triticeus siccus inueteratus co-
mestus.

Hordeacea farina cum myrti baccis,
aut syluestribus pyris, aut malicorio
ex vino illita.

Puls ex $\left. \begin{array}{l} \text{Zea} \\ \text{Auena} \\ \text{Milio} \end{array} \right\}$ in cibum sumpta.

Oryza in cibum accepta.

Lentes cum suo cortice decoctę, deu-
ratę, præsertim si decoquantur ex ace-
to cum adstringentibus aliis.

Oxylapathi, aut oxalidis semen in ui-
no aut aqua potum.

Brassicæ percoctæ cibus

Beta nigra cum sua radice, & lente de-
cocta esui data.

Plātago ex aceto elixa cum sale come-
sa; quin & eius semen ex vino potū,
Præterea clysteribus infusa.

Intybus tam hortensis, quam erratica
in cibum accepta.

Condryllæ succus coactus, potus.

Lens syluestris quoquo modo sumpta.

Acinos pota.

Anisum ebibitum.

Anethum quinetiam eius coma & se-
meo haustum.

Apium in cibo sumptum.

Phyllitis potui data.

Acan

Intestinorum.

Acanthi radices bibitæ.
Fœniculum erraticum epotum.
Ruta in cibo, uel potu sumpta.
Orchis serapias ex uino potus.
Pœoniæ radix ex uino decocta hausta.
Althææ decoctum bibitum.
Alismatis radix pota.
Polygoni succus epotus.
Clematis prima in uino ebibita.
Lagopus ex uino, uel ex aqua sumpta
ubi febris sit.
Xyridis radix in mulso epota.
Anchusæ folia ex uino sumpta.
Rubi ramorum decoctum potui datum.
Quinquefolii radices decoctum epotum,
Phœnix in uino austero hausta.
Idea radix bibita.
Iunci præsertim marini semen frixum,
& in diluto uino potum.
Astragali radix ex uino hausta.
Hyacinthi radix ebibita.
Papaueris nigri semen ex uino potum.
Verbasci radix, & flores potui dati.
Labruscæ flores epoti.
Punicorum acidorum uinum haustum.
Rubrica sinopica in ouo epota, aut cly-
stere infusa.
Vini fex illita.
Sedum maius ex uino epotum.
Adianti decoctum haustum.
Trichomanes decoctum bibitum.
Acetum cibus incoctum.

Matth-

MATTHIOLI.

Arborei musci dilutum ex uino paratum haustum.

Thus epotum, & clystere infusum.

Mespila

Sorba

Corna

Pyra syluestria

} deuorata.

Nux myristica, & præsertim tosta.

Auellanarum putamina trita, & ex uino austero pota.

Oryza torrefacta, & in lacte decocta in quo igniti calculi extincti sint, assumpta.

Milii putamen oui vitello exceptum de inde inflatum, & deuoratum.

Caryophylli prius igni tosti, & in potu aut cibo sumpti.

Coriandri semen ex aqua potum.

Lagopi folia, panicule, & semen ex uino austero, aut punici mali hausta.

Virga aurea pota, & in clysteribus addita.

Potentilla pota, aut viridis in calceis nudis pedibus supposita.

Fragarię folia, atque radices.

Solbastrella, siue sanguisorba quouis modo usurpata.

Pulmonaria altera ebibita.

Punicorum malorum acidorum vinum epotum.

Arme-

Intestinorum.

Armenia terra tam pota, quàm clyfma
te infusa.

MATTHIOLI.

Ad lienteriam.

Arborei musci dilutum ex uino paratū.
Lycium.

Saccharum è punicorum floribus para-
tum ex austero uino sumptum.

Myrteum condimentum.

Siliquę sicce deuorate.

Nux myristica præsertim calido cinere
inassata commanducata.

Milii Indici panicularum flores hausti.

Milii putamen oui vitello exceptum de
inde inassatum, & deuoratum.

Oxylapathi semen potum.

Caryophylli tosti in potione, uel cibo
sumpti.

Rhabarbarum tostum, & uino austero,
aut plantaginis succo haustum.

Coriandri semen ex aqua.

DIOSCORIDIS.

Ad diuturnas alui fluxiones.

Sanguis.	{	Hircinus	} in sartagine fri-	
		Caprillus		xus & comest ⁹ .
		Leporinus		
		Ceruinus		

Mat-

MATTHIOLI.

Mastiches pota.

Nux myristica deuorata.

Myrice ramorum cortex.

Oxylapathi semen epotum.

Milii Indici flores intro sumpti.

Milii putamen vitello oui exceptum, &
deinde inassatum deuoratum.

Caryophylli tosti i potu, aut cibo sumpti.

Lagopi folia, semen, & panicule ex vino
austero, aut punici mali pota.

Virga aurea tum pota tum infusa.

Pyrola

Pilosella

} quomodolibet vsurpatæ.

Potentilla pota uel uiridis in calceis au
dis pedibus supposita.

Fragariæ folia & radices.

DIOSCORIDIS.

Ad emolliendam aluum.

Cerasa dulcia deuorata.

Melimela esui data.

Perfica in cibum sumpta.

Mora matura comesta.

Ficus mature deuorata.

Marinus Echinus in cibis.

Tellinarum, chamarumq; ius cum sale
haustum.

Sepia in cibo sumpta.

Silu-

Intestinorum.

Silurus piscis in cibus.

Gobii ius ebibitum.

Piscium in vniuersum ius per se, aut ex
vino bibitum.

Gallinaceorum veterum ius epotum.

Lac haustum.

Serum lactis epotum.

Caseus recens in cibo sumptus.

Butyrum comestum vel ebibitum.

Medulla ossium deuorata.

Cicer in cibo sumptum.

Rumex

Blitum

Malua

Attriplex

Beta candida

Asparagus

Lactuca.

Brassica leuiter feruefacta deuorata.

Tragoriganum potum.

} decocta & in cibus
sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad intestinorum inflationes.

Farina tritici cum hyoscyami succo illita.

Farina hordei cum lini, & fenogreci semine imposita.

Ociimi semen potum.

Rhaponticum bibitum.

Anethi comæ, & seminis decoctum potum.

Cumini

Intestinorum. 178

Cumini decoctum cum oleo clystere in-
fusum, vel eius semen cum polenta,
& hydræleo maceratum & illitum.

Peucedani liquor in ovo ebibitus.

Anthemidis decoctum epotum.

MATTHIOLI.

Cubebæ quocunque modo sumptæ.

Cinnanomi aqua stillatitia pota.

Acorum quod falso calamum odoratū
vocant vsui acceptum.

Balsami factitii liquores omnes.

Ricinum oleum.

Mumia ex ammi, & cari decocto ebi-
bita.

Milium torrefactum cum sale mistum
& calidum in sacculis impositum.

Sisymbrium quocunque modo sumptū.

Quinta essentia nostra lib. 5. cap. de vi-
no descripta, epota.

DIOSCORIDIS.

Ad latas intestinorum tineas.

Cardamomum potum.

Mali punicæ radicum decoctum epotū.

Nuces iuglandes largius esitata.

Mori radice corticum decoctum hau-
stum.

Allium potui datum, vel comestum.

Chame-

Intestinorum.

Chameleonis albi radix acetabuli pon-
dere ex castorei, & origani decocto
epota.

Filicis foeminae radix trium drachma-
rum pondere ex melle hausta.

Melanthii semē potum, uel ex aqua um-
bilico illitum.

Atramentū sutoriū drachmę pondere
sumptum, uel cum melle delinctum.

Heliotropii maioris tum folia, tum se-
mina cum hyssopo, nitro, & nastur-
tio epota.

DIOSCORIDIS.

Ad teretes intestinorum tineas.

Lupinorum farina cum melle lincta,
uel cum aceto, pipere, & ruta hausta.

Brassicę semen potum.

Portulacę succus potui datus, præstat
idem & semen.

Nasturtium bibitum.

Absinthium marinum per se, uel cū ory-
za decoctum cum melle sumptum.

Absinthium santonicum aut marinum
haustum.

Hyssopum cum melle linctum.

Mentha bibita.

Calaminthę decoctum cum sale, & mel-
le sumptum.

Thymum haustum.

Thy-

Thymbra potui data.

Rutæ decoctum ex oleo epotum.

Coriandrum cum passo sumptum.

Anchusa tertia cum hyssopo, & nasturtio pota.

Vinum absinthites potui datum.

Sedum maius ex vino haustum.

Filicis femine radix drachmarum triū pondere cum vino pota, sed qui sumunt prægustare allia debent.

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum epotum.

Asarina quoquo modo hausta.

Helenii radicum succus, aut decoctum potum.

Amygdalarum amaranū oleum potum.

Myrrha hausta.

Iuniperi gummi haustum.

Lauri cimæ cum calamintha, & sale triæ, & ex tepida aqua potæ.

Crespini acinorum succus cū aqua graminis, aut portulacæ potus.

Persici folia contusa, & ventri ex aceto illita.

Aqua stillatitia è limoniorum succo ebibita.

Limonii immaturi succus haustus.

Pruni sylvestris aqua a floribus .s. distillata epota.

Sebestena deuorata.

Brassicæ

Intestinorum.

Brassicę semen haustum.

Beta candida cum allio deuorata.

Sisymbrium epotum.

Erucę semen sumptum.

Nucum Indicarum oleum.

Mori arboris radix pota.

Oleum scorpionum nostrum cum potum tum illitum.

Cornu ceruinum ex melle haustum.

Apri urina oleo in sua ipsius uesica commista, diuque in fumo suspensa, naribus, & arteriis manuum & temporum illita.

Secalę vulgaris decoctum cum coriandro epotum.

Lupinus tum illitus, tum potus.

Napi semen ex limoniorum, aut aurantiorum succo haustum.

Caryophylli flores ita vocati saccharo asseruati deuorati.

Succisę radicis puluis potioni iniectus.

Gentianę stillatitia aqua epota.

Cruciataę radix tusa, & uentri imposita.

Agaricum

Rhabarbarum] insumptum.

Centaurium minus drachmę pondere ex melle deuoratum.

Aloe ex lacte, uel melle sumpta, aut bubulo felle, & aceto excepta, & umbilico tenus illita.

Abrotanum.

Abfinthium.

Hyflo

Hyssopum ex melle, & nitri momento.
Dictamnus albus drachmę pōdere hau-
stus.

Menthastrum ex aceto ebibitum.

Menthę gręcę succus potui datus.

Galegę succus haustus, siue herba ipsa
recens ex oleo amygdalarum ama-
rarum calefacta, & uentri adalligata.

Pseudomelanthii semen tam potum,
quàm ex bubulo felle, & aceto illitū.

Vincetoxici radices cum albo dictam-
no haustæ.

Cardui benedicti decoctum, aut stillati
tia aqua pota.

Chamędryos succus, uel uinum in quo
florescens planta fuerit macerata e-
bibitus.

Marrubii puluis insumptus.

Securidacę utriusque semen ex dulci li-
xiuo potum.

Tanacetum.

Cannabis decoctum ebibitum.

Hyperici florum oleū cochlearis men-
sura epotum.

Tormentille, Bistortęve radicum deco-
ctum haustum.

Eupatorii uulgaris succus in catapotiiis
deuoratus.

Muscus marinus drachmę pondere hau-
stus, & electuariū ex ipsomet musco,
vide lib. 4. eius comment.

Lupuli semen tritum, & potui datum.

Oleum

Intestinorum.

Oleum è colocynthide cum felle bubu-
lo vmbilico inunctum.

Argentum viuum semisrupuli ponde-
re haustum.

Oleum è calcantho sex granorum pon-
dere, ex vino ebibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad fluxum ex epoto medi-
camento.

Gallorum gallinaceorum senum ventri-
culus sale inueteratus, & in vmbra
ficcatus epotus.

MATTHIOLI.

Ad iliacam passionem.

Iridis Illyricæ puluis drachmæ ponde-
re ex passo hausta.

Oleum senarum vnciarum pondere ex
vino cretico potum aut infusum.

DIOSCORIDIS.

Ad intestinorum vulnera.

Equiseti radix, & folia cum aqua pota.
Mat-

MATTHIOLI.

Leporinus finus, atq; pili, qui sub vêtre
habentur ex melle decocti, & fabæ
quantitate frequenter deuorati.

Terrenorum vermium oleum addito fa-
stidio balsamo illitum.

Cyclamini radicum stillatitia aqua sex
unciarum pondere hausta, addito se-
lectissimi sacchari puluere.

Ophyoglossum ex equiseti aqua potum
Terrestris hederæ decoctum; vide eius
commentarium.

Solidago maior, & media	} in potio- nibus hau- sta.
Sanicula	
Auricula vrsi	
Pilosella	

Pyrola, de qua vulnerariam potionem
habes lib. 4. commento de limonio.

Virga aurea	} in potionibus ad- dita.
Potentilla	
Alchimilla siue stellaria	

Momordicæ siccæ puluis cochlearis mē-
sura ex plantaginis, aut equiseti deco-
cto epotus.

DIOSCORIDIS.

Ad intestinorum ulcera.

Lac omne ignitis calculis calefactum,
infusum.

Q Sapphy-

Sedis.
Sapphyrus lapis ebibitus.

MATTHIOLI.

Solidago minor, &
media
Potentilla
Sanicula
Auricula vrsi
Pilofella
Pyrola

tum pota tū infu-
sa per clysteres.

Sedis.

DIOSCORIDIS.

Ad fedis rimas.

Pix liquida illita.

Amurca in cupreo vase ad mellis spissi-
tudinem decocta illita.

Viticis semen cum aqua illitum.

Cancris fluuiatiles combusti, cum melle
cocto illiti.

Labri veneris radix in vino decocta, &
subinde tusa imposita.

Leucoii flores cera excepti, & empla-
stri modo adhibiti.

Labruscæ flores illiti.

Plumbum clotum impositum.

Mat-

MATTHIOLI.

Juniperinum gummi cum rosaceo, aut
myrteo illitum.

Cancris fluuiatiles triti & inspersi.

Oleum ex luteis ouorum inunctum.

Plantaginis recētia folia trita, & illita.

Verbasci genera omnia.

Vnguentum ex mortario, & pistillo plū
beo atque oleo paratum, illitum.

Diphryges in vnguentis additum, aut
inspersum.

DIOSCORIDIS.

Ad sedis vlcera.

Thus tritum cum lacte, & linamento
exceptum impositum.

Punicorum acidorum succus cum mel
le decoctus illitus.

Desypus impositus explet & emollit.

Plumbum elotum illitum.

MATTHIOLI.

Aloe inspersa.

Solidago minor, & media.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella

Pyrola.

Q 2

Ver-

Sedis.

Verbasci genera omnia.
Vnguentum ex oleo mortario, & pistil-
lo plumbeo paratum.
Diphryges.

DIOSCORIDIS.

Ad condylomata.

Cydonia mala cruda cataplasmatibus ad-
dicta.
Ovi vitellus assatus, & ex rosaceo & cro-
ceo illitus.
Aloe cum passio adhibita.
Auethi cremati seminis cinis illitus.
Libanotis emplastri modo imposita.
Ballotes folia in feruenti cinere cocta,
imposita.
Rubi folia adhibita.
Helsine imposita.
Quinque folii radix illita.
Sarmentitius cinis, quin & vinaceorum
ex aceto illitus.
Rubigo ferri illita.
Plumbum elotum impositum.
Sandaracha cum rosaceo inuncta.
Suillus adeps illitus.
Crocum cataplasmatibus inditum.

MATTHIOLI.

Lini seminis oleum illitum.

Plan-

Plantaginis recentia folia trita & illita.
Verbasci genera omnia.

DIOSCORIDIS.

Ad Sedis inflammationes.

Lens cum fertula campana, ficcis rosis,
cydonio malo, malicorio, & rosaceo
apposita.

Sonchi succus illitus.

Melilotus cum scenogreci farina, & li-
ni semine ex passio impositus.

Libanotis adhibita.

Althææ radix decocta illita.

Symphyti maioris radix cum foliis se-
necionis cataplasmatibus modo.

Senecionis flores, & folia ex modico vi-
no illita.

MATTHIOLI.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.
Verbasci genera omnia.

DIOSCORIDIS.

Ad induratos Sedis tumores.

Pix liquida illita.

Sedis
DIOSCORIDIS.

Ad procidentem sedem.

Lentisci succus, & folia illita.
Malorum cydoniorum decoctum in de-
fessionibus.
Torpedo marina apposita.
Cyclamini succus ad mellis spissitudi-
nem decoctus illitus.
Cerulei anagalidis flores appositi.
Aster atticus illitus.
Acetum illitum, & fotu adhibitum.
Acida muria in defessionibus.

MATTHIOLI.

Mastiche aspersum.
Cochlee putamen vstum, & aspersum.
Plantaginis recentia folia trita, & im-
posita.
Verbasci florum, & seminum pulvis la-
rigna resina exceptus, & suffitus addi-
ta anthemidis florum farina.
Ebuli radicum succus illitus.

MATTHIOLI.

Ad hæmorrhoidarū dolorem.

Nucum indicarum oleum illitum.
Persicorum nucleorum oleum.

Lini

Lini seminis oleum.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.

Porri folia decocta, & imposita.

Dracunculi radix cineribus calidis tosta, & apposita.

Ari radix oleo subacta, & adhibita.

Scrophulariæ vnguentum, eius parandi rationem habes lib. 4. cap. 90.

Verbasci genera omnia.

Oleum de momordica ex amygdalino, aut lini semine paratum, vide lib. 4. commento vitis nigre.

DIOSCORIDIS.

Ad hæmorrhoidas ciendas.

Cepa confricata.

MATTHIOLI.

Ficulnea folia affricta.

Cepa cruda imposita, aut ex aceto illita.

Cyclamini radix recens affricta, aut eius succus ex lana impositus.

DIOSCORIDIS.

Ad hæmorrhoidarū defluxiones.

Aloe cum passio illita.

Q 4 Liba-

Sedis.

Libanotis emplastrum modo imposita.
Rubi folia adhibita.
Palmulæ illitæ.

MATTHIOLI.

Iuniperinum gummi ex oleo rosaceo,
aut myrteo illitum.

Plantaginis recentia folia trita, & il-
lita.

Lagopi panicularum cinis inspersus.

Verbasci flores vna cum oui vitello &
clematide prima, & porri foliis illiti.

Eiusdem verbasci folia suffita ex mola-
ri lapide accenso.

DIOSCORIDIS.

Ad hæmorrhoidas sanandas.

Rhois semen illitum.

Palmulæ adhibitæ.

Ononis decoctum (vt quidam aiunt)
epotum.

Plumbum elotum impositum.

Arabicus lapis illitus.

Portulaca ad summum cocta imposita.

MATTHIOLI.

Iridis radicis decoctum fotum.

Dio-

DIOSCORIDIS.

Ad tenasmos.

Lac { Ouillum
Caprillū } ignitis calculis cale
Bubulum } factū clystere ifusū

Fœnigræci seminis decoctum infusum.

Lini semen quoquo modo appositum.

Erui farinā vino macerata illita.

MATTHIOLI.

Thus suffitum addita præsertim colo-
phonia resina.

Verbasci florum, & seminum pulvis vnā
cum anthemidis florum farina resina
larigna receptus & suffitus.

DIOSCORIDIS.

Ad pensiles thymos.

Capræ syluestris fel illitum.

Fimum ouillum ex aceto impositum.

Lasër in malicorio cum aceto seruesca-
tum.

Acetum adhibitum.

Q s Mat-

Sedis.

MATTHIOLI.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.

MATTHIOLI.

Ad inflammationes.

Caphura.

Oleum è cucurbitarum vulgarium floribus paratum illitum.

Lentis palustris stillatitia aqua tum pota, tum illita.

Renum.

DIOSCORIDIS.

Ad renum dolores.

Cardamomum ex vino epotum.

Nardum celticum potum ac impositum.

Amomi decoctum haustum.

Harundinis radix lumborum doloribus proficit cum aceto illita.

Tragacantha drachmę pondere in passo dissoluta cum adusto elotoq; cornu cerui, & scissilis aluminis tantillo potum.

Peucedani succus potus.

Vua

Vua passa alba in cibis sumpta.
Alcyonium tertium haustum.
Feniculi comę decoctum subditum.
Anagallis epota.
Agarici drachma ebibita.
Glycyrrhizę succus cum passo potus.
Tordilium bibitum.
Anthyllis pota.
Pœonię radix ex vino hausta.
Symphytum petreum ex aqua epotum.
Anchusę decoctum ex aqua bibitum.
Vinum mellitites haustum.

MATTHIOLI.

Cassię solutię pulpa cum glycyrrhi-
zę puluere hausta.
Oleum laurinum illitum.
Amygdalinum oleum epotum.
Filipendulę radix pota.
Althęę alterius semen ebibitum.

MATTHIOLI.

Ad lumborum dolorem.

Helenii folia ex vino illita.
Agaricum in potionibus additum.

DIOSCORIDIS.

Ad renum calculos, & arenulas.

Q 6 Nardus

Renum.

Nardus { Indica } potui data, verū
 { Celtica } celtica ceteris
 { Montana } præstat.

Lauri folia pota, quin & radicis cortex
qui longe potentior est, potus.

Cerasi gummi ex vino haustum.

Amygdalę amarę gūmi ex passlo sūptū

Anonis radicis cortex cum vino potu
datus.

Anisum haustum.

Cumini alterius sylvestris semē epotū.

Arthemisię decoctum in defecsiōni-
bus adhibitum.

Chamæmeli decoctum potum vel fotu
adhibitum.

Parthenii folia hausta.

Althęę decoctum ebibitum.

Alismatis decoctum potui datum.

Tribuli vtriusque fructuū succus epot⁹.

Rubi radix hausta.

Papaveris corniculati radicis decoctū
ebibitum.

Vmbilici veneris folia cū radice pota.

Vinum absinthites epotum.

Adiantum potui datum.

Thrichomanes potui data.

Vua passa alba deuorata.

Melitites vinum as idue potum.

Alcyonium tertium ebibitum.

MATTHIOLI.

Iridis radicis decoctum potum.

Iridis

ridis radices cōdite frēq̃nter deuoratę
Phu radices ex iure sumptę.

Carpesum.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Cassię solutiux pulpa ex glycyrrhizę
decocto aut puluere sumpta.

Balsami factiti liquores omnes epoti.

Terrestris musci ex vino decoctū potū.

Oleum cum pari portione vini cretici
calidum potum, aut infusum.

Amygdalinum oleum, & pręsertim ex
amaris nucibus.

Bdellium in potu datum.

Refina	{	Larigna	{	deuorata vi
		Terebinthina		cię ponde-
		Ablegna		re.

Os humani capitis haustum.

Fraxini semen ex vetere vino epotum.

Aqua defluens ex perforato betulę cau-
dice bibita.

Quernorū foliorū stillatitia aqua pota

Glandis fagineę cinis, ex posca illitus.

Persici lachryma cū succo raphani, aut
limonum sumpta.

Persicorum nucleorum oleum potum,
quin etiam nuclei ipsi hausti.

Persicorum nucleorum, & aliorū non-
nullorum stillatitia aqua, vide in cō-
mentario persici libro primo.

Limoniorū succus ex vino cretico pro-
pinatus.

Mespilorum ossicula cochlearis mēsu-
ra

Renum.

ra ex vino albo hausta.

Cochleæ putamen casu inuentum tritū
potui datum.

Cammarorum lapilli ex vini albi po-
tione sumpti.

Cancris fluuiatilis putamen ex vino sub
dulci potum.

Scorpionum cinis ex vino datus.

Scorpionum oleum pubi illitum.

Leporis integri combusti cinis in potu
sumptus.

Leporini renes tum crudi, tum cocti de
uorati.

Calli qui equorum interna crurū par-
te innascuntur triti ex vino hausti.

Humani stercoreis stillatitia aqua pota.

Ciceris cum nigri, tum quoque rubri
ius haustum.

Brassicæ ius epotum.

Hyppolapathi radix trita ex vino sum-
pta, item eiusdem stillatitia aqua,
cuius parandi rationē habes in eius
commento.

Veronica mas.

Dictamnus albus ex uino meraco ebibi-
tus duarum drachmarum pondere.

Filipendulę radices haustæ.

Tanacetum quouis modo usurpatum.

Hyperici semen ex uino.

Polygoni minoris puluis ex uino po-
tus.

Oleum è flammula illitum. Parandi ra-
tionem

tionem habes lib. 4. commento de
clematide altera.

Consolidæ regalis flores poti.

Saxifragiæ albæ decoctum potum vel
alba radicum circumstantia grana cō
tusa, & deuorata.

Saxifragia magna drachmæ pōdere ex
vino hausta.

Pimpinellæ saxifragiæ radices potæ.

Vinum è calcatis halicacabi solani bac
cis potum vnciarū quatuor pōdere.

Primulæ veris radicum decoctū epotū.

Genistæ semen aut iuncea eius rami cū
foliis, in potionibus.

Genistæ florum stillatitia aqua bibita
libræ pondere, & eorundem conser
ua ex saccharo parata, & deuorata.

Oleum è chalcanto scrupuli pondere
ex vino potum.

DIOSCORIDIS.

Ad renum vlcera.

Lac omne potum.

Plantaginis radices, & folia ex passo
sumpta.

Vua passa alba come sa.

Melitites vinum assidue potum.

MATTHIOLI.

Pinei nuclei ex melle, aut saccharo de
uorati.

Tra-

Renum

Tragacanthæ lachryma intus sumpta.
Equiseti cuiusque decoctum, aut aqua
stillatitia pota.

DIOSCORIDIS.

Ad renum obstructiones.

Rhaponticum haustum.

Vinum { Absinthites } epotum.
 { Melitites }

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum ebibitum.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Cassie solutiue pulpa deuorata.

Terebinthina, lariceaue resina vncie
pondere sumpta.

Zizypha.

Agaricum.

Anonis, & eius aqua stillatitia.

Ciceris decoctum potum.

Nuclei pinei deuorati.

Hippolapathi radix contrita ex mero.

Draculi radice farina ex vuaru pas-
sarum cremore, & mastiches momē
to sumpta.

Cardui benedicti radicum decoctum
haustum.

Eryngii radix.

Veronica mas.

Fra-

Fragarię radicū, & foliorū decoctū
epotum.

Vinum ē calcatis solani halicacabi bac
cis quatuor vnciarū pondere hau
stū.

Oleum ē chalcātho ex vino potum.

Vesicæ.

DIOSCORIDIS.

Ad ciendam remorantē vrinā.

Acori decoctum potum.

Mei radices ex aqua decoctæ, vel tritę
citra coctionem & epotę.

Nardus { Indica
Celtica } potui data.
Montana

Cardamomum ex vino haustum.

Asarum bibitum.

Phu sicca

Malabathrum

Casia

Cinnamomum

Costus

Iuncus odoratus

Calamus odoratus cum graminis, aut
apii semine sumptus.

Aspalathi decoctum haustum.

Crocum ebibitum.

Heleni

Vesicæ

Helenii radicum decoctum potui datū.

Crocomagma epotum.

Pineæ nuces repurgatæ deuoratae, aut
cū passo, vel cucumeris semine potę.

Lentisci decoctum haustum.

Terebinthi fructus comestus.

Resina omnis præsertim terebinthina
intro sumpta.

Cupressi folia ex passo, & exiguo myr-
rhæ, epota.

Cedrides deuoratae, vel potæ.

Lauri foliorum decoctum in defessio-
nibus.

Albæ populi cortex vnciæ pondere hau-
stus.

Paliuri foliorum, & radicum decoctum
in potu sumptum.

Phillyreæ folia ebibita.

Ladanum ex vetere vino haustum.

Oleæ Aethyopicæ, ac nostratis lachry-
ma potui data.

Glandes in potu sumptę.

Palmæ inuolucris decoctum bibitum.

Punicæ acidæ succus epotus.

Cerasi gummi haustum.

Amygdalę amarę lachrima pota.

Erinaceus marinus deuoratus.

Erinacei terrestres caro inueterata ex
aceto mulso pota.

Vermes terreni triti, & cū passo hausti.

Mel sumptum.

Ptisana hordeacea deuorata.

Zythum

Zythum ex hordeo paratum potum.
Cicerum decoctum potui datum.
Erui decoctum haustum.
Lupinorum radicum decoctum bibitū.
Raporum cauliculus elixus deuoratus.
Raphanus comestus, quin & eiusdem se-
men potum.
Siferis radix in cibum accepta.
Asparagi breui coctura elixi, & in cibū
accepti.
Sion quoquo modo vsurpatum.
Cucumeris semen epotum.
Erucae vtriusque semen bibitum.
Dracunculus minor haustus.
Hortensis smilacis filiquæ cum semi-
ne elixæ, & comestæ.
Asphodeli radix epota.
Bulbus vomitorius in cibum sumptus,
vel eius decoctum potum.
Porrum domesticum, & syluestre co-
mestum.
Cepa decocta in cibum sumpta.
Allium deuoratum.
Capparidis fructus quadraginta diebus
potus.
Anagallidis succus bibitus.
Calaminthæ decoctum epotum.
Saluæ decoctum haustum.
Crocodilii semen bibitum.
Thimi decoctum potui datum.
Thymbræ decoctum haustum.
Serpillum in potu sumptum.

Ruta

Vesicæ

Ruta quoquo modo sumpta.
Spinę albę radix pota.
Acanthi radices ebibitæ.
Ononidis radiceis cortex ex vino pot⁹.
Eryngii radix hausta.
Absinthium potui datum, vel eiusdem
decoctum bibitum.
Hyslopi decoctum in potu sumptum.
Origanum haustum.
Tragorigani decoctum ebibitum.
Ruta sylvestris pubi illita.
Ligustici semen, & radix pota.
Pastinacę erraticę semen haustum.
Cari semen epotum.
Anethi comę & seminis decoctū ebibi-
bitum.
Apiū crudū, coctūve in cibum sumptū.
Petroselinum quoquomodo vsurpatū.
Feniculi decoctum potum.
Nigella pluribus diebus epota.
Polii montani decoctum potui datum.
Arthemisię decoctum in defessioibus
adhibitum.
Anthemidis decoctum haustum, vel in
defessioibus additum.
Lithospermī semen ex vino albo potū.
Rubię radix hausta.
Lonchitis radix ex vino sumpta.
Hypericum bibitum.
Betonicę folia pota.
Periclymeni semen haustum, est. n. va-
lentissimum medicamentum.

Saxi-

Saxifragia potui data.

Kyridis radix trium obolorū pondere
bibita, sed semini vis longe maior.

Lunci marini semen frixum.

Ageratum suffitum.

Vesicariae siue Halicaeabi rubentes aci-
ni folliculis inclusi deuorati.

Solani somniferi semen epotum.

Rusci folia, baccae asparagi radicesve in
vino ebibitæ.

Spartii semen deuoratum.

Vitis albæ cauliculi tenelli decocti &
in cibum sumpti.

Cytisi decoctum epotum.

Dauci semen haustum.

Coris semen in potu sumptum.

Equiseti succus epotus.

Vmbilici veneris folia cum radicibus
manducata.

Bunii & pseudobunii semen potum.

Astragali radix ex vino sumpta.

Hyacinthi radix bibita.

Vitis nigræ viticulæ primæ coctæ co-
mestæq;.

Chamedaphnes foliorum succus ex vi-
no sumptus.

Vinum	{	Cydonites	}	potum.
		Hyssopites		
		Scillinum		
		Absinthites		

Aqua mulsa in potum accepta.

Mat-

Vesicæ.

MATTHIOLI.

Nardi Italicæ aut Lauendulę flores ex
vino feruefacti, & pubi impositi.

Afarinę decoctum potum.

Carpesium haustum.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Calamus odoratus vulgaris in potu sü-
ptus.

Bdellium haustum.

Iuniperinus cinis ex lixiuio, & vino al-
bo potus.

Sabina quocunque modo usurpata.

Fraxini semen epotum.

Arundinis radix.

Cochleæ putamen casu repertum tritū
& ex albo vino potum.

Scorpionum exustorum cinis haustus.

Sepię oua in cibis sumpta.

Cimices viui in penis foramen immissi

Aqua in qua ceruinum genitale elotū
fuerit hausta.

Sisymbrium aquaticum cum raphano
omni, & petroselini radicibus, ex al-
bo meraco, butyroq; calefactum po-
tui datum.

Melopeponum seminum lacteus cre-
mor ebibitus.

Pectinis Veneris planta tota albo me-
raco, & butyro calefacta, & pubi im-
posita.

Porri semen ex passo potum.

Sinapi

inapi haustum.

Gentiana.

Anonidis radicem stillatitia aqua Pa-
randi modum habes commento de
Anonide lib. 3.

Cardui benedicti radicem decoctum
epotum.

Veronica mas ebibita.

Hyssopum }
Pulegium } potum.

Mentha græca ex vino feruesfacta, & pu-
bi apposita.

Imperatoria hausta.

Vincetoxicum sumptum.

Filipendulæ radices ex uino epotæ.

Tanacetum feruesfactum, & impositum.

Polygoni minoris puluis ex uino potus.

Oleum flammulæ inunctum pubi, aut
clystere infusum.

Consolidæ Regalis flores, aut eorum
decoctum haustum.

Saxifragia alba ex uino decocta, & po-
ta, uel granula quæ in radice sunt cõ-
tusa, & insumpta.

Saxifragia magna.

Fragariæ folia, & radices, siue earūdem
decoctum ex uino.

Pimpinella saxifragia.

Trichomanes in puluerē trita, & drach-
mæ pondere ex albo meraco pota.

Lupuli semen tritum, & potui datum.

Genista quoquo modo sumpta.

Genistæ

Vesicæ.

Genistæ florum ex vino decoctum, aut
stillatitia aqua, quinetiam conserua
ex iisdem, & saccharo parata.

Oleum è calcantho ex uino potum scru
puli pondere.

DIOSCORIDIS.

Ad vrinæ angustias.

Cimices lectularii triti, & vrinariæ fistu
læ impositi.

Millepedæ ex vino potæ.

Cicadæ inassatæ mansæ.

Locustæ suffitæ.

Ceruini cornu cinis elotus binis ligulis
epotus.

Maluæ decoctum in sessione adhibitum

Portulaca in cibum sumpta.

Asparagi radicum decoctum haustum.

Crithami radix, semen, & folia ex vino
decocta, epota.

Sandicis decoctum ebibitum.

Caucalis olerum modo in cibo sumpta

Amaraci decoctum epotum.

Baccharis radicum decoctum haustum.

Ocini semen bibitum.

Smyrnii radix pota.

Agaricum drachmæ pondere datum.

Peucedani succus epotus.

Rhaponticum potum.

Phalaridis succus ex aqua, aut vino
haustus.

Lotus

Lotus sylvestris trita per se, aut cum
maluæ semine ex vino, aut ex pas-
so ebibita.

Chamæpitys potui data.

Chameleōis albi radicis decoctū potū.

Abrotani semen tritum, & ex aqua ca-
lesfactum, & haustum.

Pastinacæ sylvestris semen potum, vel
pubi illitum.

Tordilii semen in potu sumptum.

Polemonii radix ex aqua pota.

Sisonis semen haustum.

Ammi cum vino ebibitum.

Petroselini semen epotum.

Galbanum haustum.

Chamedryos decoctum potui datum.

Trifolii bituminosi semen, & folia in
aqua pota.

Scordii decoctum ex vino, vel ex aqua
paratum epotum.

Anthyllis altera drachmarum duarum
pondere sumpta.

Pœonia potui data.

Althææ decoctæ succus ex vino potus

Graminis radicum decoctum ebibitū

Arctii radix cum semine decocta po-
tui data.

Adiantum potum.

Trichomanes hausta.

Alcyonium tertium epotum.

Lapis	{	Hæmatites ex vino	} potus
	{	Morochth ⁹ ex aqua	
		R	Lapis

Vesicæ.

Lapis { Iudaicus ciceris magnitudine
ex aqua calida potus.
{ Spongiæ ex vino haustus.

MATTHIOLI.

Cassia solutiua pulpa deuorata aut
cum diureticis hausta.

Amygdalarum oleum potum, aut per
penis meatum infusum.

Terebinthina resina deuorata.

Lauri bacca cum triticeo fursure, iuni-
peri baccis & allio contrita, & vino
super calenti regula aspersa & pubi
superposita.

Napi semen cochlearis mensura addi-
ta lini seminis drachma ex vino po-
tum.

Raphani rustici radix minutim con-
cisa una cum petroselini vulgaris ra-
dicibus ex oleo, vel butyro, & vino
calefacta & pubi adalligata.

Raphani hortensis radix eodem modo
vsurpata.

Raphani vtriusque dilutum ex vino pa-
ratum haustum, vel eorum succus vn-
ciarum duarum pondere ex cretico
vino sumptum.

Anonidis radicum stillatitia aqua po-
ta. parandi modum habes lib. 3. cap. 8.

Dio-

DIOSCORIDIS.

Ad urinæ stillicidium.

Acori decoctum potum.

Sisymbrii semen in vino bibitum.

Panaces heracleum ex vino haustum.

Seseli Mafsiliense potui datum.

Cumini syluestris alterius semen in potu sumptum.

Olusatris radix cum semine ex mulso pota.

Polycnemonum ex vino ebibitum.

Clynopodium haustum.

Oenanthes radix cum vino epota.

Conyze folia, & flores in potu.

Aspleni decoctum potui datum.

Cepæ cum asparagi radicibus decoctum, in potu sumptum.

Onobrychis bibita.

Poligoni succus haustus.

Saxifraga in vino decocta potui data.

Xyridis radix ex mulso pota.

Tragii liquor, semen, & folia in potu sumpta.

Rusci folia, radices, & baccae ebibite.

Lauri Alexandrinæ radix sex drachmarum pondere potui data.

Elichrysi coma ex vino hausta.

MATTHIOLI.

Phu decoctum epotum.

R 2

Cassia

Vesicæ.

Cassia solutiue pulpa cum dulci radice sumpta.

Nuclei pinei saccharo aut melle excepti.

Sebestena.

Zizypha.

Cochleæ cū suo putamine contrite ex passoq; diebus septē cōtinuis hauste

Leporini testiculi in cibo sumpti.

Cicerum rubeorum decoctum, paratū vt in ciceris commento.

Sonchi lacteus succus è caule manans cyathi mensura.

Amarago siue dens leonis ex aceto decoctum & potum.

Melopeponum seminum lacteus cremor additis halicacabi pastillis, aut glycyrrhizæ succo, muniēq; momento, & gummi arabici, & tragacanthæ nonnihil.

Lactucæ semen è papauerini seminis cremore haustum.

Traforū lacteus cremor è carniū iure absque sale paratum.

Glycyrrhiza.

Cum inum ex dulci vino potum.

Eryngii radix.

Filipendulę radices, aut earum decoctum epotum.

Veronica mas.

Lagopi decoctum cum maluę foliis, & dulci vino paratum.

Agri-

Agrimoniæ ex vino albo decoctū cū
saccharo haustum.

Solani halicacabi baccarum succus ex
papaveris albi cremore, aut melope-
ponum, aut cucurbitæ, aut cucume-
ris seminum, haustus.

Lupulorū flores in defessiōibus additi.

DIOSCORIDIS.

Ad vesicæ vlcera.

Myrti folia & semen pota.

Lac omne bibitum.

Cucumeris semen ex lacte, & passo
haustum.

Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus.

Vua passa alba comesa.

MATTHIOLI.

Nuclei pinei ex melle aut saccharo de-
uorati.

Mumia ex caprillo lacte pota.

Amyli semuncia cū ouo & vis passis
subseruefacta, & a balneo sumpta.

Equiseti cuiusq; decoctū, aut aqua stil-
latitia cum herbæ puluere pota.

DIOSCORIDIS.

Ad vesicæ vulnera.

Butyrum infusum.

Equiseti folia ex aqua pota.

R 3

Dio-

Vesicæ.

DIOSCORIDIS.

Ad eiiciendos vesicæ calculos.

Ossifragi avis ventriculus paulatim in
potu haustus.

Muris, qui muserta dicitur, fimus cum
mulso, & thure potus.

Vrina apri potui data.

Rumicis radicum ex vino decoctum
bibitum.

Sion crudum, coctumve haustum, vel
comestum.

Sisymbrii semen potum.

Baccharis decoctum haustum.

Apii semen vel radix vino bibita.

Fœniculum erraticum potum.

Sagapenum potui datum.

Adianti decoctum ebibitum.

Trichomanes decoctum in potu sumptum.

Vitis uiniferæ lachryma in caudice co-
creta ex vino hausta.

DIOSCORIDIS.

**Ad vesicæ calculos frangendos
educendosq;.**

Cardamomum cum corticis radicis lau-
ri drachma potum.

Bdellium potu sumptum.

Cerasi

Cerasi arboris gummi bibitum.

Aspleni decoctum haustum.

Lithospermum ex vino albo potui datum.

Saxifraga ebibita.

Graminis decoctum haustum.

Tragii semina pota.

Rusci radices, ac baccæ in potu sumptæ

Iudaicus lapis coti delimatus, ex aqua calida potus.

Lapis spongiæ potui exhibitus.

MATTHIOLI.

Balsami factitii liquores omnes poti.
Betulæ aqua quæ è perforato caudice destillauit epota.

Ericæ decoctum tum potum, tum balneum ex eo paratum.

Scorpionum exustorum cinis potioni inspersus.

Scorpionum oleum pubi illitum.

Leporis integri cinis in potione sumptus.

Murium stercus potum.

Bubuli fellis lapis in potu sumptus.

Humani stercoreis stillatitia aqua epota.

Polygoni minoris pulvis ex vino potus.

Saxifragiæ albæ ex vino decoctum bibitum, siue albicatia grana radicibus inherentia contusa, & deuorata.

Saxifragia magna drachmæ ponderis

R 4 re

Vesicæ

re ex vino.

Primulæ veris radicum decoctum haustum.

Genistæ florum decoctum epotum.

Corallium vstum bibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad vrinæ incontinentiam.

Rutæ sylvestris semen frixum, & in cibis sumptum,

Phenix in vino austero bibita.

MATTHIOLI.

Mumia ex caprillo lacte hausta.

Echini terrestris combusti cinis cum agrimonio, & interna mēbrana ventriculi gallinæ sumptus.

Tormentillæ } radices ex plantaginis
Bistortæ } aqua potæ.

MATTHIOLI.

Ad vesicæ scabiem.

Cassia solutius pulpa cū pulvere dulcis radicis deuorata.

Nuclei pinei deuorati ex melle, aut saccharo.

Amygdalinum oleum epotum.

Sesā-

Sesaminum oleum haustum.
Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

DIOSCORIDIS.

Ad cruentos mictus.

Cumini sylvestris alterius semen haustum.
Elichrysi coma in mulso pota.
Acida muria infusa.

MATTHIOLI.

Dactylorū ossa cum crudo serico combusta intus sumpta.
Plantaginis & millefolii succus potus, addita philonii perfici drachma.
Millefolii farina vncie pondere, vna cum boli armenii drachma ex lacte bubulo propinata.
Millefolii succus vncie pondere cum sirupo myrtino haustus.

Viriliū, & pudendorū.

DIOSCORIDIS.

Ad venerē ciendā stimulantāq;
Costus ex mulso bibitus.
Crocum potum.

R s Semen

Virilium, & pudendorum,

Semen lini cum melle, & pipere deuoratum.

Rapum decoctum in cibum sumptum.

Eruca largius in cibis comesta.

Eruce semen haustum.

Dracunculi maioris radix tosta, vel elixa in vino bibita.

Asphodeli radix assumpta.

Nasturtium potum vel comestum.

Porri semen potui datum.

Bulbus decoctus manducatus.

Allium cum coriandro tritum in cibis.

Vrtice semen ex passo potum.

Gallii radix assumpta.

Menthe succus epotus.

Pastinacæ erraticæ radix deuorata.

Anisum ebibitum.

Testiculi canis radix quæ vegetior est bibita, vel manducata.

Satyrii radix esitata.

Horminium in vino potum.

Gladioli superior radix ex vino sūpta.

Scincorum renes drachmæ pondere ex vino hausti.

Lac omne ebibitum.

MATTHIOLI.

Galanga pota, aut in cibis addita.

Moscus ex cicino oleo peni illtus.

Zibetum eodem modo inunctum.

Pistaceorum oleum una cum oleo finapino

Virilium, & pudendorum. 198

napino, benzuino, & mosco genitalibus illitum.

Fraxini semen cum pistaceis, & nucibus pincis deuoratum addito saccharo.

Nux Indica.

Myristicę nucis oleum genitalibus illitum.

Sepiæ piscis cum nucibus, & allio paratę, & deuoratę.

Genitale cerui in puluerem tritū & ex ouo sumptum.

Caryophylli quatuor drachmarum pōdere ex lacte epoti.

Phasioli in lacte bubulo decocti, & pipere longo, & galanga aspersi.

Dauci semen.

Malainfana elixa, & deinde in butyro frixa, & cum lōgo pipere deuorata.

Vitis nigræ radix sub feruentibus cineribus decocta, & cum pipere & sale deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad augendam genituram.

Coriandrum ebibitum.

Omnia medicamenta quę venerem excitant, pręter ea quę in calore & siccitate excellunt.

R 6 Mat-

Virilium, & pudendorum.

MATTHIOLI.

Sesaminum oleum potum aut in cibis
additum.

Cephiliones cum pipere, & sale.

Nuclei pinei.

Pistacia.

Nux Indica.

Gallinaceorū testes frequenter deuorati.

Oryza in bubulo lacte decocta addito
croco, & cinnamomo.

Cicera cibo data.

Phasioli lacte bubulo decocti lōgoq; pi
pere, galanga, & saccharo aspersi.

Rapum in lacte decoctum.

Napi ex pinguium carniū iure deco-
cti, & addito pipere deuorati.

Sifer coctum, & cū pipere deuoratum.

Asparagi in cibo sumpti.

Traforum cremor ex carniū iure pa-
ratus & hauſtus.

Caryophylli quatuor drachmarum pō
dere ex lacte epoti.

Cinaræ echinus ex pipere deuoratus.

Ferulę corculum sub cineribus decoctū
cum sale, & pipere deuoratum.

Malainsana cocta, & in butyro frixa, &
cum pipere deuorata.

Vitis nigrę radix sub cineribus feruen-
tibus probe decocta, & cum pipere
deuorata.

Dio-

Virilium, & pudendorum. 199

DIOSCORIDIS.

Ad venerem inhibendam, & nocturnas pollutiones.

Viticis semen potum, & folia testibus adhibita.

Portulaca manducata, pudendisq; applicata.

Lactucæ semen potum nocturnas venere imaginatio nes arceat.

Anethi feminis, & comæ decoctum assidue potum.

Ruta in cibo, potuq; sumpta.

Canini testiculi herba languida, flaccidaq; radix potui data.

Cannabis sativæ semen in cibum largius sumptum.

Gladioli inferior radix epota.

Cicuta cum sua coma trita, & genitalibus illita, & est potentissimum medicamentum.

MATTHIOLI.

Caphura renibus, & testibus illita.

Vinum in quo nullus piscis fuerit immersus, epotum.

Lactucæ succus cum caphuræ momento testibus illitus.

Lactucæ

Virilium, & pudendorum.

**Lactucę semen ex papauerini seminis
cremore haustum.**

Sisymbrii succus testibus adhibitus.

Cannabis satiuę semē largius sumptū.

DIOSCORIDIS.

Ad seminis profluuium.

Nymphę radix bibita.

Iridis Illyricę radix ex aceto pota.

MATTHIOLI.

**Hyoscyaminum oleum renibus, & te-
stibus illitum.**

**Thus drachmę pōdere cum aqua nym-
phę ebibitum.**

**Larigna aut terebinthina refina ex a-
qua plantaginis lota additis succi-
no, vel aspleno, & caphurę momēto**

**Caphura cū succino ex aqua nymphę
hausta exteriusque illita.**

**Rosarum baccarum semen & lanugo in
vino austero epota.**

Rosarum crocei flosculi capillive poti.

**Saccharum ē punice floribus paratum
ex vino austero sumptum.**

Cichorii succus ebibitus.

**Menthastri succus potus, & testibus il-
litus.**

**Aspleni aurigo drachmę pōdere cum
albi**

Virilium, & pudendorum. 200

albi succini semidrachma ex portulacæ aut plantaginis succo epota.

Lithospermi utriusq; semē sesquidrachmæ pondere addita pari quantitate aspleni, & succini scrupulis duobus ex succo portulacæ pluribus diebus haustum.

Millefolium cui candida inest umbella vnâ cum floribus tustum, & cum sua ipsius aqua stillatitia, aut caprino lacte potum, uel cum corallio, succino, & eboris scobe propinatum.

Vnguentū ex rosaceo in mortario plumbeo paratum.

Diphryges illitū ex rosaceo unguento.
Corallium epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad pudendorum ulcera.

Oesypus illitus.

Aloe illita, & in puluerem imposita.

Polygoni succus in uino decoctus cum melle adhibitus.

Alumen quocunque modo adhibendum.

Flos salis inspersus.

MATTHIOLI.

Mumia ex caprillo lacte epota.

Malicorium cum marina spongia exiccatum,

Virilium, & pudendorum .

catum, additis aloë, & alumine.
Cucurbitæ exustę cinis.
Camarorum lapilli cum tartaro tri-
ti, & aspersi.
Abrotanum vstum in puluerē admoſū.
Floris solis decoctum ſotum.
Anethum vstum & aspersum.
Solidaginis medię folia, aut eorum ſuc-
cus adhibitus.

Sanicula	{	tum in puluerem
Auricula vrfi		inſperſa tū in lo-
Piloſella		tionibus decocta
Potentilla		& ſota.
Pulmonaria altera		

DIOSCORIDIS.

Ad teſtium inflammationes, &
tumores .

Cicer cum eruo decoctum appoſitum.
Faba in vido decocta cataplaſmatis
adhibita.
Senecionis folia cum floribus empla-
ſtri modo impoſita.
Aſphodeli radix & folia illita.
Cimolia illita.
Melilotum emplaſtri modo adhibiti.
Geodes lapis illitus.
Ruta illita cum lauri foliis.
Sal cum origano, & fermento illitum.
Cuminum cum vua paſſa, fabæq; lome-
to,

Virilium, & pudendorum. 201

to, aut cera impositum.

Coriandrum cum vua passa, & melle illitum.

Lilii concisa radix cum apollinari herba & triticea farina cataplasmatia modo adhibita.

Samia terra ex rosaceo, & aqua illita.

Hyoscyami semen tritum ex vino impositum.

MATTHIOLI.

Iridis Illyricæ farina cum aliis quibusdam medicamentis, vt in commento de Iride diximus.

Hyoscyaminum oleum illitum.

Fenugræci farina ex hydromelite decocta, & addita axungia imposita.

Cicerum farina, aut fabarum, aut crui ex aqua decocta & illita.

Bellidis folia tusa & illita.

Lentis palustris stillatitia aqua illita.

Vnguentum ex mortario, & pistillo plumbeo cum rosaceo paratum & illitum

DIOSCORIDIS.

Ad genitalium pruritus.

Saluæ decoctum ex vino fotum.

Resinæ omnes, præsertim de rebinthina illitæ.

Dio

Virilium, & pudendorum.

DIOSCORIDIS.

Ad induratos testes.

Irionis semen impositum.

MATTHIOLI.

Irinum oleum illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad eos qui natura præputio
carent.

Thapsiæ succus circumlinitus tumorem
enim excitat qui deinde pinguium fo-
tu emollitus præputii iacturam re-
sarcit.

Mel triginta diebus a balneo illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad genitalium phagædenas ex-
ulcerationes.

Taurinum fel ex melle illitum.

Labruscæ flos tritus cum melle, croco,
myrrha, & rosaceo impositus.

Mat-

MATTHIOLI.

Pilosella

Potentilla

Solidago minor,
& media

Sanicula

Pyrola

Auricula vrsi

} quouis modo usur-
pata in topicis au-
xiliis.

DIOSCORIDIS.

Ad genitalium thymos.

Smaridis salsae crematum caput illi-
tum.

Fel sylvestris caprae inunctum.

Finum ouillum ex aceto impositum.

Thymus emplastri modo adhibitus.

Thymbra apposita.

Ruta cum pipere, nitroq; confricata.

Tithymali caraciz lac inunctum.

Chamaejasmes rami triti, & impositi.

Mercurialis succus illitus.

Heliotropii semen illitum.

Oleum e calcantho illitum.

Oleum nostrum de antimonio, cu cau-
tela adhibitum.

Vteri

Vteri.

Vteri.

DIOSCORIDIS.

Ad vteri strangulatus.

Mei radices tritæ & cum melle in eclegmate deuoratz.

Iuniperi baccæ pote.

Vngues odorati suffiti.

Cimices lectularii naribus appositi.

Bitumē olfactum, suffitum, & admotū.

Phocę coagulum potum.

Vrina cum ligustrino oleo feruesfacta infusa.

Plantaginis succus haustus.

Sinapi tritum naribus illitum.

Agaricum drachmę pondere sumptum
Ruta trita melle excepta pudendis & se
di illita.

Panacis herculei semen cum vino bibi
tum.

Seselis Massiliensis radix & semen epo
tum.

Peucedanum olfactum.

Sagapenum naribus adhibitum.

Trifolii bituminosi semē, & folia hausta

Pœoniæ nigri seminis grana xv. epota.

Alismatis radix pota.

Betoricę folia drachmę pondere in a-
qua dulci ebibita.

Gaga-

Gagates lapis suffitus.

MATHIOLI.

Zibetum cauernulis ymbilici illitum.

Iuglandium iuli in puluerem contriti
& ex vino albo epoti.

Castoreum incensum naribus admotū.

Castoreum semioboli pondere cum pa
ri assa fetida in catapotiiis deuoratiū.

Imperatoriae radix ex vino.

Sagapenum cum olfactum, tum catapo
tiiis insumptum.

Alliarię semen suppositum.

Tussilaginis maioris radix duarum dra
chmarum pondere ex mero pota.

Hippoglossi radicum aut foliorum pul
uis cochlearis mensura ex uino uel
iure haustus.

Antirrhini flores, folia, & semen cū ro
faceo, & melle umbilico adhibita.

Vitis albæ radix ex uino hausta.

Quinta essentia nostra in commēto de
vino descripta hausta, & in faciem
proiecta.

DIOSCORIDIS.

Ad menses ducendos.

Iris illirica ex uino sumpta, & fotu ad
hibita.

Mei

Vteri.

Mei radicum decoctum defessionibus
adhibitum.

Acori decoctum in fessionibus.

Cyperi radicum decoctum fotu adhi-
bitum.

Asari radices senis drachmis ex aqua
ebibitæ.

Phu decoctum potui datum.

Cassia odorata in potu sumpta

Cinnamomum haustum, vel myrrha
suppositum.

Amomum pessis aut fessionibus addi-
tum.

Costus ebibitus.

Odoratus iuncus potui datus.

Calamus odoratus haustus, & fotu sup-
positus.

Cancamum ex aqua mulla potum.

Helenii radicum decoctum haustum.

Myrrha cum absinthio, lupinorum cre-
more, uel rutæ succo admota.

Styrax pota, & apposita.

Bitumen ex vino, & castoreo bibitum.

Cedrides ex polline piperis haustæ.

Lauri foliorum decoctum fotu admo-
tum.

Phyllireæ folia potui data.

Viticis semen drachmæ pondere ex ui-
no haustum.

Oleæ Aethyopicæ, ac nostratis lachry-
ma epota.

Amygdalæ amaræ deuoratæ.

Ficul

Ficulaeum lac cum detrita nuce græca
ebibitum.

Cochleæ terrestres cum suo operimen-
to tusæ & femineis locis admotæ.

Castoreum drachmarum duarum pon-
dere haustum.

Cepæ succus pudendis illitus.

Oesypum in lana suppositum.

Anserinus, & gallinaceus adeps illitus.

Caprarum montanarum fimus ex odo-
ramento aliquo potum.

Scandulaceum bibitum.

Seminis lini decoctum fotu admotum.

Lupinorum decoctum cum myrrha &
melle suppositum.

Raphanus in cibum sumptus uel eius
succus haustus.

Asphodeli radix potui data.

Eryngii decoctum haustum.

Brassicæ succus ex loliacea farina sup-
positus, uel eiusdem decoctum ebibitum.

Sium pro olere sumptum.

Crithmum uel eius decoctum in potu
sumptum.

Cétaurii maioris radix bibita, uel eius-
dem succus suppositus.

Condryllæ gummi ex myrrha subditum.

Lactucæ sylvestris lacteus succus epotus.

Porrum domesticum, & sylvestre deuo-
ratum.

Alii comarum decoctum in desessio-
nibus additum.

Cycla-

Vteri.

Cyclaminus tum pota tum supposita.
Abrotani semen ex aqua haustum.
Capparidis cortex, & semē potui datum.
Anemones radix ex vellere apposita.
Hederę corymbi triti subditi.
Pulegium ebibitum.
Agaricum cum oximelle drachmę pon-
dere haustum.
Origanum epotum.
Absinthium haustum, uel ex melle sub-
ditum.
Tragoriganum potui datum.
Saluę decoctum ebibitum.
Animi ex vino haustum.
Thymi, Tymbręq; decoctum in potu
sumptum.
Serpillum potui datum.
Smyrni semē ebibitum.
Amaraci decoctum haustum uel puden-
dis illitum.
Baccharis radice decoctum epotum.
Ruta utraque tum pota, tum subdita.
Panaces herculeum ex vino haustum.
Ligustici radix & semē potum, & illi-
tum.
Pastinacę erraticę semē epotum.
Seselis Massiliensis radix, & semē hau-
stum.
Tordilium potui datum.
Feniculum ex uino sumptum.
Sison bibitum.
Libanotis radices epotę.

Peucedani

Peucedani succus haustus.

Petroselinum potui datum.

Daucum haustum.

Hammoniacum in potu sumptum.

Nigella pluribus diebus hausta.

Sagapenum potum.

Laserpitii liquor cum pipere, & myrrha
bibitus.

Galbanum suppositum, & suffitum.

Clinopodium haustum.

Chamedryos decoctum potui datum.

Lilii cremata radix ex rosaceo subdita.

Melissophylli decoctum in defensionibus.

Trifolii semen, & folia pota.

Polii utriusque decoctum haustum.

Scordii succus bibitus vel herba ipsa
subdita.

Arthemise decoctum sessionibus additum

Myrrhis bibita.

Conyzae folia, & flores epoti.

Hemerocallis radix cum vellere subdita.

Rusci folia & baccae ex uino sumpta.

Leucorii decoctum fotum, & sessionibus
adhibitum.

Eiusdem semen duarum drachmarum
pondere ex uino sumptum.

Anthemidis decoctum, tum potum tum
fotu admotum.

Paeoniae radix amygdalae quantitate hau

Rubiae radix supposita. (sta.

Adianti decoctum ebibitum.

Trichomanes potui data.

S

Ana-

Vteri.

Anagyris tria folia ex passo sumpta.

Hypericum tam sumptum, quàm subditum.

Coris semen potui datum.

Vrticæ utriusq; folia trita, & cum myrrha subdita.

Betonice folia drachmæ pondere cum vino epota.

Medii semen haustum.

Chamædaphnes foliorum succus ex uino bibitus.

Gladioli superior radix supposita.

Tragii liquor bibitus, quinetiam semē & folia pota drachmæ pondere.

Chrysocome ex mellicrato sumpta.

Elaterium in pello subditum.

Helichrysi coma ex mulso potui data.

Mandragoræ liquor semioboli pondere subditus.

Eiusdem semen ebibitum.

Daphnoides hausta.

Veratrum { Nigrum } suppositum.
 { Album }

Vitis nigre tenellæ viticulæ in cibum sumptæ decoctæ olerum uel asparagorum more.

Vinum { Scillinum } haustum.
 { Absinthites }
 { Hyssopites }

MATTHIOLI.

Nardus Italica, & Lauēdula cum in portioni-

tionibus, tum in fomentis.

Afarinæ decoctum potum.

Phu quoquomodo sumptum.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Calamus odoratus vulgaris.

Crocum ex iure sumptum.

Iuniperinarū baccarū decoctum bibitū.

Sabinæ decoctum haustum.

Arundinis radix.

Cicerū rubrorū nigrorumve ius potum

Lupini decoctum cum myrrha, & melle
impositum.

Sinapi in potione sumptum.

Dracunculi radix supposita.

Ari semen drachmarum duarum pon-
dere haustum.

Gentiana quouis modo sumpta.

Aristolochia longa fotu adhibita.

Centaurii magni radix ebibita.

Centaurii minoris succus suppositus.

Cardui benedicti decoctum tam hau-
stum, quàm fotu adhibitum.

Hyssopum } quoquomodo vsurpatū.
Pulegium }

Dictamnus albus tum suppositus, tum
cum pulegio suffitus, tū ex mero po-
tus duarum drachmarum pondere.

Gattaria tam pota, quàm in deflessioni-
bus addita.

Calamintha tum pota, tum supposita.

Imperatoria quouis modo vsurpata.

Vincetoxici radi. in deflessionib⁹ addita

S 2 Arthe

Vteri.

Arthemisię recentia folia cum myrrha
& oleo irino trita, & apposita.

Botrys suffitu vsurpata.

Matricaria quoquo modo adhibita.

Lupuli semen tritum, & potui datum.

Quinta essentia nostra frequenter po-
ta fescuncię pondere.

MATTHIOLI.

Ad alba uteri profluuia.

Hyoscyaminum oleum pubi & lumbis
illitum, & suppositum cum lana.

Caphura cū succino, & aqua nymphet
hausta, aut pubi, aut imo uetri illita.

Flosculi medii rosarum cum suis capil-
lis accepti.

Quernorum foliorum tenellorum stil-
latitia aqua hausta.

Castanearum interior membrana ru-
bens cum eboris scobe, & nymphet
albę stillatitia aqua epota.

Saccharū ē floribus punice arboris pa-
ratum, deuoratum.

Dactylorum ossa in puluerem contrita
& cum sanguinis draconis lachryma
& aqua portulacę ebibita.

Ossicula mali punici acidi cum thuris
polline ex stillatitia rosarum aqua.

Auellanarum putamina ex uino auste-
ro hausta.

Ebur

Ebur in tenuissimum puluerem tritum
& ex cremore seminis lactuce potū.
quod prius in aqua, in qua ferrū can-
dens extinctū fuerit, sit maceratum.

Milii Indici panicularum flores ex uino
austero epoti.

Ophioglossum ex quernorum foliorū
aqua potum.

Saluæ aridæ folia suffita.

Rosmarinū quotidie, idq; diutius sum-
Lunaria minor ebibita.

Alchimillæ stellariæ appellatę stillatitia
aqua pota, aut in vterū infusa, aut ei⁹
decoctum de sessionibus usarpatum.

Caryophyllatę radices haustæ.

Potētillę siccæ farina ex sua ipsius aqua
stillatitia additis corallio & eboris
scobe, epota.

Solbastrella, & eius semen.

Pulmonaria altera.

Amaranti purpureus flos.

Millefolium recens contusum, & suppo-
situm, pubiq; illitum, uel cum coral-
lio, succino, & eboris ramentis ex sui
ipsius aqua stillatitia epotum.

Malorū punicorū acidorū uinū potum.

Cymbalaria herba ī acetariis deuorata

DIOSCORIDIS.

Ad menses cohibendos.

Nardus Indica.

S 3 Mus.

Vteri.

Musculus arboribus innascens in sessione
libus additus.

Thuris cortex in passo subditus.

Oxyacanthæ bacce in potu uel in cibo
sumptæ.

Hypocistis tum pota, tum indita.

Oleæ syluestris succus pudēdis admot⁹.

Rhois semen potū alba profluvia sistit.

Palmulæ immature manducatæ.

Palmularum inuolucrum potui datum.

Punicorum acinorum nuclei siccati in
sole, & obsoniis inspersi, concoctive
sumpti.

Gallæ in decoctis additæ ad infusiones
parate.

Glandium tenuior cortex tum bibitus,
tum in passo suppositus.

Myrti semen fotu subditum, uel defes-
sionibus additum.

Cotoneorum malorum decoctum fotu
adhibitum.

Acacia tum pota, tum indita.

Lycium subditum.

Loti lignum decoctum haustum, aut fo-
tu admotum.

Lentisci folia tam epota, quàm subdita.

Coagulū	{	Leporinum	}	potum, ac et subditū.
		Hædinum		
		Agninum		
		Ceruinum		
		Hinnulinum		
	{	Vitulinum	}	

Cer.

Ceruinum cornu vstum lotū ex adstrin-
stringenti liquore aliquo hauſtum.

Caprarum montanarum ſimum ſiccātū,
tritumve cū thure in lana ſuppoſitū.

Rumicis radices ſubditæ.

Plantago tum bibita, tū ſotu adhibita.

Barbæ hircinæ ſuccus ex uino ſumptus.
vel ſuppoſitus.

Porri comæ decoctum ex aqua marina
& aceto in deſeſſionibus.

Rubi ramorum decoctum epotum.

Arabię ſpinæ radix manducata.

Phenix ex vino aſtero ebibita.

Papaueris nigri ſemen hauſtum.

Achillea ſubdita.

Idea radix epota.

Equiſeti ſolia bibita.

Mentha ſotu ſubdita.

Iunci marini ſemen frixum, & ex uino
diluto epotum.

Ocimaſtrum potum ex uino.

Aniſum hauſtum præſertim ad alba pro-
fluia.

Cuminum ex aceto impoſitum.

Nympheę flore luteo radix, & ſemen ex
vino nigro pota.

Pæonię ſeminis grana xii. ex uino aſte-
ro ſumpta.

Lyſimachię ſuccus ſubditus.

Moly herba cum loliacea farina indita.

Polygoni ſuccus ſuppoſitus.

Symphyti petrei ex vino decoctū potū.

S 4 Cly

Vteri.

Clymeni succus haustus.

Limonii semen acetabuli pondere ex
vino bibitum.

Medii radix elixa & ex melle in ecleg-
mate sumpta.

Tragi ricini numero x. ex vino hausti.

Hyoscyami semen oboli pōdere in mul-
sa aqua potum.

Solani hortēsis succus in lana inditus.
Mandragoræ semen cum sulphure & vi-
no sumptum.

Semperuium maius in vellere subditū
Vuarum vinaceorum decoctum haustū,
& foru appositum.

Labruscæ flos pessulo inditus.

Omphacium inditum.

Rubigo ferri subdita.

Chalcitis cum succo porri indita.

Vini fex imo ventris ac pudendis illita

Hematites lapis ex vino haustus.

Morochthus lapis in vellere inditus.

Ostracites lapis drachmę pondere ex
vino sumptus.

Samia terra cum syluestris punicę flori-
bus hausta.

MATTHIOLI.

Hyoscyaminum oleum pubi, & lumbis
illitum, aut suppositum.

Rofaceum vnguentum.

Mastiches.

Iuniperinum gummi.

Crespini

Crespini baccharum vinum.

Hypocistis sepe ex vino austero pota.

Rolacearum baccharum semen, & lanugo ex vino austero epotum.

Querna folia, glandes, & gallæ.

Suberis cortex tritus, & ex aqua calida potus.

Saccharum ex mali punicæ floribus paratum, & ex vino austero potum.

Myrteum condimentum pro intinctu vsurpatum.

Cydoniorum vinū, miua, oleū cōfectio.

Mespilorum decoctum, & mespila ipsa deuorata.

Corna saccharo condita sepe esitata.

Virgæ sanguinæ bacce.

Pruni sylvestris decoctū in defensionib⁹

Leporinum stercus suppositum.

Milii indici panicularum flores ex vino rubro.

Portulaca quoquo modo sumpta.

Bursa pastoris tum deuorata, tum in defensionibus addita.

Perficaria maculosa in defensionibus ac etiam intus sumpta.

Chelidonium maius mammis adhibitū.

Salvia arida suffita.

Flos solis cum radicibus contritus, & ex aqua plantaginis sumptus.

Lunaria minor ex vino punicorū pota

Clematis prima femoribus adalligata.

Bistortę, & tormentillæ radicū decoctū

S s in

Vteri.

in defefsionibus vſurpatum.

Pilofella tam in corpus ſumpta, quàm
exterius uſurpata.

Caryophyllatę radices potę.

Pyrola

Potentilla

Sanicula

Auricula vrfi

} quomodolibet uſur-
pata.

Fragarię folia, & radices.

Solbaſtrella, ſeu ſanguiforba.

Pulmonaria altera.

Amaranti purpurei flos potus.

Millefolium recens tuſum, & ſuppoſitũ
pubiꝑ; illitum.

Punicorũ malorũ acidorũ vinũ ebibitũ.

Corallium tam potũ quàm ſuſpenſum.

DIOSCORIDIS.

Ad ſecundas pellendas.

Caſtoreum drachmarum duarum pon-
dere cum pulegio bibitum.

Cyclamini alterius ſemen hauſtum.

Allii comę decoctum fotu impoſitum.

Aristolochia cũ myrrha & pipere ſum-
pta, uel peſſulo indita.

Pulegium bibitum.

Thymi decoctum potui datum.

Thymbraę decoctum hauſtum.

Apii ſemen in potu ſumptum.

Marrubii decoctum ebibitum.

Stachios decoctum potui datum.

Arthe

Arthemisię decoctum in defensionibus
adhibitum.

Circeę radix quatuor librarum ponde
re contusa, & in septem dulcis vini
hominis macerata per noctē diemq;
tribus diebus epota.

Oenāthes semen,caulis,& folia ex mul
so bibita.

Leucoii semen drachmarum duarū pon
dere ex vino haustum.

Rubię radix supposita.

Anagyris trita folia ex passio pota.

Chamepytios ex melle subdita.

Chrysocome ex aqua mulsa hausta.

Trichomanes epota.

Bryonia supposita.

Myrrha ebibita.

Peucedani succus haustus.

Bunii semen epotum.

Smyrni semē potui datum.

Adianti decoctum ebibitum.

MATTHIOLI.

Nardus Italica, aut Lavendula pota.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua
ebibita.

Balsamum factitium haustum.

Arī semen duabus drachmis potum.

Dictamni albi radices cum pulegio fo
tu adhibite, aut ex meraco potę dua
rum drachmarum pondere.

Liliorum alborum stillatitia aqua pota

S 6 Arthe

Vteri.

Arthemisia recens cum myrrha, & iri-
no oleo trita, & supposita.

DIOSCORIDIS.

Ad expellendum foetum.

Castoreum duarum drachmarum pon-
dere cum pulegio sumptum.

Caniculę lac primę feturę haustū, mor-
tuum pellit.

Oesypus in lana suppositus.

Caprarum montanarum finum cū ali-
quo odorem potum.

Vulturis finum suffitum.

Ciceris decoctum bibitum.

Lupinorum decoctum cum myrrha &
melle fotu adhibitum.

Sium pro olere in cibo sumptum.

Dracunculi maioris decoctum infusum

Piper haustum.

Cyclamini radix femori adalligata.

Hederę foliorum pediculi melle illiti,
subditi.

Gentianę radix subdita.

Centaurii maioris radix indita.

Centaurii minoris succus infusus.

Pulegium epotum.

Distamnum bibitum, inditum, incēsūq;

Thimi decoctum haustum.

Thymbrę decoctum potui datum.

Baccharis recētissima radix supposita.

Panacis Herculei acunimata radix idita
Pasti-

astinacę erraticę radix subdita.
Melselis Massilięsis radix pota, quinetiā
& semen.
albanum cum myrrha & vino potum
suffitumq;
linopodium potum.
Chamedryos decoctum haustum.
cordii succus drachmę pōdere sūptus
Arthemisię decoctū in fessioib⁹ additū
Conyzę folia, & flores bibita.
leucoii semen duarum drachmarum
pondere ex vino potum.
Onosmatis folia ex vino hausta.
Rubię radix supposita.
Anagyris trita folia cū passō pota quin
& adalligata, sed statim post partum
auferantur.
Anchusę radix apposita.
Mandragorę liquor infusus.
Myrrhis epota.
Heliotropoii folia indita.
Sulphuris fumus in vterum permeans.
Dauci semen haustum.
Ammoniacum insumptum.
Perclymeni semen drachmę pondere
in vino potum.
Lauri alexandrinę radix sex drachma
rum pondere ex dulci vino hausta.
Alumen subditum.
Iaspis lapis femori adalligatus.
Aetites lapis p^o amuleto femori suspēs⁹
Samius lapis adalligatus.

Mat.

Vteri.

MATTHIOLI.

Balsami factitii liquores omnes hausti.

Sabina epota.

Dictamni albi radices cum pulegio fortu adhibitæ, aut ex meraco drachmarum duarum pondere haustæ.

Calamintha seu pota, siue admota.

Arthemisię radix pota.

Botryos suffitus per muliebria exceptus.

Chamepytys altera recens in aceto decocta, & epota.

Chrysocolla mineralis ex sabinæ succo drachmæ pondere pota.

MATTHIOLI.

Ad alleviationem partus.

Iuniperinę, & laurinę baccę cum cinna-
momo in turturis ventre assatę, & al-
ternis diebus deuoratę.

Lauri baccę septem deuoratę.

Cochleæ ante tempus pariendi diebus
aliquot comestæ.

Malua cum radice ad lentorem vsque
decocta, & potui data.

Eiusdem succus epotus.

Cardiacæ herbæ siccæ farina cochlea-
ris mensura ex vino albo pota.

Mat-

MATTHIOLI.

Ad instantem pariendi difficultatem.

Suffitus ex cancris aridis in vuluam receptus.

Lingua chamæleonis adalligata.

Raphani cortex cum aliis nonnullis suppositus. lege raphani commentariū.

Dictamnū cretense in potu propinatum cum suo ipsius decocto.

Dictamni albi radices cū pulegio suffitus, aut ex merato potus duarū drachmarum pondere.

Liliorum alborum stillatitia aqua additis croco, & cassia odorata.

Lithospermi minoris seminis drachmę duæ lacte muliebri haustæ.

Cardiaca herba in puluerē trita pota ex vino albo calido cochlearis mēsurā.

Chrysocolla fossitia drachmæ pondere pota. Atqui dari non debet nisi in magno discrimine vitæ.

Argentum viuum semisrupuli pondere deuoratum.

DIOSCORIDIS.

Ad conceptionem inhibendam.

Salicis folia per se, & cum aqua sūpta.

Leporinum coagulum post triduum a purga-

Vteri.

¶ purgatione menstrua sumptum.
Sanguis menstruus illitus.
Brassicę flores a puerpereo in pessulo
subditi.

Asparagi radix suspensa.

Piper a coitu illico subditum.

Hederę corymbi drachmę pondere a
purgatione hausti.

Hedysarum ante coitum feminis sub-
ditum.

Cedria virili membro illita.

Oltracites lapis sicilici pondere .4. dic-
bus a purgatione potus.

Asplenū (vt quidā credunt) silente luna
nocturno tempore decerptum cū mu-
li liene ventri adalligatum.

Periclymeni femina, & folia diebus tri-
ginta sex pota.

Epimedii folia trita illico a purgatione
quinque diebus continuis bibita.

Gladioli inferior radix hausta.

Filicis femine radix potui data.

Heliotropium adalligatum.

Rubigo ferri epota.

Mentha ante coitum vuluę admota.

MATTHIOLI.

Leporinum stercus suspensum.

Vinum in quo viuus mullus piscis im-
mersus fuerit epotum.

Mulę vngularum cinis haustus.

Dio.

DIOSCOIDIS.

Ad conceptionem iuuandam.

Leporinum coagulum cum butyro subditum statim a mēsum purgatione.

Loliacea farina cum myrrha, thure, bitumine, & croco suffita.

Pastinacæ erraticæ semen haustum.

MATTHIOLI.

Saluix succus hemina mensura addito salis modico quaternis diebus pot⁹.

Cuminum suppositum.

Imperatorie radix ex vino epota.

Alchimillæ seu stellarix puluis ex vino aut iure quindecim, aut viginti dieb⁹ continuis potus cochlearis mēsurā.

Oleum e momordica vteri osculo inūctum ante veneris congressum.

Oleum e lapide gagate illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad fætum mortuum educendū.

Dictamnū tū potum tum subditum.

Saluix decoctum bibitum.

Galbanum cum myrrha ex vino potum

Marrubii decoctum haustum.

Tussilaginis decoctum potui datum.

Mat-

Vteri.

MATTHIOLI.

Balsami factitii liquores omnes hausti.

Centaurii magni radix.

Centaurii minoris succus suppositus.

Pulegii decoctum epotum.

Calamintha tam pota, quàm supposita.

Botrys cocta ac suffita.

Chamæpytis ex aceto decoctum potû.

Chrysocolla fofsitia drachmæ ponde-
re ex succo fabinæ pota, sed vbi tantû
vitæ periculum adfit.

DIOSCORIDIS.

Ad prohibendum abortum.

Aetites lapis sinistro bracchio adalli-
gatus.

Sanius lapis pro amuleto suspensus.

MATTHIOLI.

Dactyli recentes cum infectorii cocci
puluere deuorati.

Cydonia mala frequenter esitata.

Salvia sepe deuorata, vel saccharum ex
eius floribus paratum.

Bistortæ vel Tormentillæ radices epo-
tæ & uentri, lumbisq; ex aceto illitæ.

Cocrum infectorium quotidie in ouo
forbili propinatû thure modico ad-
dito,

Vteri.

214

dito, aut mastiche. puluerem præstantissimum ad hoc habes lib. 4. cap. 43
Iaspis lapis gestatus.

DIOSCORIDIS.

Ad puerperia iuuanda.

Dictamni radix bibita.
Baccharis radicis decoctum fotu adhibitum.
Foeniculum erraticum potum.
Peucedani succus haustus.
Peoniae siccata radix potui data.
Altheæ decoctum infusum.

MATTHIOLI.

Balsami factitii liquores omnes epoti.
Dictamni albi radices suppositæ, aut cū
pulegio suffitæ, quin etiam ex mera-
co potè duarum drachmarū pōdere.
Menthastrum haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad prægnantium malacias.

Vitis vniferæ foliorum, capreolorumq;
succus epotus.

DIOSCORIDIS.

Ad vteri inflammationes.

Nardi Indicæ decoctum fotu adhibitū.
Iunci

Vteri.

Iunci odorati decoctum in defefsionibus adhibitum.

Viticis foliorum, & seminum decoctū fotu appositum.

Butyrum recens illitum.

Sonchi succus inunctus.

Agaricum drachmæ pondere cum oxy melite epotum.

Pulegii decoctum fotu subditum.

Melilotus cum passo emplastri modo impositus.

Panacis Herculei lachryma ex melle indita.

Arthemisię decoctum in defefsionibus additum.

Leucorii decoctum fotu admotum.

Anthyllidis radix ex rosaceo, lacteque indita.

Parthenii decoctum in defefsionibus adhibitum.

Althęa decocta subinde anserino, suilove adipe, aut resina terebinthina subacta subdita.

MATTHIOLI.

Hyoscyaminum oleum illitum.

Consolidę Regalis flores epoti.

Oleum de momordica illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad exulceratos locos.

Aspalathi ex vino decoctum infusum.

Lac

Lac in quo igniti calculi extincti fuerint infusum.

Oesypum inditum, explet. n. & emollit.

Fenogræci folia ex aceto illita.

Asclepiadis folia adhibita.

MATTHIOLI.

Malicorium cum marina spongia exiccatum additis aloë, & alumine.

Solidaginis mediæ, & minoris farina ispersa, aut succus illitus, aut infusus.

Sanicula

Auricula vrsi

Pilosella

Pyrola

Potentilla

} adhibita.

Oleum è momordica syphone iniectum.

DIOSCORIDIS.

Ad induratos locos.

Myrrha cum absinthio lupinorum cremore vel ruta admota.

Styrax illita.

Anserinus, & gallinaceus adeps illitus

Bdellium inunctum.

Maluæ decoctum inditum.

Ladanum pessis immissum.

Panaces Herculeum ex melle inditum.

Ebuli, sambuci; decoctum fotu admotum.

Par-

Vteri.

Parthenii decoctum in defefsionibus.
Fenigræci ex aqua expreffus fuccus cum
anferino adipe in pefculo fubditus.
Lilii radix admota.
Ageratum fuffitum.

MATTHIOLI.

Amygdalinum oleum.
Sefaminum oleum.
Oleum ex ouorum vitellis.
Ceruina, & vitulina medulla.
Lini feminis oleum.
Oleum liliorum alborum.
Lupuli florum decoctum in defefsionibus
vfurpatum.

DIOSCORIDIS.

Ad vteri inflationes.

Rutę ex oleo decoctū clyftere perfufū.
Geranium, & eius radix drachmę pon-
dere pota.

MATTHIOLI.

Galanga.
Cubebę.
Cinnamomi stillatitia aqua.
Balsami factitii liquores, & oleum in
portionibus.
Cnicinum oleum.

Lau-

Laurinum oleum.

Scorpionum oleum in potu datum, aut
exterius illitum.

Castoreum cū pipere albo, & mellicra-
to epotum.

Milium cuni sale impositum.

Sisymbrium in calenti tegula calefactū
& odorato meraco aspersum ventri-
que applicatum.

Dictamni albi radices duarum drach-
marum pondere ex meraco haustę.

Mentha gręca in placentis addita aut
eius folia tenui pulicula illita, & de-
inde in oleo aut butyro frixa, & de-
uorata.

Carum quouis modo vsurpatum.

Imperatorię radix hausta ex meraco.

Matricaria quoquo modo adhibita.

MATTHIOLI.

Ad molam expellendam.

Balsamum factitium epotum.

Dictamni albi radices suppositę aut cū
pulegio suffitę, aut ex meraco duarū
drachmarum pondere bibitę.

MATTHIOLI.

Ad vteri frigiditates.

Nardus Italica.

Lauendula.

Cubebę

Vteri.

Cubebæ.

Cinnamomi stillatitia aqua.

Balsamum factitium, & eius liquores omnes.

Nux myristica.

Scorpionum oleum in vini potione sumptum & forinsecus applicatum.

Dictamni albi radices, aut cum pulegio suffitæ, aut ex vino meraco potæ duarum drachmarum pondere.

Méthæ græca tam fotu, quàm potu vsurpata.

Carum quouis modo sumptum.

Imperatoria radix ex vino epota.

Matricaria quomodolibet, vsurpata.

MATTHIOLI.

Ad vuluam cohibendam.

Nucum siue viridium conorū pinei stillatitia aqua cum linteolis in ea madefactis admota.

MATTHIOLI.

Ad delectandas fœminas in coitu.

Fel	{	Auratæ	}	coli virili inuictus
		Lucii		
		Perdicis		
		Gallinacei		

Zibetum peni illitum.

Dio-

DIOSCOIDIS.

Ad procidentem vterum.

Casia fotu, vel suffitu adhibita.

Myrti baccarum succus in defefsionibus

Cotoneorum malorum decoctum fotu
adhibitum.

Gallarum decoctum in fefsionibus adhi
bitum.

Acacia subdita.

Hypocistis subdita.

Vrticæ vtriusque folia imposita.

Acetum fotu admotum.

MATTHIOLI.

Mastiche aspersa.

DIOSCORIDIS.

Ad vteri dolores & erosiones.

Adeps { Anserinus } illitus.
 { Gallinaceus }

Vrina cum ligustrino oleo feruefacta
imposita.

Lini seminis decoctum infusum.

Maluę decoctum fotu adhibitum.

Portulacę decoctum clysmate inditum,
proprie facit ad erosiones.

Rhaponticum potum.

Centaurii maioris radix hausta.

Anethi decoctum in defefsionibus.

Verbenacę rectę folia ex recenti su-
T illo

Vteri.

illo adipe, uel ex rosaceo subdita.
Hyoscyami seminis cremor impulsus.
Mandragoræ liquor pessulis impositus.

MATTHIOLI.

Irinum oleum illitum.
Cinnamomi stillatitia aqua epota.
Amygdalinum oleum haustum.
Laurinum oleum inunctum.
Balsami factitii liquores omnes.
Nucis myristicæ decoctum ex rhodome
lite, & aqua uitæ potum.
Nucces myristicæ cum matricariæ radici
bus ex vino albo coctæ, & potui datæ.
Scorpionum oleū in potione sumptū,
aut foris admotum.
Castoreū cū pipere albo ex mellicrato.
Sisymbrium cum parthenio in calenti
tegula calefactum, & odorato mera-
co aspersum, & impositum uentri.
Succisæ radicum decoctum ex uino pa-
ratum.
Chelidonium maius cum radice tusum
& oleo chamæmelino feruefactum &
imo ventri admotum.
Dictamni albi radices ex meraco vino
haustæ.
Mentha græca in placentis addita.
Imperatoria quouis modo insumpta.
Vincetoxici radices in defensionibus
additæ.
Oleum liliorum alborum, & è lini semi
ne

ne calidum cum succida lana ventri
adhibitum.

Botrys recēs in tegula calefacta, & cre-
tico vino aspersa, & applicata.

Aliud simile medicamentum, sed prae-
stantius vide lib. 3. cap. 113.

Matricaria quoquomodo adhibita.

Extremorū membrorū.

DIOSCO RIDIS.

Ad podagram.

Amomum illitum.

Mei radices impositæ.

Populi nigræ folia ex aceto illita.

Amurca cruda, ac recens fotu adhibita.

Salicis foliorum, & corticis decoctum
fotu impositum.

Ficulneum lac cum farina fœnugræci &
aceto cataplasmatitis additum.

Cochleæ terrestres suo cum operimen-
to tuisq̃ impositæ.

Mustellæ crematæ cinis ex aceto inunctus.

Marinus pulmo recēs concisus impositus.

Lac humanū cum opio, & cera illitum.

Adeps ouillus, caprillus, hircinusve ex e-
iusdē animalis fimo coactus inunctus.

Sanguis menstruus illitus.

Caprarum montanarum fimum ex ea-
rum adipe emplastri modo adhibitū.

Hordei farina cū cotoneis malis imposita

T 2 Lens

Extremorum membrorum.

Lens cum polenta decocta, & emplastri modo apposita.

Raporum decoctum fomentis additum

Brassica cum fœnogræco & aceto in cataplasmate.

Intybus per se, & cum polenta illitus.

Cucurbitę ramenta imposita.

Ari radix fimo bubulo emplastri modo excepta.

Asphodeli radix drachmę pondere ex vino pota.

Cyclamini decoctum fotu adhibitum.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Panaces Herculeum cum passa vva appositum.

Libanotis cum loliacea farina, & aceto cataplasmatibus addita.

Scordium ex aceto, aut aqua impositum.

Leucoium ex aceto illitum.

Androsaces imposita.

Helxynes succus cera & hircino adipe exceptus.

Hyoscyami semen, & folia cum polenta cataplasmatibus adhibita.

Semperuium inunctum ubi calor exupat.

Vrtica emplastri modo imposita.

Musculus marinus applicatus.

Cucumeris asinini radix ex aceto addita.

Thapsiæ succus illitus. (ta.

Glans vnguentaria illita.

Sambuci, & ebuli folia cum senu taurino, aut hircino imposita.

Brio-

Extremorum membrorum. 219

Brionia cum caprino stercore cataplas-
matis addita.

Heliotropii folia illita.

Vua passa a nucleis repurgata, & cū pa-
naxis succo inuncta.

Acetum calido fotu cum sulphure adhi-
bitum.

Rubigo ferri illita.

Sulphur cum aqua, & nitro inunctum.

Sal cum aceto impositum.

Asius lapis cum fabarum lomento il-
litus.

Gagates lapis impositus.

Fornaceæ testæ exustæ appositæ.

MATTHIOLI.

Oleum irinum è floribus paratum.

Asarina aut eius decoctum potum.

Santalum rubrum e sedi succo aut sola-
ni, aut portulacæ illitum.

Musculus terrestris ex aqua decoctus &
admotus.

Terebinthina resina, aut larigna cum
chamæpithi deuorata.

Iuniperini ligni decoctum pro balneo
vsurpatum, vide Iuniperi commenta-
rium.

Oleum è luteis ouorum illitum.

Oleum è terrenis vermibus.

Faba fresca cocta, & cum adipe suillo sub-
acta, & imposita.

Plantago trita, & illita.

¶

3

Dracun-

Extremorum membrorum .

Dracunculi radix cum melle, & capri-
no fimo illita.

Ari folia calenti fimo bubulo illita &
imposita.

Aristolochia rotunda.

Thymi aridi semuncia cum oxymelle
hausta.

Cannabis sativæ radix in aqua decocta
& adhibita.

Chamepytis decoctum cum rhodemel-
le, & oxymelite pluribus diebus hau-
stum.

Cortusæ florum oleum illitum. Paran-
di rationem lib. 4. comment. de la-
gopo.

Primulaveris illita, ac deuorata.

Verbasci minoris folia in aqua decocta
& admota.

Eiusdem florum oleum inunctum.

Genistæ florum conferva ex saccharo
parata, frequenter deuorata.

Ricini semen ex iure ueteris galli deco-
ctum, & epotum.

Sambuci tenerrima folia primo germi-
nata prodeuntia, cum pari pondere
radicum plantaginis, suilleq; axun-
giæ veteris contrita, & adhibita em-
plastri modo.

Colocynthis in catapotiiis deuorata &
clysteribus addita.

Dio-

Exremorum membrorum, 220

DIOSCORIDIS.

Ad coxendicos affectus.

Mei radices impositę.

Helenii folia ex uino cocta adhibita.

iridis Illyricę decoctum clysmate infusum.

Cardamomum ex aqua epotum.

Afarum potum, vel clystere infusum.

Populi albę cortex vncię pondere haustus.

lberis cõtusa, & emplastri mō imposita.

Siluri piscis salsamentum clysteribus infusum.

Piscium garum clysteribus iniectum.

Smyrniī semen potum.

Bubulum fimum ex bobus in pascuis degentibus appositum.

Lolii farina ex aqua mulsa decocta imposita.

Lupinorum fariua ex aceto illita.

Ammoniacum ebibitum.

Ascyri semen ex aqua potum.

Asparagi radicum decoctum haustum.

Althęę decoctum potui datum.

Sinapi cum fico tritum impositum, donec ruborem excitat.

Nasturtium clysmatę infusum.

Irionis semen clystere iniectum.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Capparis semen epotum.

T 4

Lepidii

Extremorum membrorum.

Lepidii folia, & radices cum helenii radice trita, & imposita.

Agaricum trium obolorum pondere in aceto mulso epotum.

Rhaponticum haustum.

Androsæmi semen bibitum, sed a purgatione aquam exsorbere oportet.

Centaurii maioris decoctum clystere infusum.

Leucacanthæ radice ex vino decoctum ebibitum.

Abrotani semen cum aqua potum.

Rubiæ radix epota.

Pulegium illitum quousque rubescat cutis.

Calamintha imposita recens, tritaque donec exuratur locus.

Thymus ex fimo cum polenta impositus; Idem præstat & Thymbra.

Rutæ sylvestris semen quadraginta diebus potum.

Panaces Herculei ex melle inunctum.

Lasæ cera, ligustrino, & irino oleo subactum, illitum.

Ephorbium in odorata potione sumptum.

Leontopetalum clysteribus infusum.

Hyperici semen quadraginta diebus haustum.

Chamæpithyos folia quadraginta diebus ex aqua dulci ebibita.

Betonice folia ex aqua hausta.

Polemonice radix ex aqua sumpta.

Xyri-

Extremorum membrorum. 221

Xyridis radix ex mulso pota.

Ocimaſtri ſemen cum vino, myrrha, & pipere ſumptum.

Quinque folii radice decoctum epotū.

Helichryſi coma ex vino hauſta.

Papaueris corniculati radice decoctū epotum.

Aethiopis decoctum bibitum.

Arction ex vino bibitum, & illitum.

Chameciſſi folia trium obolorum ponere in aquæ cyathis tribus tricenis quadragenisve diebus epota.

Colocynthis clyſtere infuſa, & recens loco confricata.

Cucumeris ſylueſtris radix clyſmate impulſa.

Scammonia ex aceto decocta, & cū hordeacea farina impoſita.

Acetum mulſum hauſtum.

Sory ex vino clyſtere infuſum.

Muria clyſtere indita.

Adarces illitus.

MATTHIOLI.

Aſari decoctum, ſive dilutum ex capri-
no ſero paratum hauſtum.

Baſami factitii liquor ſecundus, tū hau-
ſtus, tum illitus.

Abiegna lachryma deuorata.

Nuclei pinei frequenter ſumpti.

Terebinthina, aut larigna reſina ſum-
pta vnciæ pondere addito chamæ-
pithyæ

T 5

pithyæ

Extremorum mambrorum.

pithys, aut stęchadis puluere.

Castoreum drachmę pondere potum
cum tribus opoponacis obolis.

Ibicis stercoris admirabile medicamen-
tum; vide lib. 2. commēt. de stercore.

Fabaliū caulium, & filiquarum cinis
cum vetere axungia illitus.

Lupinorum farina cocta, & cataplasma-
tis modo illita.

Siliquastri recentia cornicula tusa &
adhibita.

Agaricum in potionibus additum.

Thymi aridi semuncia cum oxymelite
hausta.

Sagapenum quoquo modo adhibitum.

Euphorbium ex leucōii oleo illitum.

Arthemisię aridę puluistrium drach-
marum pondere ex vino haustus.

Bellidis genera omnia quouis modo
vsurpata.

Chamępithys in puluerem cum radi-
cibus trita & cum terebinthi lachry-
mę drachmis quatuor excepta, &
quotidie diebus quadraginta de-
uorata.

Oleum flammulę calidum inunctū aut
clysteribus infusum.

Consolidę regalis flores epoti.

Daphnoidis recentia folia contusa, &
illita donec rubescat locus.

Saccharum ē genistę floribus paratum

Ricini semen ex iure veteris galli deco-
ctum

Extremorum membrorum. 222

Etum epotum.

Colocynthis in catapotiiis deuorata, &
in clysteribus adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad articulorum dolores.

Gallorum senescentium ius potum.

Brassica cum fenogreco, & aceto illita

Ruta tum hausta, tum cataplasmatibus
adhibita.

Agaricum drachmę pondere ex aceto
mulso sumptum.

Melissophyllum ex sale impositum.

Quinquefolii radice decoctum bibitum.

Psyllium ex rosaceo, & aceto, aut aqua
illitum.

Mandragorę radix cum polenta im-
posita.

Urtica cataplasmatibus modo adhibita.

Veratrum nigrum haustum.

Fucus marinus recens impositus.

Thapsię succus inunctus.

Narcissi radix trita, & ex melle imposita.

Acetum mulsum potum.

Vinum mellitibus frequenter haustum.

MATTHIOLI.

Irinum oleum inunctum.

Balsamum fastitium illitum.

Oleum flammulę inunctum, & clyste-

T 6 ribus

Extremorum membrorum.

ribus additum.

Cortuse herbe oleum, vide lib. 4. cōmē
to de lagopo, primula ueris herba.

Abiegna, lentiscina, terebinthina lari-
gnaq; lachrima vnaqueque per se de
uorata.

Mastiche cum cumino, pulegio, saluia
lauri baccis, & sabina omnia melle
excepta, & imposita.

Cochlex cum testis tritæ, & impositæ.

Oleum è terrenis vermibus.

Sagapenum quomodolibet adhibitum.

Oleum liliorum alborum illitum.

Cannabis radix in aqua decocta & adhi-
bita.

Chamæpitys decoctum cū Rhodomel-
le & oxymelite plurib⁹ diebus epotū

MATTHIOLI.

Ad diuturnos articulorum dolores.

Ligni Guaiaci	{ decoctum die-	
Chinæ		bus xl. potum.
Zarzæ aprillæ		

MATTHIOLI.

Ad genuum dolores.

Oleum è nucibus Indicis.

Dio-

Extremorum membrorum. 223

DIOSCORIDIS.

Ad articulorum collisiones.

Sarmentitius cinis cū axungia vel oleo
illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad articulorum tophos.

Cannabis sylvestris radix decocta, &
illita.

Ochra inuncta.

MATTHIOLI.

Oleum Indicæ nucis illitum.

Taxi pinguedo.

Muris montani pinguedo.

Sagapenum emplastri modo impositū
addito aceto, & capparum succo.

Oleum liliorum alborum.

DIOSCORIDIS.

Ad perniones.

Thus cum suillo adipe, aut anserino im
positum.

Pix liquida inuncta.

Acacia illita.

Myrti seminis decoctum fotu adhibitū

Ficus crematæ cum cerato impositæ.

Cancro-

Extremorum membrorum .

Cancrorum ouuiatilium cinis cum decocto melle illitus.

Pulmo marinus recens concisus, & impositus.

Asinine vngule cinis oleo maceratus illitus.

Vrsinus' adeps inunctus.

Vmbilici veneris succus impositus.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, malicorio, cydonio malo, & rosaceo adhibitæ.

Orobi decoctum fotu impositum.

Raporum decoctum fomenti modo.

Betæ decoctum appositum.

Ranunculi maioris folia ex vino decocta & imposita.

Oleum ex incauata asphodeli radice decoctum illitum.

Cyclamini decoctum fotu adhibitum, quin etiam oleum cum pauca cera in eius excauata radice feruefactum illitum .

Scilla cremata imposita.

Ranunculi decoctum adhibitum.

Arction ex vino additum.

Alumen aqua aspersum.

MATTHIOLI.

Malicoriū ex vino decoctum impositū.

Cancrorum exustorum cinis oleo subactus, & impositus.

Mat-

Extremorum membrorum. 224

MATTHIOLI.

Ad pedum tumores.

Tiliae folia ex aqua aspersa.

DIOSCORIDIS.

Ad pedum inflammationes ex
calceorum attritu.

{ Agninus
Vrsinus } impositus.
Suillus

Calceamentorum veterum soleæ com-
bustæ, & admotæ.

Cape succus cum adipe gallinaceo im-
positus.

MATTHIOLI.

Leporinus pulmo impositus.

Unguentum ex rosaceo in mortario
plumbeo cum simili pistillo paratum
inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad pedum rimas.

Cancrorum fluuiatilium cinis cum de
cocto illitus.

Scilla oleo feruefacta, & cum resina im-
posita.

Mat-

Extremorum membrorum.

MATTHIOLI.

Oleum ex ouorum vitellis.

Oleum ex tritico.

Vnguentū è rosaceo in mortario plumbeo & simili pistillo diu circumductū vt habes lib.5. cōmento de Plumbo.

DIOSCORIDIS.

Ad digitorum reduuias.

Punicorum malorum succus illitus.

Myrti folia trita, & inspersa.

Oleæ syluestris folia trita & imposita.

Eboris ramenta in puluerem adhibita.

Aloe cum passio imposita.

Paronychia concisa, & illita.

Bryonia oleo decocta quousque liquefcāt inuncta.

Labruscæ cremati flores ex melle impositi.

Rubigo ferri illita.

Acacia admota.

Rhois folia ex aceto, aut melle illita.

Marrubii folia ex melle imposita.

Quinque folii radix illita.

Tithymali characiæ lac illitum.

Acetum appositum.

Alumen ex aqua inspersum.

Sal impositum.

Mat-

MATTHIOLI.

Plantaginis folia recentia trita, & adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad paronychia.

Thus cum melle illitum.
Eboris scobes inspersus.
Paronychiæ folia illita.

DIOSCORIDIS.

Ad scabros vngues auferendos.

Pix liquida illita.
Lini semē cum pari nasturtio, & melle.
Cupressi pilulæ impositæ.
Lapathi cuiusque radix in aceto decocta, & applicata.
Ranunculi folia, & radices admotæ.
Chelidonium minus illitum.
Viscum cum trito auripigmento appositum.
Alumen cum aqua aspersum.
Sulphur cum resina terebinthina adhibitum.
Sandaracha cum pice imposita.
Fex vini cremata ex resina.

Mat^r

Extremorum membrorum.

MATTHIOLI.

Ranunculus tritus, & impositus.
Chelidonium minus tritum, & illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad mobiles vngues extrahēdos.

Vua passa illita.

DIOSCORIDIS.

Ad contusos vngues.

Bulbi cum polenta impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad clauos, & callos.

Fermentum triticeum illitum.

MATTHIOLI.

Saligni corticis cinis ex aceto maceratus impositus.

Blitum illitum.

Lilii radix axungia excepta & illita.

MATTHIOLI.

Ad verrucas.

Cicorium verrucarium in acetario deuoratum.

Eius-

Extremorum membrorum. 226

Eiusdem herbæ semen drachmę ponde
re tribus diebus potum ante noctur-
num decubitum.

DIOSCORIDIS.

Ad varices.

Cirsii radix dolenti loco adalligata.

DIOSCORIDIS.

Ad lumborum dolores.

Echii radix pota.
Chameleucę illita.

DIOSCORIDIS.

Ad inguinum inflammationes.

Leporinus pes herba imposita.
Aster atticus recens impositus.

MATTHIOLI.

Cochleæ minores trite & illite.

DIOSCORIDIS.

Ad enterocelas.

Cupressi pilulæ illitæ.
Punicorum cytini cataplasmatidis ad-
diti.

Symphytum petreum emplastri mo-
do

Extremorum membrorum.

do impositum.

Quinquefolium haustum.

Equiseti radix, & folia adhibita.

Aloe emplastri modo illita.

MATTHIOLI.

Bdellium salina matutina subactum emplastri modo impositum.

Cupressini coni virides ex vino vetere decocti, & epoti, interim tamen cupressinis foliis affecto loco adalligatis.

Ulni folliculorum liquor impositus.

Cupressi item folia contusa, & affecto loco admota.

Leporinus simus, & pili, qui sub ventre habentur cum melle decocti, & fabæ quantitate frequenter deuorati.

Ophioglossum in potione sumptum, & extrinsecus impositum.

Trinitatis herbæ pulvis dimidii cochlearis mensura ex vino austero pluribus diebus epotus.

Polygonum minus in potionibus sumptum.

Sanicula quouis modo usurpata.

Auricula vrsi ebibita.

Pilosellæ farina hausta.

Caryophyllatæ radices epotæ.

Potentilla tam in cibis quam in potionibus usurpata.

Personata in vino decocta, aut trita, & ebibita.

Alchimillæ

Extremorum membrorum. 227

Alchimillæ aridæ puluis ex sua ipsius
aqua stillatitia sumptus.

Hippoglossi radicum, aut foliorum pul
uis sesquidrachmæ pondere ex maio
ris symphyti decocto haustus.

DIOSCORIDIS.

Ad farcocelas.

Cinis sarmentitius illitus.

MATTHIOLI.

Anonidis radix trita, & mensibus plu
ribus hausta.

SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM
FACVLTATES,
SECVNDVM GENERA
ex Dioscoride.

Februm.

DIOSCORIDIS.

Ad tertianas.



RANVS plagel
la cōfricatus linteo
love illitus, mox frō
ti, & temporibus im
positus.

Vermes terreni cum
anserimo adipe de
cocti & illiti.

Plantagin is radices integræ tres cum
vini cyath is tribus, & pari aqua potē
Trifolii bituminosi tria folia trita toti
demq; semina epota.

Hypericum ex vino bibitum.

Verbenacę supinæ tertius a terra geni
culus cū adiacentibus foliis haustus.

Helio

Heliotropii seminis grana quatuor po
ta ante febris accessionem.

Portulacę succus hauſtus.

MATTHIOLI.

Asari ex vino decoctum potum addito
melle, maci, & cinnamomo.

Rosarum succus, & dilutum epotum.

Famarindi hauſti.

Sebestena.

Lapis inuentus in capite nudę limacis
ſuſpenſus.

Caninum ſtercus album in acceſſione
cochlearis menſurę ex vino potum.

Agaricum in potione ſumptum.

Rhabarbarum potui datum.

Gentianę ſtillatitia aqua epota.

Centaurii minoris decoctum bibitum.

Chamædryos decoctũ aliquot diebus
ebibitum.

Laſpis lapis geſtatus.

DIOSCORIDIS.

Ad quartanas.

Cinices lectularii ſeptem cauis fabarũ
incluſi, & deuorati.

Plantaginis radices integre quatuor
cum vini cyathis quatuor, & pari
aqua ebibitę.

Vermi-

Febrium.

Vermiculi qui in dipsaci echino inter-
nis partibus conclusi reperiuntur in
aluta collo bracchio adalligati.

Ruta sylvestris cum vino pota.

Hypericum ex vino haustum.

Quinquefolii rami quatuor sumpti.

Verbenacę supinę quartus a terra ge-
niculus vna cum adiacentibus foliis
haustus.

Heliotropii sem.gra. quatuor hora vna
ante accessiōem pota.

MATTHIOLI.

Asari ex vino albo decoctum addito
melle, maci, & cinnamomo.

A sarinum oleum pedum plantis, & spi-
næ dorsi illitum.

Myrrhæ drachma ex vino cretico cali-
do pota hora vna ante accessiōem,
sed egros subinde in lecto sudare
oportet, & potionē tribus in acces-
sionibus replicare.

Eadem in catapotis cum theriaca con-
formatis.

Gentianæ stillatitia aqua epota.

Eryngii tenellorū foliorum stillatitia
aqua.

Imperatorię radicis drachma ex mero
calido hora vna ante accessiōem
epota.

Cardui benedicti decoctum, aut herba
ipsa

ipsa in puluerem sumpta. (ptæ.

Palmæ Christi radices per potiones sũ
lammula, & eius aqua pota.

Verbasci feminae radice succus duarũ
drachmarũ pondere ex cretico vino
haustus ipsa hora accessiois.

Ellebori nigri dilutum haustum.

Stibium nostrum quatuor granorum
pondere sumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad diuturnas febres.

Galli senis ius Dioscoridis modo para-
tum haustum.

Agaricum intus sumptum.

Vinum melitites haustum, vbi ventricu-
lus magna imbecillitate laboret.

MATTHIOLI.

Asari decoctum potum.

Agaricum in potionibus additum.

Rhabarbarum frequenter potum, & eius
dilutum.

Gentianæ stillatitia aqua epota.

Anthemidis florum pastilli, & suo ipsius
oleo dissoluti, & febrientibus à verti-
ce capitis vsq; ad pedes illiti. Parandi
modum habes lib. 3. cap. de anthe-
mide.

Eupatorii decoctum potum.

Foliorum, & folliculorũ lupuli decoctũ.

V Ellebori

Febrium.

Ellebori nigri decoctum, siue dilutum.
Stibium nostrum quatuor granorū pon-
dere sumptum.

MATTHIOLI.

Ad continuas.

Cassie solutiue pulpa deuorata.
Santala omnia pota, vel ex aqua rosa-
cea ventriculo illita.
Melopeponum seminum cremor ex hor-
deacea ptisana potus.
Trifolii acetosi stillatitia aqua.
Angurie pulpa deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad hepielas.

Hyoscyami tria, vel quatuor folia pota.

MATTHIOLI.

Acori
Foeniculi
Asparagi
Agarici

} decoctum epotum.

Eupatorium quocunq; modo vsurpatū.

MATTHIOLI.

Ad quotidianas.

Agaricum in potionibus additum.

Rhabar-

Febrium. 230

Rhabarbarum, & eius dilutum frequen-
ter Epotum.

Gentianæ stillatitia aqua potui data.

Eryngii stillatitia aqua pota, quæ è te-
nellis paratur foliis;

MATTHIOLI.

Ad compositas febres.

Gentianæ stillatitia aqua Ebibita.

Agaricum
Rhabarbarū } Et eorum dilutū epotū.

MATTHIOLI.

Ad causum.

Crespini baccarum succus cum violaceo
iulapio propinatus.

Vux spinæ iusculis incoctæ.

Ribes vulgaris quoquo modo vsurpa-
tus.

Salicum & arundinum folia circa lectu-
lum prostrata.

Cerasia acetosa saccharo condita.

Melopeponum, cucumerum, cucurbita-
rumq; seminum lacteus cremor hau-
tus.

Angurix pulpa deuorata.

Potentilla pedum plantis, manuumq;
volis admota.

V 2 DIO-

Febrium.
DIOSCORIDIS.

Ad hecticam.

Portulaca tum vetriculi osculo tum hy
pocundriis illita.

MATTHIOLI.

Amygdalinum oleum.

Pistacia quoquo modo usurpata.

Nuclei pinei.

Stibium nostrum quatuor granorū pon
dere haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad febrium circuitus

Sinapi cibus inspersum.

Smyrni semē haustum.

Piper bibitum.

Ruta epota.

Sagapenum haustum.

Anthemis clysmate infusa.

Polygoni succus hora ante accessio-
nem sumptus.

Quinquefolii folia, ex dulci aqua,
aut diluto vino cum exiguo pipere
pota.

DIO.

D IOSCORIDIS.

Ad febrium algores.

per haustum.

garicum drachmæ pondere sumptum
ristolochia rotunda ante accessio-
nem ebibita.

brotonum ex oleo inunctum

chalaminthæ decoctum potum.

anaces Herculeum illitum.

myrnii semen, & radix ex mulso pota

yrethrum inunctum.

lafer cum pipere, & thure ex vino hau-
stum

grossi coctæ & illitæ

iperinæ carnes coctæ, & in cibū sūptæ,

Mustellæ sanguis inunctus.

Asinini vnguis cinis ex oleo maceratus
illitus.

D IOSCORIDIS.

Ad pestilentes febres.

Myrrhis bis, vel ter qualibet die ex ui-
no ebibita.

M ATTHIOLI.

Phu decoctum potum, & ipsa quoq; ra-
dix hausta.

V 3 Myr-

Februm.

Myrrha.

Caphura.

Dictamnus albus.

Crespini baccarum succus.

Vuæspinæ succus.

Ribis vulgaris succus.

Quernorum foliorum stillatitia aqua.

Citrii mali succus.

Limonii, & aurantii florum stillatitia aqua.

Aurantia acida.

E' limoniorum succo stillatitia aqua.

Cyanus herba, & eius flores.

Galega quoquo modo vsurpata.

Tormentilæ } radices omnibus modis.
Bistortæ } ppinatae. præsertim ad-
dito boloarmeno.

Cardui benedicti decoctum, & ipsa herba Epota.

Scordium quouis modo vsurpatum.

Scabiosa quouis modo sumpta.

Sanguisorbæ decoctum haustum.

Lentis palustris stillatitia aqua.

Punicorum malorum vinum ex oxalidis, aut intybi, aut borraginis aqua ebibitum.

Armenia terra ex oxalidis aqua pota.

Antidotum nostrum magnum descriptum in præfatione sexti libri.

MAT-

MATTHIOLI.

Ad pestem, & pestilens
contagium.

Citrii pomi semen.

Scorpionum oleum nostrum cordi, &
arteriis temporum, manuum, pedūq;
frigidum quotidie illitum.

Ceruini cordis os.

Scorzoneræ radix aut eius succus.

Cappæ excavata theriaca, & citrii succo
repleta, & calentibus cineribus co-
cta expressus cremor epotus.

Caryophylli tā deuorati, quā suffiti.

Saccharum ē caryophyllorum floribus
paratum deuoratum.

Caryophyllorum florum succus ex to-
ta planta expressus, & haustus.

E^o caryophyllis floribus paratum infu-
latumq; acetum manibus & arteriis
illitum.

Zeduaría commansa, vel in potione
sumpta.

Succisæ radix viridis recensq; carbun-
culis imposita.

Eiusdem ex vino dilutum epotum.

Cruciata vtriusq; radices quoquo mo-
do vsurpata.

Aristolochia longa hausta.

Veronica mas drach. duabus vna cum
theriacæ drachma ex vino meraco po

V 4 ta ad

Febrium.

ta ad ciendum sudorem.

Dictamni albi radices.

Galega siue ruta capraria quouis modo
vsurpata quotidie

Eiusdem succus addita theriaca trium
vnciarum pondere potus.

Agaricum in potionibus

Gentiana.

Abrotonum.

Calamintha in tus sumpta, & foris cum
oleo feruefacta illita.

Imperatoriae radix pota.

Saccharum e rorismarini floribus para-
tum deuoratum.

Vincetoxici radices ex vino epotæ.

Carduus benedictus.

Chamædrys à ieiunis quotidie in ace-
tariis sumpta.

Scordium quomodolibet sumptum.

Tussilaginis maioris radix duarū drach-
marum pondere ex vino calido pota
ad sudandum.

Scabiosæ succus quatuor vnciarum pon-
dere cum theriacæ drachma potus ad
ciendum sudorem.

Pimpinellæ radices quoquo modo vsur-
patæ.

Sanguisorba, & eius aqua stillati-
tia

Angelicæ radices semidrachma cum the-
riacæ drachma & sua ipsius aqua po-
ta ad ciendum sudorem.

Stibium

Febrium . 233

Stibium nostrum quinq; granorum pō-
dere sumptum cum electuario liberā
tis in principio morbi.

Armenia terra in antidotis addita.

Argentum viuum præcipitatum ex rho-
dosaccharo sumptum.

Oleū ē calcantho scrupuli pondere sum-
ptum citato subinde sudore.

Antidotum nostrum magnum in præsa-
tione. 6. libri descriptum tam ad infe-
ctos curandos quàm ad sanos præ-
seruandos.

Tumorū præter naturā.

MATTHIOLI.

Ad exanthemata, & morbillos.

Napi rapiuē semen ex adianti decocto
epotum.

Cancamum ex caricarum decocto hau-
stum.

DIOSCORIDIS.

Ad inflammationes.

Harundinum virentia folia tusa, & il-
lita.

Glandes intritæ, & illitæ appositæ.

V 5 Rhois

Tumorū præter naturam.

- Rhois semen ex aqua illitum.
Lupinorum farina cum polenta, & aqua
imposita.
Vmbilici veneris succus circumlitus.
Plantago emplastri modo imposita.
Asphodeli radix cum polenta admota.
Acetum cum succidis lanis aut spon-
giis impositum.
Rhaponticum cum aceto illitum vbi
diutius perseverauerit inflammatio.
Pulegium cum polenta adhibitum.
Tussilaginis folia contrita, & ex melle
imposita.
Parthenium emplastri modo im-
positum.
Lonchitis altera imposita.
Cânabis Sylvestris radix emplastri mo-
do adhibita.
Polygonum illitum.
Tribuli fructus cataplasmatibus additus
Xiridis radix ex aceto imposita.
Achillea illita.
Elxine cataplasmatibus addita.
Lichen herba adhibita.
Verbenacæ supinæ folia illita vbi inflā-
matio diuturna fuerit.
Papaveris folia vna cum calycibus illi-
ta, vel calyces tantum cum polenta adhi-
biti.
Hyoscyami semen, & folia imposita.
Mandragoræ recentia folia cum polen-
ta illita.

Bryoniæ

Tumorum præter naturam. 234

Bryoniæ radix ex vino decocta adhibita.

Sambuci, ebuliq; præterea folia cum polenta illita.

Indicum illitum rumpit.

Tritici furfures acerrimo aceto elixi impositi.

Tritici pollen ex hydræleo vel aqua mulsa illitus.

Triticeus panis ex aqua mulsa decoctus, & herbis ad idem conferentibus additus, & impositus.

Sesamum illitum:

MATTHIOLI.

Caphura

Alni recentia folia

Ligultri foliorum decoctum

Glandes omnes recentes illitæ

Myrti foliorum, & baccarum decoctum.

Cydoniorum seminis mucago.

Cochleæ tam crudæ, quàm coctæ cum testis, aut sine contritæ & locis affectis agglutinatæ.

Ovi Album

Tritici farina oleo rosaceo, aut chamæmalino subacta

Indici frumenti farina.

Secale farina.

Fœnogræci farina.

Lini seminis, farina

V 6 Lini

Tumorū præter naturam.

Lini seminis oleum.
Maluæ folia cum salicis frondibus.
Brassica.
Portulaca.
Cucumis recens sectus, & impositus.
Anguriæ pulpa adhibita.
Bursa pastoris admota.
Cassia solutiux pulpa illita.
Santalum rubrum ex frigidis plantarū
succis illitum.
Musculus terrestris ex aqua decoctus, & ad
motus.
Hyoscyaminum oleum.
Rosaceum vnguentum.
Lilia diu in oleo macerata, & illita.
Trifolii acetosi succus.

DIOSCORIDIS.

Ad carbunculos.

Ligustri folia imposita
Pix liquida ex melle & vua passa illita
emarginat, disrumpitq;
Cupressi folia trita, & imposita.
Sabine folia ex vino illita carbunculos
circumscribunt.
Oliuæ maturæ arefactæ illitæ emargi-
nant.
Nucum iuglandium veterum nuclei per
uncti.
Columbinum fimum cum melle, & lini
semine

Tumorū præter naturam. 235

semine subactum.

Erui farina emplastri modo imposita.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Brassica cum sale illita rumpit.

Nasturtium impositum.

Porrum cum sale appositum.

Panaces Herculeum illitum.

Coriandrum cum passa vua ex melle adhibitur.

Laserpitii liquor inunctus.

Tithymali caraciæ lac inunctus.

Vua passa à nucleis repurgata & cum ruta applicata.

MATTHIOLI.

Ligustri foliorum decoctum.

Iuglandium oleum.

Bursa pastoris trita imposita.

Scabiosæ folia applicata.

Galega illita.

DIOSCORIDIS.

Ad furunculos.

Fermentum triticeum impositum.

Helxyne illita.

Sal cum vua passa, aut suillo adipe, aut melle impositum.

Hastulæ regiæ radix in fece uini decocta illita.

Ephe-

Tumorum præter naturam.

Ephemeris folia ex vino cocta, admota.

Vtriusq; urticæ illita folia.

Leontopodii radix suspensa.

Cucumeris Sylvestris radix cum terebinthina resina imposita.

Scammonijæ succus cum melle, aut oleo illitus.

Mori radice liquor inunctus.

Thapsiæ succus ex melle illitus.

Pycnocomi folia applicata.

Sandaracha cum adipe adhibita.

Asius lapis liquida pice, aut resina terebinthina exceptus illitus.

Cimolia terra ex aceto imposita.

MATTHIOLI.

Triticum commansum impositum.

Lilii radix elixa, & cum adipe, & oleo adhibita.

Sclæræ folia ex aceto imposita, aut ex melle.

Triticea farina ex hydreleo subacta, & calidè imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad gangrænas, & sphacelum.

Rhois folia ex aceto, & melle illita.

Punicorum succus inunctus.

Nucū inglandiū veterū nuclei peruncti.

Ficulnei

Tumorū præter naturam. 236

Ficulnei cineris lixiuium spongiis exceptum, & adhibitum.

Loliacea farina cum sale, & raphano cataplasmat̃is addita.

Cicerum farina cum hordeo, & melle adhibita.

Lentes cum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, malicorio, & salsa aqua illitæ.

Erui farina illita.

Brassica elixa cum melle cataplasmat̃is addita.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Lasēpitii liquor illitus loco prius scalpello exciso.

Galiopsis folia, semen, succus, & caulis ex aceto imposita.

Verbasci florem aureum ferentis folia admota.

Tithymali caraciæ lac impositum

Bryoniæ radix, fructus, & folia cum sale illita.

Vua passa à nucleis repurgata, & cum sale imposita.

MATTHIOLI.

Iuglandium nucum oleum inunctum.

Lupinorum farina ex vino, & oleo incotta addito croco, & emplastri modo adhibita.

Aerugo cum melle, alumine, & aceto, in-

Tumorum præter naturam.

to incocta, & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad erysipelas, & sacros ignes.

Crocum illitum cum refrigerantibus.
Cupressi folia per se, & cum polenta im-
posita.

Rhamni folia illita.

Ligustri folia adhibita.

Rosæ admotæ.

Acaciæ succus inunctus.

Oleæ Sylvestris folia contrita, & im-
posita.

Myrti folia cum omphacino oleo, aut
exiguo rosaceo, & uino illita.

Menstruus mulierum sanguis circūlitus
Caprarum montanarum stercus ex vi-
no, uel aceto decoctum impositum.

Vrinæ humanæ sedimen inunctum.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, rosa-
ceo, & malicorio adhibitæ.

Malua ex oleo decocta, & illita.

Brassica utraq; incisa, & cum polenta
emplastri modo imposita.

Portulaca cum polenta cataplasmatibus
addita.

Plantago illita cum cimolia, & cerussa.

Intybi radix, & folia cū polēta imposita

Isatidis folia illita.

Acinos cataplasmatibus addita.

Rutæ

Tumorū præter naturam. 237

Rutæ succus cum aceto, cerussa, & rosa
ceo inunctus.

Coriandrum cū pane, polentave illitū.

Lilii folia ex aceto adhibita.

Tussilaginis folia trita, & imposita.

Parthenium cum floribus emplastri mo
do admotum.

Polygonum, adhibitum.

Anchusæ radix cum polenta imposita

Lycopsis radix cum polenta applicata.

Rubi Idei flos illitus.

Helxine imposita.

Quinquefolii radix decocta cataplas
matis indita.

Verbenaca recta ex aceto inuncta

Papaueris uascula concisa cum polenta
imposita.

Solani hortensis folia cum polline po
lentæ illita, Quin & eiusdem succus
inunctus.

Mandragoræ radix ex aceto illita.

Cicutæ succus inunctus.

Umbilici veneris succus circumlitus.

Psyllium, & eius spissamentum inunctū.

Lens palustris illita.

Ricini folia ex aceto adhibita.

Semperuium maius impositum.

Stratiotes admoti.

Acetum circumaspersum.

Rubigo ferri illita.

Chalcitis imposita.

Sal cum aceto, & hyssopo illitum.

M A T.

Tumorum præter naturam.

MATTHIOLI.

Caphura

Portulacæ succus illitus.

Plantaginis succus.

Solanum hortense, & eius succus.

Cassia solutiux pulpa exterius illita.

Anguriæ pulpa recens admota.

Cucumeris recentis ramenta adhibita.

Bursa pastoris.

Trifolii acetosi succus.

Solani maioris succus illitus.

Verbasci florum stillatitia aqua imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad herpetas.

Acaciæ succus inunctus.

Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo ex vino imposita.

Oleæ Sylvestris folia contrita, & imposita.

Caprarum montanarum fimus ex vino vel aceto decoctus illitus.

Lentes cum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, & malicorio cataplasmatibus inditæ.

Helxinæ succus cum cerussa inunctus.

Plantago imposita.

Chelidonium maius ex vino illitum.

Rubi

tumorū præter naturam. 238

Rubi folia illita.

Solani hortulani succus cum cerussa rosaceo, & argenti spuma illitus.

MATTHIOLI.

Pompholix
Diphryges
Cerussa
Cadmia

} in vnguentis addita.

Ligustri folia contusa, & imposita.

Rhois recentia folia, & vuae contusa & imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad epiniæctidas.

Ouillum caprillumue stercus ex aceto illitum.

Brassica concisa cum aceto imposita.

Plantago quoquo modo adhibita.

Cucumeris folia cum melle inuncta.

Porri folia cum rhoe obsoniorum cataplasmatis indita.

Absinthium cum aqua illitum.

Coriandrum cum passa vua, & melle impositum.

Viscum in splenio adhibetur.

Heliotropii semen inunctum.

Vua passa à nucleis repurgata, cum ruta imposita.

MAT-

Tumorem præter naturam.

MATTHIOLI.

Lac caprillum bubulumve cum linteolis adhibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad strumas.

Iridis Illyricæ radix cocta, & illita.

Pix liquida cū hordeacea farina & pueri impubis vrina decocta, illita.

Ficus siccæ coctæ, & imposita.

Viperinæ carnes coctæ & deuoratæ.

Mustellæ sanguis inunctus.

Asinini vnguis cinis ex oleo maceratus illitus.

**Bubulus fimus è bubis herbas pascen-
tibus electus, & illitus.**

Hordei farina cum pice, & impubis pueri vrina excepta imposita.

Loliacea farina cum fimo columbino ex vino decocta adhibita.

Fabarum farina cum melle, & fœnogræco illita.

Lês in aceto cū meliloto decocta illita.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Rumex decoctus circumlitus.

Plantago cum sale imposita, vel radix collo suspensa.

Sinapi cum sulphure illitum.

Nasturtium ex muria inunctum.

Piper

umororum præter naturam. 239

Piper cum pice impositum

oriandrum cū fabæ lomento adhibitū.

albanum illitum.

parine cum axungia inuncta.

lelissophylli folia cum sale cataplas-
matis addita.

althea ex vino, vel aqua mulsa deco-
cta imposita. (lita

Quinquefolii radix decocta incisa, & il

aserpitii liquor ex cera illitus.

umbilici Veneris succus circumlitus.

Mandragoræ recentia folia cum polen-
ta imposita.

semperuium tertium impositum.

Galiopsis folia, caulis, semen, & succus
cataplasmatibus indita.

Pseudobunii rami quaterni ex aqua po-
ti, illitiq;

Adiantum impositum.

Fornacæ testæ tostæ ex cerato illitæ.

Capparis radix, & folia trita imposita.

MATTHIOLI.

Cochleæ quæ salinis inherent cum pu-
tamine tustæ, & illitæ

Cancris fluuiatiles combusti tritiq; ex
melle illiti.

Mustellarum fimus melle exceptus ad-
dita lupinorum aut fœnogræci fari-
na, & illitus.

Milii indici arundinum medulla cum
aliis

Tumorū præter naturam.

aliis nonnullis, vide panici commen-
tarium.

Cyclamini radices contusæ, & illitæ.

Dracunculi radix contusa, & imposita.

Cruciata minoris radix recens contusa
& emplastri modo adhibita.

Eryngii radix decocta, & illita.

Menthastrum illitum.

Lilii radix cocta ex adipe, & aloe adhi-
bita.

Artemisiæ radix ex axungia.

Bellidis genera omnia.

Scrophularia ex butyro illita.

Verbasci folia ex aceto imposita.

Personata emplastri modo adhibita.

Genistæ flores contriti, & ex rhodomel-
le, aut sorbili ouo hausti.

Vitis nigræ radicis succus cum vini, aut
mellis equali portione epotus.

Eiusdem radix tusa, melleq; excepta &
imposita.

MATTHIOLI.

Ad ganglium.

Plúbea lamina tenuis probe adalligata.

DIOSCORIDIS.

Ad panos.

Olez sylvestris folia cum melle illita.

Ficus

Tumorum præter naturam. 240

Ficus siccae decoctæ, & illitæ.

Bubulum stercus ex pascuis sumptum, impositum.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Atriplex tam crudum, quam coctum illitum.

Plantago cum sale imposita.

Bulbi elixi cum polenta, & suillo adipe illiti.

Isatidis folia imposita

Eryngium adalligatum.

Abrotonum cum farina hordeacea, & hydreleo subacta illitum.

Acinos herba imposita.

Panaces asclepii flores, & semen cataplasmatibus indita.

Coriandum cum fabæ lomento appositum.

Ammoniacum in unctum.

Onobrychis concisa, & emplastri modo imposita.

Gladioli superior radix cum loliacea farina, & dulci aqua illita.

Psyllium ex rosaceo, acetone, aut aqua impositum.

Mandragoræ folia recentia adhibita.

Galiopsis folia, caulis, succus, & semen illita.

Personatæ radix cum axungia suo super folio imposita.

Pycnocomum adhibendum.

Conyza emplastri modo imposita.

Vini

Tumorum præter naturam.
Vini fex illita.

MATTHIOLI.

Eryngii radix decocta, & emplastri modo imposita.

Sclarea ex aceto, aut melle subacta adhibita.

Folia Verbasci tusa cineribusq; calefacta & admota.

Malua decocta, tusaq; & ex hordeacea & farina mixta, & illita.

Lilii radix cocta, & ex lini seminis farina adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad tumores discutiendos.

Canceri fluuiatiles impositi.

Lini semen illitum.

Fœno græci farina cataplasmatibus adhibita.

Capparis radix, & cõtusa folia imposita.

Smyrni radix illita.

Ammoniacum inunctum.

Buphtalmi folia, & flores cera excepta, & imposita.

Mandragorę recentia folia cum polenta illita.

Galiopsis folia, caulis, succus, & semen adhibita.

Apilēgos

Tumorum præter naturam. 241

Aegilops imposita.

Diphryges cū resina terebinthina aut cerato appositum.

Pyrites lapis illitus.

Alabastrites lapis crematus resina, aut pice exceptus & adhibitus.

Cimolia terra illita.

MATTHIOLI.

Iuglandium oleum.

Caricæ pingues cum lilii, iridis, & althææ radicibus decoctæ & emplastri modo adhibitæ.

MATTHIOLI.

Ad cheradas idest scrophulas.

Mustellarum fimus melle exceptus addita lupinorum, aut fœnogræci farina, & illitus.

Cruciatæ radix recens contusa, & emplastri modo imposita.

Cyclamini radices contusæ, & illitæ.

Cruciatæ minoris radix in puluerem trita, & imposita.

Socrophularia contusa & illita.

Verbasci folia ex aceto imposita.

Personata contusa, & adhibita.

Genistæ flores ex rhodomelle aut forbili ouo deuorati.

X Vitis

Tumorum præter naturam.

Vitis nigræ radicis succus ex uino, &
melle haustus.

Eiusdem radix tusa, & ex melle illita.

DIOSCORIDIS.

Ad scirrhum.

Taurinus sanguis cum polenta illitus
Bubulus finus ex pascuis assumptus ex
aceto illitus.

Loliacea farina cum fimo columbino
in vino decocta adhibita.

Lini semen cum nitro, & lixiuio ficul-
nei cineris decoctum.

Hydropiper appositum.

Cannabis sylvestris radix imposita.

MATTHIOLI.

Amygdalinum oleum.

Sesamium oleum.

Pix liquida.

Bubulum } stercus ex aceto im-
Caprillum } positum.

Cyclamini radices contrusæ illitæ.

Dracunculi radix tusa, & imposita

Oleum liliorum alborum.

DIOSCORIDIS.

Ad carcinomata.

Cancrorum fluuiatilium cinis cum mel
le

Tumorem præter naturam. 242

le decoctus & illitus .

Irionis semen tritum & impositum.

Vtraque urtica adhibita.

Galiopsis folia , caulis succus , & semen
imposita.

MATTHIOLI.

Humani stercoreis stillatitia aqua illita.

Fœnogræci farina ex uino subacta & im
posita.

Sanguisorba, & eius succus illitus.

Unguentum ex rosaceo cum mortario,
& pistillo plumbeo cōfectum illitū.

Plumbum ustum, & lotum.

Oleū de antimonio nostrū inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad tumores in uniuersum.

Suillus adeps illitus .

Brassica utraq; concisa cum polenta im
posita .

Cucurbita imposita.

Xanthii semen illitum .

Bulbi elixi cum polenta, & adipe suillo
illiti.

Lini semen cataplasmati inditum .

Fœnigræci semen illitum .

Cepa decocta, & cum passa uua & ficu
adhibita.

Narcissi radix illita.

X 2

Brionia

Tumorum præter naturam.

Brionię radix ex vino decocta & imposita.

Isatidis folia applicata.

Smyrni radix illita.

Tragoriganum cum polenta admotum.

Mentha cum polenta cataplasmatis addita.

Amaraci folia cum cera cocta & illita.

Daucum illitum.

Libanotis radices emplastri modo impositæ.

Nigella ex aceto illita.

Horminum ex aqua appositum.

Bupthalmi flores cera subacti.

Althęa decocta adhibita.

Cannabis sylvestris radix emplastri modo imposita.

Anagyris folia illita.

Polygonon cataplasmati inditum.

Xyridis radix ex aceto inuncta.

Helxine imposita.

Quinquefolii radix decocta applicata.

Verbenacę supinę folia imposita.

Psyllium ex rosaceo, acetove, aut aqua illitum.

Ephemeris folia ex uino decocta & admota.

Cytisi folia cum pane inter initia apposita.

Cucumeris agrestis radix cum polenta imposita.

Chamæsyces rami triti, & impositi.

Pycnocomi

Tumorū præter naturam. 243

Pynocomi semen cum polēta illitum.
Indicum inunctum.

Vini fæx cruda per se, uel cū myrto illita

DIOSCORIDIS.

Ad steatomata.

Chrysantemi flores cum cerato triti, &
impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad meliceridas.

Rumex cum rosaceo, & croco illitus.

Melilotus ex aqua inuncta.

Vua passa a nucleis repurgata, trita cum
ruta imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad tumores ex ictu.

Brassica concisa cum polenta imposita.

Cucurbita emplastri modo adhibita.

Hydropiper admotum.

Thymus, Thymbraq; illita.

MATTHIOLI.

Abinthium in tegula calefactum & ui

X 3 no

Tumorum præter naturam.

no aspersum adalligatum.

Cari seminis farina ex melle, aut sapa decocta, & imposita.

Fabarum farina vna cum anthemide & betonica ex defruto decocta & emplastri modo adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad sugillata.

Caseus recens illitus.

Succida lana oleo, acetove perfusa.

Fabarum farina ex melle & fœnogreco.

Lupinorum farina adhibita.

Raphanus ex melle.

Allii cinis ex melle.

Sinapi illitum.

Hydropiper impositum.

Ptarmica cum floribus illita.

Bulbi per se, aut ex oui vitello.

Rhaponticum ex aceto.

Aloe ex melle.

Laserpitii liquor illitus.

Abfinthium ex melle.

Aqua maris calida fotu adhibita.

Hyslopum ex feruenti aqua.

Calamintha ex uino.

Amaraci siccata folia ex melle.

Cuminum erraticum comman sum ex melle, & passa uua illitum.

Ammi

Tumorum præter naturam. 244

Ammi ex melle.

Thapsiæ succus, & radix cum thuris & cere æquali portione duabus tantum horis imposita, & subinde marina aqua fotu adhibita.

Bryonia ex oleo decocta quousque li-
quescat.

Sal ex melle illitum.

MATTHIOLI.

Triticum cum radícula commansum
& impositum.

Lupini ex aceto decocti, & impositi.

Ari radix cum fabacea farina ex defru-
to, subacta.

Succisa trita, & illita.

Vulnerum.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera conglutinanda.

Cupressi folia trita.

Ulmī folia, sed multo magis corticis ti-
lia si fasciæ loco intorqueatur.

Sycomorī liquor illitus.

Amurca in cupreo, uasē decocta il-
lita.

Palmulæ immaturæ adhibitæ.

X 4

Viticis

Vulnerum .

Viricis folia, & semen imposita.
Punicorum cytini impositi.
Thus inspersum.
Lanæ cinis impositus.
Sylvestris brassicæ folia imposita.
Argemone illita.
Glycyrrhizę succus illitus.
Centaurii maioris recens radix imposita .
Centaurii minoris folia tusa, & illita.
Achillea imposita.
Poterii radix concisa, illita.
Smyrniæ radix imposita.
Aloe in puluerem inspersa.
Sarcocolla adhibita.
Polycnemon ex aqua impositum.
Polium emplastri modo inditum.
Scordium appositum.
Equiseti folia inspersa.
Lonchitis folia applicata.
Althea in vino, aut mulsâ aqua decocta imposita.
Sideritis folia admota.
Chamæpitys ex melle adhibita.
Sideritis altera imposita.
Polygonum emplastri modo impositum .
Polygonatū emplastri modo admotū.
Symphytum petreum inditum.
Symphytum alterū emplastri modo adhibitum.
Clymeni succus impositus.

Sideritis

Sideritis quęlibet illita.
Lycopsis radix cataplasmatibus indita.
Ocimi semen illitum.
Graminis radix concisa, & adhibita.
Conyza illita.
Quinquefolium adhibitum.
Coccum infectorium tritum, & insper-
sum.
Verbenaca illita.
Erigeri folia, & flores cum thuris man-
na adhibita.
Verbasci folia ex aceto.
Spongię recentes sine pinguedine ex
aqua, uel posca.
Succida lana vino, aceto, oleove insu-
sa.
Dracunculi folia ex vino decocta.
Isatidis folia illita.
Stratiotes millefolium impositum.
Morochthus lapis inspersus.

MATTHIOLI.

Oleum stillatitium e larigna resina, aut
abiegna.
Abiegna lachryma.
Terebinthina resina.
Pix arida.
Cupressi folia, germina, coni recentes,
& molles.
Vlmi folliculorum conclusus liquor il-
litus.

X s Papyrus

Vulnerum.

Papyrus oxycrato, vinove macerata.

Tiliæ cortex cōmansus, & deinde illitus

Cisti folia imposita.

Hypocistis.

Licis rubentes pilulæ cum aceto tritæ
& impositæ.

Querna folia adalligata.

Mespili folia sicca, & in puluerem
asperfa.

Corni folia eodem modo adhibita.

Oleum e terrenis uermibus addito bal
samo factitio; aut oleo terebinthino.

Cyani maioris folia, & succus.

Tragopogoni succus, aut stillatitia
aqua.

Bursæ pastoris succus.

Ophyoglossum impositum, aut eius
oleum illitum.

Omphacinum oleū in quo ophyoglos
sum diu fuerit insolatum, addita la
chryma abiegna.

Chelidonii maioris puluis inspersus.

Centaurii magni radix.

Veronica mas.

Gratiola trita, & illita.

Flos solis.

Rosmarini succi farina inspersa post
ablutionem e suo ipsius decocto.

Aparinæ succus, aut siccæ puluis.

Trinitas herba tam hausta, quàm exte
rius usurpata.

Lunaria minor.

Hyperici

Vulnerum. 246

Hyperici flores, & semen, uel oleum.
Consolida maior, minor, & media.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Pyrola de qua prestantissimam potio-
nem uulnerariam habes lib. 4. cap.
16.

Virga aurea.

Potentilla.

Eupatorii uulgaris flores illiti.

Fragariæ folia, & radix.

Sanguisorba.

Pulmonaria.

Alchimilla

Ophris.

Bistortæ, & tormentillæ radices cum
vulneribus illitæ, tum etiam in po-
tionibus haustæ.

Oleum balsaminæ, siue momordicæ.

DIOSCORIDIS.

Ad fluxum sanguinis.

Syluestris oleæ foliorum succus admo-
tus.

Gallæ crematæ uino, aceto, aut muria
extinctæ, inspersæ.

Punicorum cytini impositi.

Perseæ arida folia illita.

X 6

Cupres-

Vulnerum.

Cupressus pilule cum arboris coma tri-
ta & admota.

Thus inspersum.

Ranarum crematarum cinis illitus.

Araneorum tela adhibita.

Caprarum montanarum fimus ex aceto.

Asininum sterco tum crudum, tum
crematum ex aceto.

Stœbis folia imposita.

Portulaca illita.

Plantago admota.

Idea radix adhibita.

Isatis folia inuncta.

Salvia apposita.

Galii flos inditus.

Androsæmi folia applicata.

Quinquefolium admotum.

Phœnix herba cum punicea lana cor-
pori adalligata.

Lichen herba adhibita.

Astragali radix indita.

Hyoscyami semen oboli pondere in
mulla aqua epotum.

Stratiotes millesfolium admotum.

Cinnabaris & sanguis draconis indi-
tus.

Alumen admotum.

Sulphur impositum.

Gypsum inspersum.

Spongiæ siccæ recentes, & uacuæ im-
positæ.

Spongiarum crematarum cinis ex pice.
Eretria

Eretria terra inspersa.
Stibium inspersum.

MATTHIOLI.

Pannus in annosis laricum caudicibus
prope medullam repertus admo-
tus.

Suberis cortex tritus, & ex calida aqua
bibitus.

Mespili ficca folia in puluerem aspersa.
Pili leporini e uiui uentre euulsi ulti, &
adhibiti.

Bursa pastotis tenui pulticula circumli-
ta, & in oleo frixa.

Centaurii magni radix.

Flos folis.

Lanugo xyli combusta, & illita.

Bistorta, uel tormentillæ puluis uulne-
ribus inspersus.

Consolida minor, & media imposita.

Sanicula quoquomodo adhibita.

Auricula ursi.

Pilosella.

Pyrola de qua præstantissimam po-
tionem habes vulnerariam. lib. 4.
cap. 16.

Potentilla quoquo modo vsurpata.

Gypsum inspersum.

Iaspis lapis nuda manu comprehensus.

Vulnerum.
DIOSCORIDIS.

Ad sanguinem ex cerebro
erumpentem.

Gallinaceorum cerebrū ex vino haustū.
Stibium tritum inspersum.

MATTHIOLI.

Vrticæ communis semen tritum & in-
spersum.
Xylum combustum.

DIOSCORIDIS.

Ad sangninis grumos.

Thymus impositus.
Thymbra illita.

DIOSCORIDIS.

Ad uulnera telis uenena-
tis illata.

Dictamni succus tum potus, tum instil-
latus

MATTHIOLI.

Ceruimus sanguis ex vino sumptus.
Cydonia mala deuorata.
Scorzoneræ succus potus vulneriq; infu-
sus.

DIOS-

Vulnerum. 248

DIOSCORIDIS.

Ad ossa nuda carne uestienda.

Iris Illyrica inspersa.

Panacis Herculei radix imposita.

Myrrha cum cochleæ carnibus per-
uncta.

MATTHIOLI.

Thuris cortex inspersus.

Myrrha cum thure, aloe, & sarcocolla.

Peucedani radix in puluerem trita, &
asperfa.

DIOSCORIDIS.

Ad unguera membranarum
cerebri.

Butyrum admotum.

MATTHIOLI.

Oleum rosaceum

Abiegna lachryma.

Oleum ex ouorum vitellis

Bellidis genera omnia.

Betonica tusa, & illita, & in unguentis
addita

Matrisylua eodem modo adhibita.

San-

Vulnerum.

Sanguisorbæ succus in unguentis additus.

Gumi elemi

Pilosella

Quinq; folium

Alchimilla

} in unguentis ad
dita

MATTHIOLI.

Ad uulnera carne replenda.

Iridis radice farina

Thus

Myrrha

Aloe

Sanguis draconis

Sarcocolla, (tex

Panacis radicum cor

} Rhodomellæ &
laricea resina ex
cepta, aut per se
se inspersa.

DIOSCORIDIS.

Ad nulnerum inflammationes.

Bubulus recens fimus ex pascuis sumptus, ac subinde in foliis inuolutus & in feruenti cinere calefactus impositus.

Pinorum, & picearum folia trita, & illita

Fabarum farina cataplasmatibus indita.

Lupinorum farina admota.

Stratiotes imposita.

Millefolium ex aceto illitum.

Labru

Vulnerum. 249

Labruscæ flores cataplasmati inditi.
Aerugo illita.

MATTHIOLI.

Rosaceum unguentum.
Caphura illita.
Ligustrinum oleum.
Maluæ folia cum salignis frondibus tri-
ta, & illita.
Ophioglossum recens, siccumve ex gal-
linaceo adipe illitum.
Cynoglossæ vulgaris recentia folia cir-
cum ligata, & quotidie bis repetita.

DIOSCORIDIS.

Ad infixæ uulneribus extrahend

Cochleæ terrestres cum suo operime-
to tussæ, & appositæ.
Silurî falsi caro admota.
Lacertæ concisum caput impositum.
Bulbi cataplasmati inditi.
Horminum ex aqua illitum.
Anagallis adhibita.
Narcissi radix cum lolii farina admota.
Aristolochia rotunda imposita.
Dictamnium admotum.
Gladioli radix superior ex uino, & the-
re illita.
Xyridis radix applicata.

Tragii

Vulnerum.

Tragii folia, semen, & liquor illita.
Pyncocomi semen cum polenta im-
positum.
Acutæ spinæ radix admota.
Arundinis radix adhibita.
Sinapi impositum.

MATTHIOLI.

Calami phragmitis radix cū bulbis ap-
posita.
Pectinis veneris radix cum malua tusa,
& adalligata.
Aristolochia rotunda illita.
Eryngii radix ex melle.
Verbasci semen, & folia in vino decocta
& imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad carnis excrementias.

Gallæ tritæ & inspersæ.
Palmarum nuclei exusti, loti q; illiti.
Erinacei marini operimenti cinis ad-
motus.
Crematæ purpuræ cinis inditus.
Conculæ Indicæ cinis illitus.
Smaridis piscis exustum caput im-
positum.
Lanæ crematæ cinis inunctus.
Scordium ficcatum inspersum.

Acs

Aes vltum impositum, Quin etiam aris

flos admotus.

Plumbum elotum.

Stibium.

Argenti spuma

Cerussa

Chrysocola

Ochra

Diphryges

Auripigmentum

Pumex

Corallium

Asii lapis flos siccatus

Pyrites lapis cum resina admotus.

trita, inspersa, il
lita vel quoquo
modo admota.

MATTHIOLI.

Alumen combustum.

Chalcanthum.

Mercurius præcipitatus.

Mercurius sublimatus.

Ellebori nigri farina.

DIOSCORIDIS.

Ad uulnera cicatrice
obducenda.

Cadmia elota inspersa uel illita.

Plumbum elotum impositum.

Argenti spuma.

MAT-

Vulnerum.

MATTHIOLI.

Alumen vstum.

Corallium.

Pompholyx.

Sandix ex plumbo parata.

Aerugo exusta.

Charta combusta.

Linteorum combustorum cinis.

Cucurbita ficca, & combusta.

Vini fax combusta una cum ficcis plantaginis radicibus.

MATTHIOLI.

Ad uulnera interna.

Phu in potionibus vulnerariis additū.

Flos solis potus.

Trinitas, & eius decoctum haustum.

Lunaria minor potionibus addita.

Bellidis genera omnia

Equisetum

Solidago omnis

Sanicula

Pyrola

Alchimilla

Pilosella

Virga aurea

Bistorta

Tormentilla

Dictamni albi

Fragariae

Caryophyllatae.

} in uino decocta
& epota.

} radices i potio
nibus additæ.

Potio

Ulcera. 251

Olla nostra de Pyrola in limonii com-
mentario descripta.

Ulcera.

DIOSCORIDIS.

Ad depascentia ulcera quæ Græ-
ci φαιδάρια uocant.

Pinī, piceæq; cortex cum calcantho tri-
tus, & illitus.

Lentisci decoctum fotu adhibitum.

Cupressi folia trita inuncta

Sabinæ utriusq; folia trita, & admota.

Rhamni cuiusq; folia imposita.

Cisti flores per se illiti.

Oleæ sylvestris folia trita, & adhibita.

Lignorum Marcor illitus.

Oliuæ maturæ exustæ, tritæ, & in-
spersæ.

Palmarum cortex siue inuolucrum admo-
tum

Myrti folia trita cum omphacino.

oleo, aut exiguo rosaceo ex uino im-
posita.

Amygdalæ amaræ ex uino inunctæ

Smaridis piscis crematum caput, tri-
tum, & illitum.

Garum piscium admotum.

Testudinis fel inunctum.

Loliacea

Vlcerum.

Loliacea farina cum sale, & raphano
illita.

Lini semen ex vino decoctum.

Erui farina admota.

Raphanus tritus inunctus.

Betæ folia imposita.

Plantago quoquo modo indita.

Dracunculi maioris radix concisa ex
melle, bryonia addita.

Asphodeli radix, & folia ex vino.

Anagallis trita adhibita.

Hederæ decocta folia, ex uino.

Chelidonii maioris radix & vino.

Isatidis folia superposita.

Aristolochia rotunda adhibita.

Chamaeleonis nigri radix cataplasma-
tis addita.

Pulegium virens appositum

Marum admotum.

Panacis asclepii flores, & semē illitum.

Pastinacæ erraticæ folia contusa ex
melle.

Coriandrum cum pane, polentave il-
litum.

Marrubii folia ex melle.

Tithymali characiæ lac inunctum.

Omphacium ex aceto illitum.

Cicutæ succus admotus.

Sedum maius adhibitum.

Sphondilium cum ruta appositum.

Polygonum superpositum.

Verbenaca ex aceto applicata.

Solani

Vlcerum. 252

Solani hortulani folia cum polétæ pol
line illita.

Acetum fotu adhibitum.

Acida muri a fotu imposita.

Petasites admota.

Aeris squamma inspersa.

Aerugo illita.

Sal tostum cum polenta adhibitum.

Salis flos inspersus.

Chalcitis illita.

Diphryges inunctum.

Asius lapis tritus ex aceto.

Alumen cum galle crematæ pari ponde
re ex aceti fêce.

MATTHIOLI.

Cochleæ contritæ, & illitæ.

Humani stercoreis aqua stillatitia &
oleum.

Lupini decoctum adhibitum.

Caninum stercus inspersum.

Plantaginis succus illitus.

Ari radicum succus.

Oleum è calcantho.

DIOSCORIDIS.

Ad ulcera diuturna.

Cisti flores per se illiti.

Centaurium minus illitum.

Panacis

Vulnerum.

Panacis Herculei acuminata radix imposita.

Viscum cum thure inunctum.

Chamædrys ex melle.

Lilii foliorum succus in æreo vase decoctus ex aceto, & melle.

Scordium tritum ex melle.

Anchusæ radix oleo in cocta ex cera.

Verbenaca trita ex melle

Astragali radix illita.

Thaliætri radix inuncta

Personatæ folia imposita.

Omphacium ex aceto.

Spogiæ recètes siccæ, & uacue impositæ.

Asii lapidis flos siccatus illitus.

MATTHIOLI.

Terebinthina.

Carioforum lignorum uermes.

Plantaginis succus.

Crespini Baccarum succus.

Bursa pastoris trita

Hypocistis.

Ladanum emplastri modo impositum.

Sylvestris oliuæ oleum.

Aqua in marcescentibus quercuum cavitatibus reperta.

Oleum è tritico.

Brassica imposita.

Chelidonii maioris puluis.

Aristolochia rotunda.

Aloe

Aloe cū sanguine draconis & myrrha.
 Veronica mas.
 Flos solis.
 Abrotonum vstum.
 Aparinæ siccae farina.
 Vtriusq; securidacæ farina.
 Consolide mediæ vel minoris folia, aut
 eorum succus.
 Sanicula
 Auricula urfi
 Pilosella
 Pyrola
 Caryophyllatæ succus admista ærugine
 Potentilla.
 Eupatorii vulgaris flores illiti.
 Fragariæ folia.
 Sanguisorba.
 Filicis farina inspersa.
 Oleum è calcantho.
 Oleum nostrum de antimonio.
 Mercurius præcipitatus.
 Mercurius sublimatus.

DIOSCORIDIS.

Ad malefica, dolosaq; ulcera.

Plantago quoquo modo imposita.
 Dracunculi concisa radix cum bryonia
 ex melle.
 Petasites illita.
 Psyllium tritum ex melle.
 Y Bryoniæ

Vlcerum.

Bryonie folia, fructus, radix cum sale im-
posita.

Filicis sceminae radix trita, & illita

Cadmie pulvis inspersus.

Salis flos illitus.

Asii lapidis flos ex melle.

Ostracites lapis ex melle.

MATTHIOLI.

Quernae suberinæq; glandes cum salsa
axungia illitæ.

Humani stercoreis stillatitia aqua, &
oleum stillatitium.

Caninum sterces inspersum.

Lupini cum suo decocto admoti.

Bursa pastoris

Ari radice succus.

Carduus benedictus tã potus, quàm ad
motus.

Vnguentum ex mortario, & pistillo plu-
beo ex rosaceo paratum.

Plumbum ustum, & elotum,

Chrysocolle factitia inspersa.

Oleum de chalcanto

Oleum de antimonio.

Mercurius præcipitatus.

DIOSCORIDIS.

Ad sinus, & fistulas.

Iris Illyricæ radice decocti infusum.

Suil-

Suillus adeps infusus.

Mel infusum.

Plantaginis succus impulsus.

Dracunculi maioris radice succus ex melle.

Aristolochia rotunda cum itide ex melle.

Spondilii ramenta circumligata sinuum callos erodunt.

Quinquefolium cum sale ex melle

Stratiotes millefolium infusum.

Tithymali Caracie lacteus succus indiths.

Omphacium cum aceto.

Chalcitis collyrii modo infusa

Cadmia illita.

Spongia recens sine pinguitudine ex decocto melle imposita.

Gentiana quoquo modo adhibita.

MATTHIOLI.

Aqua stillatitia lariceę lachrymę siue abiegnę infusa.

Oleum e tritico.

Plantaginis succus.

Bursa pastoris, & eius succus.

Hedere terrestris succus cum erugine infusus.

Caryophyllatę succus admista erugine.

Alchimilla

Oleum de calcantho.

Oleum de Antimonio.

Y 2

Mercurius

Vlcerum.

Mercurius præcipitatus
Mercurius sublimatus.
Calcanthi stillatitia aqua infusa.

DIOSCORIDIS.

Ad ulcera in callum indurata.
Capparis radix exiccata imposita.
Aerugo cum ammoniaco collyrii modo
adhibita.
Spongiæ aridæ lino ligatæ, & in penicil-
li modo imposita.

MATTHIOLI.

Anonidis radix trita, & imposita.
Mercurius sublimatus in unguentis ad-
ditus.

DIOSCORIDIS.

Ad ulcera ab erodentibus facta.
Lac omne, & præsertim bubulum illitū.

MATTHIOLI.

Oleum è luteis ouorum.
Cerussa elota
Argenti spuma
Calx pluries lota

} in unguentis addi-
ta.

DIO.

Ulcera. 255

DIOSCORIDIS.

Ad phthyriam.

Staphisagria trita, & ex oleo illita.

MATTHIOLI.

Argentum uiuum illitum

Piper ex salua inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad sordida ulcera.

Olea syluestris folia tusa ex melle.

Iris Illyrica ex melle.

Colymbades trita & imposita.

Resina terebinthina illita.

Pix liquida cum melle indita.

Erinacei marini operimentum exustum
impositum

Purpure cremata cinis illitus.

Conchule Indice cinis inspersus.

Orobi farina admota.

Br: sica cum fœnogræco, & aceto illita

Asphodeli folia, & radices imposita.

Capparidis cortex siccatus, & adhibitus.

Anemones radix illita.

Hederæ decocta folia ex vino.

Chelidoniū maius cū axungia admotū.

Aristolochia rotunda imposita.

Y 3 Liba-

Vlcerum.

Libanotidis radices siccatæ ex melle.
Ballote ex melle.
Marrubii folia ex melle.
Verbenacæ supinæ folia illita.
Narcissi radix cum erui farina ex melle.
Brionix radix, fructusq; cum sale admo-
ta.
Aerugo ex melle cocta, & imposita.
Aes vltum inspersum.
Vrtica utraq; illita.
Peucedani radix trita in spersa
Cadmia indita.
Mel illitum.
Pompholyx admota.
Muria indita
Alumen quoquo modo adhibitum.
Asii lapidis flos exiccatus, & illitus.

MATTHIOL

Terebinthina resina.

DIOSCORIDIS.

Ad Ambusta.

Platani pilulæ adipe exceptæ, & illitæ.
Ligustri foliorum decoctum fotu adhi-
bitum.
Cisti flores cum cerato impositi.
Acaciæ gummi ex ovo illitum pustulas
prohibet.

Myrt

Myrti folia cruda seu cremata cerato ce-
cepta.

Mori folia trita ex aceto illita.

Thus ex suillo adipe, uel anserino exce-
ptum.

Buccinae cinis illitus.

Mitulorū combustorum cinis admotus.

Conculæ Indicae cinis inunctus.

Calceamētorum ueterū cinis impositus

Suillus adeps inunctus.

Suillus cera, & rosaceo suba-
ctus
simus } Columbinus } cum lini semi-
 } Gallinaceus } ne ex oleo.

Sesamum ex rosaceo.

Malua decocta ex oleo.

Betæ uirentia folia illita.

Brassicæ cinis ex oni Albo.

Lactucæ Syluestris lacteus succus ex hu-
mano lacte.

Hederæ flores ex cera, Quin & decocta
folia ex vino.

Acanthi radix illita.

Rutæ syluestris semen, & folia admota.

Glutinum calida aqua maceratum illi-
tum pustulas prohibet.

Typhæ flos vetere suillo adipe eloto ex
ceptus.

Hemerocallis radix illita.

Altheæ folia ex exiguo oleo admota.

Hyperici semen, & folia imposita.

Ascyri semen, & folia adhibita.

Y 4

Androsæ

Vlcerum.

Androsami folia admota.
Anchuse radix in oleo decocta ex cera.
Helxine admota
Papaueris corniculati folia ex oleo.
Verbasci Syluestris folia cataplasmatibus
addita.
Stimmi ex recenti adipi illitum pustulas
prohibet.
Alumen ex aqua } pustulas prohi-
Sal ex oleo } bent.
Cimolia terra illita
Prygius lapis cerato exceptus.
Atramentum scriptorium ex aqua.
Cinnabaris & sanguis draconis illitus.
Gallii flos inunctus.
Lilii radix cremata ex rosaceo, Quin &
folia illita.
Cynoglossæ folia ex uetere suillo a-
dipe.
Sambuci prætenœra folia inuncta.
Narcissi radix ex exiguo melle.
Oleum ex cauatis asphodeli radicibus
decoctum illitum.

MATTHIOLI.

Ligustri foliorum decoctum
Oui album per se aut cum uitello, im-
positum addito rosaceo.
Oleum ex ouorum uitellis.
Hordei combusti cinis inspersus.
Lini seminis oleum ex aqua rosarum
elotum,

Vlcerum.

257

clotum, & illitum.

Cucurbite cinis.

Sambuci secundarius cortex.

Cānabis radix ī aqua decocta imposita.

Eadem recens cum recenti butyro trita,
& illita.

Verbasci florum stillatitia aqua illita

Vnguentum ē sambuci cortice inunctū
cuius parandi rationem habes lib. 4.
capite de sambuco.

Oleum ē fructu momordicæ, illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad fauos.

Peponis radix ex melle.

Nasturtium illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ficos.

Bulbi in cinere tosti, & cum capiti me-
narum cinere impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad intertrigines.

Calciamentorum crematorum soleq̃ il-
lite

Y S MAT-

Vlcerum.
MATTHIOLI.

Lithargyrium illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ulcerum inflammationes.

Aranei tela imposita.

MATTHIOLI.

Cynoglossi vulgaris succus una cum cerussa, & caphura illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad ulcera cicatrice obducenda.

Purpurarum crematarum cinis illitus
Mitulorum

Conculę indicę

Aloe inuncta.

Eupatorii folia concisa ex suillo adipe.

Filicis scemine radix sicca in puluerem aspersa.

Cadmia admota.

Aesustum impositum.

Squama eris inspersa.

Aerugo ex oleo, & cera.

Stimmi

Stimmi
Molybdena.
Argenti spuma.
Cerussa.
Chalcitis
Pumex
Fex uini cremata
Calx lota.
Corallium.
Asii lapidis flos.
Fornaceę teste tosteę

quoquo modo
adhibita.

MATTHIOLI.

Plumbum ustum elotum.
Corallii cinis impositus.
Diphryges illitum.
Alumen ustum.
Aerugo usta.
Calx pluries lota.

MATTHIOLI.

Ad ulcera morbi gallici.

Argentum uiuum in unguentis addi-
tum.
Argentum uiuū præcipitatū inspersum.
Argentum uiuum sublimatum.
Oleum nostrum de antimonio.
Calx lota.
Cinnabaris vulgaris.

Y 6 DIO-

Vlcerum.

DIOSCORIDIS.

Ad ulcera caua explenda.

Thus inditum.

Pix liquida cum melle.

Pix arida imposita.

Medulla ossium quadrupedum queli-
bet inuncta

Mel infusum

Cadmia inspersa

Corallium inditum.

Asii lapidis flos ex melle.

Eretria terra illita

Pumex inpersus.

MATTHIOLI.

Plumbum ustum elotum.

Corallii cinis impositus.

Thus

Myrra

Aloe

Iridis radix

Thuris cortex.

*Luxationum & fractu-
rarum.*

DIOSCORIDIS.

Ad artuum luxationes.

Harundinis radix cum aceto adhibita.
Personata

Luxationum & fracturarum. 359

Personate radix trita illita, dolores articulorum e contusionibus sedat.

Acaciæ decoctum fotu adhibitum.

Viticis semen cum foliis cataplasmatibus additum.

Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inunctum.

Asparagi radix ex aceto uel uino adhibita.

Cyclamini decoctum fomenti modo.

Bulbi cataplasmatibus more adhibiti.

Acanthi radices impositæ.

Sampsuchi folia cum cera cocta, imposita.

Anchusæ folia cum melle & farina apposita.

Vrtica utraque imposita.

Narcissi radix cum melle trita.

Vitis nigræ folia cum uino admota.

Filicula imposita.

Heliotropii folia linita.

Sarmentorum uitis, & uinaceorum cinis ex aceto linitus.

Sal cum farina & melle.

MATTHIOLI.

Fœnogræci farina cum hydromelite decocta addita axungia.

Plantaginis folia ex sale modico illita.

Primulæ ueris succus tum potius, tum illitus.

Thus

Luxationum & fracturarum.

Thus cum Armenia terra, & sanguine
draconis, oui albo subactum & em-
plastri more illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ossa fracta.

Myrti foliorum decoctum fotu admo-
tum.

Succida lana oleo, vino, acetoq; perfu-
sa & adhibita.

Verbasci decoctum epotum.

Fuligo pictoria cum rosaceo cerato
imposita.

Ulni foliorum, aut corticis radicum de-
coctum perfriatum.

MATTHIOLI.

Primulæ veris succus tam potus, quàm
illitus.

Lapis ad ossium fracturas descriptus,
lib. quinto commento de lapide mo-
rochtho.

Symphyti maioris radix contusa, & cir-
cumligata.

Geranii florem ceruleum gerentis ra-
dix contusa cū axungia & applicata.

Qua recentia rude agitata additis thu-
re, aloë, sanguine draconis, & Arme-
nio bolo.

Diosco-

Luxationum & fracturarum. 260

DIOSCORIDIS.

Ad ossa fracta euellenda.

Aristolochia rotunda cataplasmatibus
more imposita.

Peucedani radix in pulverem imposita.

Euphorbium impositum.

Xyridis radix addito flore æris.

Bryonia trita & imposita.

Vitis nigræ radix.

MATTHIOLI.

Iridis radix trita, & imposita.

Dictamnus tum potum, tum illitum.

Mercurius præcipitatus impositus.

DIOSCORIDIS.

Ad eos qui ab alto deuoluntur.

Gentianæ radicis succus drachmæ pon-
dere haustus.

Baccharis radicis decoctum potum.

Millefolium cum aqua, & sale potum.

Lixiuum ex cinere sarmentitio factum
cum aceto, sale, & melle.

MATTHIOLI.

Mumia cū cassiæ solutiæ, pulpa lemnia
sphragide, & rubæ radice deuorata.
Camma-

Luxationum, & fracturarum.

Cammarorum lapilli cum tilia carbonibus sumpti.

Plantaginis folia non solum illita, sed, & deuorata.

Cyani maioris puluis ex aqua plantagini s aut symphyti absorptus.

Cyclaminis stillatitia aqua cum saccharo epota.

Rhabarbarum cum mumia, & erithrodani radice haustum.

Aristolochia rotunda.

Vincetoxici radices ex uino aut symphyti maioris decocto ebibitæ.

Lunaria minor potu sumpta.

Bistortæ, uel tormentillæ succus, aut puluis ex symphyti maioris aqua haustus.

Consolida minor, & media in potionibus uulnerariis addita.

Sanicula

Auricula vrsi.

Pilosella

Virga aurea.

Potentilla.

Alchimilla.

Ophris.

} quoquo modo sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad ruptos.

Acori decoctum potum.

Cardamo-

Luxationū, & fracturarum. 261

Cardamomum ex aqua epotum.

Calami odorati decoctum cum graminis aut apii semine bibitum.

Helenii radices in eclegmate cum melle deuoratę.

Bdellium haustum.

Iuniperi baccę bibitę.

Cedrides deuoratę.

Halimi radix drachmę pōdere in aqua mulsa pota.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle sumpta.

Asphodeli radix drachmę pondere in uino pota.

Bulbi elixi in aceto & in cibo sumpti.

Agaricum trium obolorum pondere cum mulso deuoratum.

Gentianę radice succus drachmę pondere haustus.

Aristolochia rotunda bibita.

Serpillum potum.

Cętaurii maioris radix cū uino epota.

Acanthi radices ebibitę.

Smyrnii radix comesta, uel pota.

Leucacanthę radices ex uino decoctū epotum.

Abrotoni semen ex aqua potum.

Origanum cum ficu deuoratum.

Equiseti radix, & folia pota.

Calaminthę decoctum haustum.

Baccharis radice decoctum bibitum.

Libanotis radices potę.

Sagapenum

Luxationum & fracturarum.

Sagapenum bibitum.
Laserpitii liquor cum lixiuio potus.
Galbanum deglutitum.
Polycnemon cum uino bibitum.
Scordium additis nasturtio, melle, resinaq; deuoratum.
Althææ decoctum potum.
Alcææ radix in uino, uel aqua pota.
Betonicæ folia drachmæ pondere in aqua dulci bibita.
Symphytum petreum cum aceto mulso potum.
Symphyti radix pota.
Xyridis radix ex mulso epota.
Helichrysi coma in uino ebibita.
Verbasci decoctum potu sumptum.
Bryonia cum melle in eclegmate deuorata.
Schistus lapis haustus.

MATTHIOLI.

Ophioglossum ex equiseti aqua potum.
Rhabarbarum cum munia, & rubiæ radice haustum.
Vincetoxici radices ex uino aut maioris symphyti decocto epotæ.
Lunaria minor ebibita.
Bistortæ, & tormentillæ radicum puluis ex symphyti maioris aqua potus.

Sanicula

Luxationum & fracturarum. 263

Sanicula.
Auricula vrsi.
Pilofella.
Virga aurea.
Potentilla.
Alchimilla.
Ophris.
Perfoliata in uino decocta, aut in pulue
rem trita, & epota.

} quomodolibet
sumpta.

MATTHIOLI

Ad caluariæ fracturam.

Gummi elemi.
Pilofella & eius succus in unguentis
additus.
Ophris quoquo modo illita.

Venenorum.

DIOSCORIDIS.

Ad omnium uenenorum mor-
sum aut ictum.

Iridis Illyricę radix ex aceto pota.
Cardamomum ex uino epotum.
Nardus celtica cum absinthii decocto
hausta.
Phu antidotis inseritur, quæ uenena-
tis

Venenorum

tis resistunt morfibz.

Cinnamomum bibitum.

Cassia potui data.

Helenii radice decoctum potum.

Bdellium potui datum.

Platani pilulæ ex vino haustæ.

Ericæ flores poti, quin etiam coma.

Viticis semen in potu sumptum.

Glandes esitæ.

Nuces comestæ.

Sycomori lachryma illita.

Ficulneum lac plagis inditum.

Pix liquida cum trito sale illita.

Paliuri foliorum, & radices decoctum haustum.

Gallinaceorum cerebrum cum uino potui datum.

Eruca, quæ in oleribus reperiuntur ex oleo illitæ.

Coagulum	{	Leporinum.	{	potū ex uino tri um obo lorū pō dere.
		Agninum.		
		Hinnulinum.		
		Aprinum.		
		Ceruinum.		
		Vitulinum.		
		Bubalinum.		
{	Hædinum.	{		
	Capræ lati- cornis.			

Marine testudinis sanguis cum leporino coagulo, & cumino potus.

Mel ex calido rosaceo bibitum.

Triticea

Triticea farina ex aceto & uino imposita.

Porri succus ex melle sumptus, quinetiā & coma illita.

Porrum sylvestre esitatum.

Piper quoquo modo sumptum.

Eryngium ex uino haustum.

Teucrium ex aceto inunctum.

Argemone ex uino epota.

Agaricum trium obolorum pondere ex uino haustum.

Rhaponticum potui datum.

Chamedrys ex uino bibita.

Gentianæ radix drachmę pondere cum pipere, & ruta ex uino pota.

Aristolochia longa drachmę pondere potui data, & etiam plagæ admota.

Origani decoctum haustum.

Leucas ex uino sumpta, uel cataplasma tis addita.

Pulegium ex uino potui datum.

Dictamni succus ex uino propinatus.

Baccharis radix ex uino hausta.

Panacis herculei semen cum aristolochia sumptum.

Ligustici tum radix tum semen haustum.

Pastinacæ erraticæ semen potui datum.

Anisum epotum.

Asclepiadis radices ex uino sumptæ.

Cuminum ex uino haustum.

Ammi cum uino potui datum.

Delphinium

Venenorum.

Delphinium morsui admotum.
Laserpitii liquor tum inunctus, tum
epotus.
Galbanum inunctum homines tutos
reddit.
Clinopodium haustum.
Trifolii bituminosi folia ex oximelite
sumpta.
Polii decoctum ebibitum.
Betonice folia trium drachmarū por-
dere ex uini sextariis hausta uel ad-
mota.
Poligoni succus potus.
Clematis prima illita.
Sparganii radix ex uino pota.
Acida muria plagæ indita.
Terra lemnia hausta.
Sal cum origano, melle, & hyssopo il-
litum.

MATTHIOLI.

Phu radix non modo hausta, sed & ol-
facta.
Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Myrrha ex uino hausta.
Caphura epota.
Dictamni albi radices sumptæ.
Oleum nostrum e scorpionibus cordi
& arteriis illitum.
Humani stercoreis stillatitia aqua bi-
bita.

Scorzoneræ

Venenorum. 264

Scorzoneræ foliorum, & radicum succus ebibitus.

Porri folia melle subacta, & imposita.

Caryophyllorum flores saccharo conditi, & deuorati.

Zedoaria cum pota, tum exterius illita.

Boni henrici succus hauſtus.

Agaricum tum foris illitum, tum hauſtum drachmæ pōdere cū uino diluto.

Cruciatae radices.

Dictamnus albus.

Mentastri folia tam pota, quàm illita.

Galega contusa, & uulneri adalligata, seu eius succus epotus.

Imperatoriae radix.

Vincetoxicum.

Carduus benedictus tam intro ſumptus, quàm iſto loco adhibitus.

Securidacæ utriusque ſemen potum.

Hypericum cum intus ſumptum, tum exterius demorſo loco illitum.

Biſtorta.

Tormentilla.

Angelica.

Boraginis.

Vulgaris bugloſſi. } ſuccus epotus.

Quinta eſſentia noſtra in præſatione lib. 6. deſcripta ſemiunciae pondere.

Galli, uel gallinae podex deplumatus & uulneris ſuperpoſitus repetitis tot galliſ quouſque ſat ſint ad reuocandum uenenum.

Theriaca

Venenorum.

Theriaca.

Mithridatis antidotum.

Calx uino oleo, & melle subacta illita.

Ellebori nigri radix uulneri infixa.

Capa

Allium.

Asphodeli radix

Dracunculi radix.

} Elixæ, & contu-
sa moribus ad-
hibita.

Radices { Iridis
Ari
Phu
Chamæleonis.
Lilii.
Hemerocallis.
Helenii.
Fœniculi.
Smyrni.
Gladioli.
Scillæ.
Sparganii.
Cyclamini.
Brionię.
Raphani.
Bulbaceorū oīum

conci-
sæ ac
deco-
ctæ &
uulne-
ribus
illitæ.

Citria mala deuorata.

Serpentine siue syluestris coronopi ra-
dix epota.

Theriaca Andromachi.

Superstitiosum remedium eremite cu-
iusdam, uide lib. 6. cōmento commu-
nis curationis in omnes uirulentos
ictus.

Lapis

Lapis bezahar duodecim granorum
pondere haustus, & uulneri illitus.

Sordes in ceruorum oculorum angulis
reperita pota, & illita.

Melitea terra pota ex uino.

Antidotum nostrum lib. 6. in præfatio-
ne discriptum ex uino.

Potio ex antidoto nostro, & aqua uitæ
eodem in loco descripta.

DIOSCORIDIS.

Ad uiperarum morsum.

Costus semuncie pondere potus.

Cassia potui data.

Pix liquida illita.

Iuniperi folia, & foliorum succus potui
datus.

Fraxini folia, uel eorum succus haustus.

Lauri folia admota.

Abrotanum illitum.

Galbanum splenii loco super ictum lo-
cum adhibitum.

Origanum uirens inditum.

Pulli gallinarum discerpti, & confestim
admoti.

Anthemis detrita cum hordeacea fari-
na, & mulso aceto cataplasmatibus mo-
do admota, sed locus antea aceto mul-
so calido foueatur.

Rubi folia ex uino illita.

Z Porri

Venenorum .

Porri succus ex meri hæmina haustus.

Apiastri succus ex uino epotus.

Leporis coagulum potui datum.

Omotarichi piscis salitæ carnes in cibum sumptæ, hausto deinde copiofiore uino, quinetiam admotæ.

Cerui genitale tritū, & ex vino sumptū
Vrina ipsiusmet demorsi bibita .

Furfures triticei in decocto rutæ elixi
admoti .

Erui farina ex uino macerata illita.

Raphanus inunctus.

Brassicæ succus cū nitro & iride potus.

Chondrylla manducata.

Allium ex uino sumptum. .

Scilla decocta in aceto, & imposita.

Anagallidis succus ex uino haustus.

Ferulæ medulla in vini potione sumpta

Aparinæ succus ex uino potui datus.

Rubię radicis succus cum foliis potus.

Tribuli terrestres succus drachmæ pondere potus, plagęq; admotus.

Anchusæ Alcibiadis nomine folia radicesq; tum comesta, tum bibita, tum adalligata.

Ocimastris semen ex uino haustum.

Sambuci, Ebuliq; radix ex uino cocta potui data.

Bryonię radix duarum drachmarum pondere hausta.

Vitium sarmentorum cinis ex aceto illitus .

MATTH-

MATTHIOLI.

Lapis Bezahar tam potus quàm illitus.
Sordes in angulis oculorū cerui reperta
tum pota, tum etiam illita.

Antidotum nostrum in lib. 6. præfatio-
ne descriptum potum.

Potio ex antidoto nostro, & aqua uitæ
ibidem descripta.

Viperei pastilli poti.

Oleum nostrum de scorpionibus cor-
di, & arteriis illitum.

Theriaca Andromachi uino epota.

Allium plurimū deuoratum ante cruen-
tam urinam.

Vinum meracum copiose bibitum exci-
tatis uomitibus.

Vipera ipsa excoriata rescissis capite,
& cauda, interioribusq; exemptis, &
anguillarū more cocta, & deuorata.

Viperæ uiuæ caput amputatum molli-
cula prehensum, & morsui ad alliga-
tum ea parte adhuc calente quæ a re-
liquo corpore abscissa est.

Gallina uiua dissecta, & calens morsui
imposita.

Cucurbitula loco demorso apposita.

Fraxini foliorum succus potus post ap-
positam cucurbitulam, & expræssa
a succo folia uulneri illita.

Melissophylli folia, & succus tum ex ui-
no potus tum exterius illitus.

Z 2 Melanthii

Venenorum.

Melanthii drachmæ quatuor haustæ.

Cancris fluuiatiles cum lactæ triti, & epoti,
ti, ac uulneri quoq; illiti.

Ranæ coctæ, & in cibum sumptæ, epoto
deinde earum iure.

Testudinis sanguis exiccatus cum sylue-
stri cumino potus.

Anchusæ radix in potionibus addita.

Hematites lapis haustus.

Heliotropium cum uino ebibitum.

Raphani in cibo accepti, & deinde vomini-
tione reiecti exhibita statim Andro-
monachi theriaca.

Trifolii bituminosi decoctum fotu adhi-
bitum.

Allium cum aceto, aut suo ipsius, aut
fraxini cinere cum pane illitum.

Hastulæ regiæ radices tusæ, & illitæ.

Sicomori folia cum pane imposita.

Lauri tenella folia cocta, & oleo subacta
& applicata.

Vipera tota contusa, & uulneri adalli-
gata.

Echii epotus succus, & herba ipsa im-
posita.

DIOSCORIDIS.

Ad serpentiū, & aspitū morsum.

Cancris fluuiatiles crudi, tritiq; cū asini

no

no lacte potui dari.

Equi fluuiatilis testiculus potus.

Castorium bibitum.

Mustelle salite, & in umbra exiccate puluis drachmarum duarum pondere ex uino sumptus.

Ranę cum sale in oleo decoctę comese.

Gobius piscis deuoratus.

Cinices lectularii septem quoquo modo hausti.

Aprinum iecur, & recens, & ficcum ex uino sumptum.

Gallinaceorum carnes dissectę, ita ut tepiebunt appositę, crebroq; mutatę.

Butyrum illitum.

Caprarum montanarum fimus in uino uel aceto decoctus illitus.

Mel ex calido rosaceo bibitum.

Asphodeli radix trium drachmarum pondere sumpta. Quin etiam & folia flores, & radices in cataplasmatibus addita.

Nasturtium haustum.

Spinę albę semen potum.

Abrotanum sumptum ex uino.

Hyslopum tritum cum melle, sale, & cumino impositum.

Nepeta pota, uel cataplasmatibus indita.

Panacis Asclepii semen cum floribus haustum, & inunctum.

Panaces chyronium bibitum, & illitum.

Hieracii succus ex uino potus.

Z 3

Elapho

Venenorum.

Elaphobosci semen in uini potionem
sumptus.

Euphorbium incisa capitis cute ad os
usque in uulnus impositum statimq;
consutum.

Lentopetalum bibitum illico dolorem
aufert.

Lilii folia illita.

Melissophyllum ex uino haustum, &
plagæ admotum.

Marrubii folia hausta.

Serpylum tum potum, tum imposi-
tum.

Ruta cum nucibus iuglandibus, & ca-
ricis sumpta.

Phyllitis ex uino bibita.

Smyrni radix illita.

Foeniculum ex uino sumptum.

Sagapenum in uino potui datum.

Libanotis radices cum uino epotæ.

Scordium siccatum ex uino potum.

Conyza illita.

Clematis in aceto bibita.

Echii radix ex uino pota. Præpota uerò
demorderi prohibet, ad quod præ-
stant semen, & folia.

Ocimestri semen potum.

Eupatorii semen, & folia in uino sum-
pta.

Helichrysi coma ex uino bibita.

Verbenacæ supinæ radix, & folia ex ui-
no hausta, tum etiam admota.

M andra-

Venenorum. 268

Mandragoræ radix ex melle, aut oleo
illita.

Nerii radix ex uino pota.

Acetum calidum fotu adhibitum ubi
illatum venenum frigidum sit. frigi-
dum uero, ubi calidum.

Adianti decoctum ebibitum.

Aqua maris fotu adhibita.

Sal cum origano, melle, & hyssopo in-
unctum.

Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

Samia terra ex aqua pota.

Ophites lapis pro amuleto gestatus.

MATTHIOLI.

Myricæ fructus potus.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi
& arteriis inunctum.

Gallinaceorum depulmatus podex pla-
gæ appositus.

Sordes ex angulis oculorum ceruorū
exemptæ, haustæ, & illitæ.

Cicerum farina cum hyperico decocta
& imposita.

Maluæ folia cum porris, & cepis illita.

Betæ nigræ succus cum potus tū illitus.

Serpentinæ radix ex vino sumpta.

Scorzoneræ foliorum, & radicum suc-
cus haustus.

Porri folia melle subacta, & illita.

Sinapis farina ex aceto imposita.

Z 4 Caryo-

Venenorum.

Caryophyllorum syluestrium radices
ex mieraeco sumptæ.

Centaurii magni radicis succus uncie
pondere haustus, ac etiam uulneri il-
litus.

Hysopum cum sale, & cumino tritum
& ex melle uulneri illitum.

Mentha græca.

Hieracii succus ex uino potus.

Eiusdem folia tosta thyrsiq; triti & ex
aceto hausti.

Pæoniæ radix uel semen tam potum
quàm admotum.

Bistortæ, & tormentillæ radices potæ,
& exterius illitæ.

Scabiosa tusa, recensq; illita.

Angelicæ radix cum ruta imposita.

Staphidis agriæ flores, & folia tum po-
ta, tum illita.

Melitea terra ex uino epota.

Antidotum nostrum in præfatione lib.
6. descriptum.

Potio ex antidoto nostro ex aqua uite
ibidem descripta.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi
& arteriis illitum.

Allium cum zito tritum ad nauseam
usque potum, & uomitione reiectum.

Opoponax potum cum uino, & uomi-
tione redditum.

Origanum cum uino haustum.

Centaurium minus cum myrrha, &
opii

opii momento plagæ impositum.

Rumex contrita, & cataplasmatibus modo adhibita.

Theriaca tum pota, tum illita.

Quinta essentia nostra in præfatione sexti lib. descripta, & pota.

MATTHIOLI.

Ad dipsadis morsum.

Antidota omnia quæ uipereis moribus succurrunt.

Oleum potum, & uomitione redditum

Emplastra attractoria plagæ imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad hemorrhoi morsum.

Allium bibitum, & illitum.

Merum copiosius haustum.

Vitium uiniferarum folia decocta, & ex melle subacta, imposita.

MATTHIOLI.

Alliū copiose deuoratum } anteq̃ cruēta
Vinum dilutum libera- } sit urina &
lius potum. } deinde uomi-

Theriaca sumpta. } tiōe reddita.

Pisces copiosi allio, & oleo perfusi in cibis sumpti.

Z, DIOS.

Venenorum.

DIOSCORIDIS.

Ad cerasæ morsum.

Sesamum cum rosaceo inunctum.
Raphani semen ex uino bibitum.
Sal cum cedria, aut pice aut melle illi-
tum.

MATTHIOLI.

Antidota omnia, quæ viperæ mor sibus
conueniunt.

MATTHIOLI

Ad tarantulæ morsum.

Antidota omnia, quæ phalangiorum
ictibus resistunt.
Musica instrumenta, & continua tripu-
dia, & saltationes ad lassitudinem us-
que.

DIOSCORIDIS.

Ad scolopendræ morsum.

Aspodeli radix, & semen, ex vino pota.
Sal ex melle, & aceto illitum.
Ruta sylvestris admota quin & ex vi-
no ebibita.

Muria

Muria acida fotu adhibita.
Aristolochia ex vino pota.
Serpillum potui datum ex vino.
Calamintha ex mero hausta.

MATTHIOLI.

Cinis ex aceto subactus, & uulneri im-
positus.
Scilla imposita.
Pulegium.
Ruta.
Mentha.

} ex vino pota.

DIOSCORIDIS.

Ad dryini morsum.

Aristolochia cum vino hausta.
Trifolii bituminosi folia in potu sum-
pta.
Asphodeli radix potui data.
Glandes quæcunq; bibitæ.
Ilicis radices tuscæ, & icto loco illitæ.

MATTHIOLI.

Antidota omnia quæ viperæ morsibus
conueniunt.

Quercus foliorum succus potus, aut stil-
latica eorum aqua.

Z 6 DIOS

Venenorum.
DIOSCORIDIS.

Ad natricis morsum.

Origanum tritum, & aqua subactum
ex lixiuio, & oleo inditum.

Aristolochiæ cortex minutim contri-
tus cum querna radice, & hordei fa-
rina ex melle illitus.

Aristolochiæ binæ drachmæ in potio-
ne poscæ potæ.

Marrubii succus ex uino haustus.

Fauus recens ex aceto sumptus.

MATTHIOLI.

Cupressi pilulæ drachmæ pondere una
cum baccarum myrthi tantundem
ex rhodomelle aut uino mulso potæ.

Calx uiua ex oleo illita.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi
arteriis, & uulneri illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad cenci morsum.

Lactucæ semen cum lini semine illi-
tum.

Satureia cum syluestri ruta, & serpyll-
lo, & asphodeli radice ex uino sum-
pta.

Gentiana

Gentiana potui data
Cardamomum deuoratum.

DIOSCORIDIS.

Ad muris aranei morsum.

Mus araneus ipse discerptus, & impositus.

Allium cum ficulneis foliis, & cumino appositum.

Abſinthium ex uino hauſtum.

Chryſogoni radix concifa, & ex aceto imposita.

Galbanum in ſplenio admoſum.

Hordeacea farina ex aceto mulſo illita.

Punicæ dulcis acini decocti & adhibiti.

Porrum contritum, & impositum.

Abrotani decoctum ex uino hauſtum.

Serpyllum ex uino potum.

Eruca ex uino ſumpta.

Cupreſſi recentes pilule ex aceto potui datae.

Cyclaminus ex aceto mulſo ſumptus.

Pyrethrum ex uino epotum.

Chamaeleonis radix ebibita.

MATTHIOLI.

Erucae ſemen tritum & impositum.

Cuminum cum allio ſimul cum putamine.

Venenorum.

tamine tuso adhibitum.

Mus ipse araneus laceratus & impositus

Radix { Gentianæ } ex uino pota &
 { Panacis } illita

Capparidis cortex tam potus quam illitus.

Verbenacæ rectæ succus potus.

Theriaca deuorata.

Mithridatis antidotum insumptum,

DIOSCORIDIS.

Ad pastinacæ, & draconis marini ictum.

Saluię decoctum potum.

Simplicia omnia, quæ viperinis moribus conueniunt.

Absinthij, aut sulphuris ex aceto decocti potio.

Animalia ipsa dissecta suo cuique ictui ad mota.

Mullus pissis dissectus, & impositus.

Ocimum cum polenta, & aceto impositum.

Plumbum confricatum.

Sulphur admotum.

MATTHIOLI.

Furfures aceto incocti, & impositi.

Acetum

Acetum calido fotu adhibitum.
Fermentum acidum ex liquida pice im-
positum.

Lauri foliorum decoctum haustum
Marrubium cum lauri foliis, & chio po-
tum.

Panacis radix cum salvia deuorata.
Fici lactis guttæ quinque; cū tribus serpyll-
li granis epotæ.

Saluæ decoctum potū pluribus diebus.
Scordium ex suo ipsius decocto potum.

Theriaca deuorata.
Mithridatis antidotum insumptum.
Quinta essentia nostra cū antidoto no-
stro parata.

Anchusæ folia	}	
Quinquefolium		
Rubi flores		
Arctium		
Oxalis		
Lycopsis		
Tordilium		
Chamæpitys		
Fagi cortex		plagis illita
Pastinacæ agrestis semē		& intus sum-
Terebinthi fructus	pta.	
Phycus marinus	}	
Smyrnium		
Eryngium		
Libanotis		

DIOS-

Venenorum.
DIOSCORIDIS.

Ad mustelæ morsum.

Eruca comesta, & desuper uinum odori-
ferum haustum.

MATTHIOLI.

Vincetoxici radices epotæ.

DIOSCORIDIS.

Ad basilisci morsum.

Castoreum drachmæ pondere ex uino
ebibitum.

Papaueris succus haustus.

DIOSCORIDIS.

Ad calcidicę lacertæ
morsum .

Portulaca percocta deuorata, & illita.

MATTHIOLI.

Antidota omnia, quę uipereis morsibus
succurrunt.

Portulaca plurima in cibo deuorata.

Vinum myrtite meracius bibitum.

Acetum

Venenorum. 273

Acetum ealidum cum spongia fotum.

MATTIOLI.

Ad ammoditæ morsum.

Mentha ex aqua mulsa pota.

Cassia odorata } ex frigida pota.

Castoreum

Artemisiæ succus cum aqua epotus.

Theriaca Andromachi tum deuorata,
tum illita.

Medicamenta quæ trahendi uim possi-
dent imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad canis rabidi morsum.

Lycium in catapotio datū aut ex aqua
bibitum.

Cancrorum fluuiatilium cinis cochlea-
rium duorum pondere ex gentianæ
radicis momento per triduum cum
uino potus.

Smaridis piscis salsa caro.

Omotarichi piscis salitę carnes illitę.

Garum omnium piscium fomento ad-
hibitum.

Canis rabidi epar tostum, & in cibo sū-
ptum à metu aque præseruat.

Caninus sanguis ebibitus.

Canina

Venenorum.

Canina urina bibita.

Mel bibitum cum rosaceo calidum .

Triticum cōmanducatum & appositum.

Cæpæ cum ruta, sale, & melle mixta ad mota.

Allium cum uino potum, & cataplasma tis inditum.

Panaces Herculeum pici mistum, & cata plasmatis additum.

Feniculi radices concisæ, & ex melle im positæ.

Laser impositum

Ballote cataplasmatibus modo cum sale illita.

Melystophyllum cum uino bibitum, & cataplasmatibus inditum

Alyssum in edulio contusum.

Allium sylvestre in cibo sumptum, & il litum.

Salsamentum inditum.

Succus cyrenaicus.

MATTHIOLI.

Cancrorum fluuiatilium cinis quadra- ginta diebus cum gentiana & thu- re potus.

Pix brutia cum opoponace, & aceto im posita.

Humani stercoreis stillatitia aqua pota.

Oxylapathi decoctum fotu adhibitum, herbaq; ipsa illita, atq; una cum radi- cibus

cibus hausta.

Scorzonerae radix deuorata, aut eius succus haustus.

Hypopolathi radix quadraginta diebus pota, atq; etiam illita.

Vincetoxici radices quotidie fefquidrachmae pondere potę ex cardui benedicti decocto continuis quadraginta diebus.

Angelicae radix exterius cum ruta imposita, & intro in corpus sumpta.

Bitumen asphaltite drachmae pondere diebus pluribus continuis ex aqua epotum.

Hippocampus marinus ex aceto nigro & melic subactus tam potus quàm illitus.

Rumex fotu adhibita.

Theriaca Andromachi deuorata, & uulneri illita.

Potamogetum cum sale exterius illitū.

Artemisia

Absinthium

Allium.

Cetauriū min⁹

Aristolochia

Scordium.

Chamedrys

Bryonia

Pulegium.

Caprifici cortex contusus, & ex aqua potus.

} tam intus sumpta,
quàm exterius illita.

Ca-

Venenorum.

Cauterium actuale inustum.
Mercuri⁹ præcipitat⁹ uulneri inspersus.

MATTHIOLI.

Ad hydrophobiam, idest aquæ
timorem.

Veratri albi, aut nigri potiones.

Epithymum

Fumaria

Sena

Myrobalana

Elaterium

Agaricum.

Rhabarbarum

Centauriū minus

Genistæ semen

Thapsia

Armenius lapis

Bitumen iudaicum frequenter ex aqua
sumptum.

Coagulū { Leporis
 { Vulpis
 { Capreoli } haustum.

Catuli coagulum semel epotum.

Ciceris nigri decoctum copiose hau-
stum.

Mithridatis antidotum

Theriaca Andromachi

DIOS-

DIOSCORIDIS.

Ad canis non rabidi
morsum.

Amygdalę amarę ex melle exceptę .
Mitulorum caro imposita.
Gobius piscis impositus.
Orobi farina uino macerata indita.
Plantago cataplasinatis modo adhi-
bita
Cucumeris folia iniposita
Bulbi cū melle, & trito pipere cataplas-
matis more appositi.
Mentha applicata.
Vrtica utraq; cum sale adhibita.
Cynoglossi radix, & folia cum suillo
adipe ueteri imposita.
Sambuci & ebuli folia illita.
Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

MATTHIOLI.

Hyppelapathi radix trita, & ex meraco
uulneri illita.
Marrubii folia cum uteri axungia trita
& applicata.
Canis qui non momorderit pili excisi
& uulneri adalligati.

DIOS-

Venenorum.
DIOSCORIDIS.

Ad phalangiorum morsum .

Myricæ fructus poti.
Myrtus ex mero hausta.
Mori foliorum succus cyathi mensura
epotus .
Lixiuum ficulnei cineris potum adie-
cto sale trito, & uino.
Cancris fluuiatiles crudi; tritiq; cum as-
nino lactæ poti.
Mullus piscis dissectus, & impositus.
Maluæ decoctum illitum.
Myrrhis ex uino hausta.
Asparagi radicum decoctum ex uino
haustum
Lactucasiluestris bibita .
Coris semen in uino potum.
Hederæ succus cum aceto ebibitus.
Abrotanum cum uino haustum.
Dauci semen ex uino sumptum.
Nigella drachmę pondere cum aqua
pota.
Aparine ex uino insumpta.
Melissophyllum cū uino bibitum & ca-
taplasmatis modo adhibitum.
Phalangii folia, flores, semenq; po-
tum
Iunci marini tenella folia prope radicē
erumpentia imposita.
Hyacinthi radis potui data.

Sem-

temperuium maius ebibitum.

qua moris fotu adhibita.

unicæ syluestris radix quàm tenuissi-
mè trita, aut aristolochia cum hor-
dei farina, & aceto subacta.

apiastri decoctum fotu admotum aut
eius folia

Abrotani

Anisi } semen pro
Cumini } pinatum binarū drach-
æthiopici } marum ponde

Cedrides trite admo- } re cū hemina
æ uel bibitæ } uini.

Platani cortex potus

Cupressi uiridum pilularum ex uino de-
coctum.

Chamæpithyos decoctum epotum.

Trifolii semen propinatum.

MATTHIOLI.

Atriplicis succus potus.

Cyani utriusq; folia, siue semen ex uino
hausta.

Porri folia melle subacta, & illita.

Hieracium ex commixto uino, & aceto
potum.

Trifolii bituminosi decoctum fotum.

Acetum calidum cum spongiis uulneti
admotum.

Sanguinaria trita & illita.

Porrum cum fursuribus ex aceto in-
coctum

Venenorum.

coctum & illitum.

Hordeacea farina ex uino, & melle co-
cta, & imposita.

Lauri folia cum ruta adhibita.

Caprillum stercus cum uino impositum.

Amaracus cum syluestri ruta, & cypero
ex aceto.

Theriaca Andromachi.

Mithridatis antidotum.

MATTHIOLI.

Ad acontiae morsum.

Antidota omnia, quæ uipereis morfi-
bus resistunt.

Oleum nostrum de scorpionibus plagæ,
cordi, & arteriis illitum.

Potio ex aqua uitæ, & antidoto nostro
parata. lege lib. 6. prefatione m.

DIOSCORIDIS.

Ad stellionis morsum.

Sesamum cum rosaceo.

MATTHIOLI.

Mithridatis antidotum.

Scorpiones contriti, & illiti

Oleum nostrum de scorpionibus inunctum.

DIOS-

Venenorum. 277
DIOSCORIDIS.

Ad crocodiliorum morsum.

Sal impositum.

MATTHIOLI.

Chrocodili corii cinis ex aceto illi-
tus.

Hastulæ regiæ radices elixæ, & il-
litæ.

Hypericum recens tritum, & morsui ad
alligatum.

DIOSCORIDIS.

Ad quadrupedum morsum.

Aprinum epar tum recens tum siccum
ebibitum.

MATTHIOLI.

Faseoli commanducati & uulneri adalli-
gati.

Fabarum, & erui farina melle subacta &
illita.

Abiegna resina calens cum rosaceo ad-
hibita.

A. DIOS.

Venenorum.
DIOSCORIDIS.

Ad scorpionis ictus.

Cyperus impositus.
Cardamomum ex uino potum.
Amomum ex ocimo illitum.
Lauri baccae ex uino haustae.
Myrti succus ex mero epotus.
Ficus fatiuae lacteus succus plagę instilla-
tus.

Cancer fluiatiles crudi, tritiq; cum asini
no lacte & epoti.

Scorpius ipse tritus, & impositus, uel to-
stus deuoratus.

Delphinium appositum.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Smaridis piscis salita caro adhibita.

Lacerta dissecta, & apposita dolorem se-
dat.

Mures domestici dissecti, & admoti.

Fimus [Asini] herbas pascentis uino
[Equi] dilutus haustus.

Vrina humana epota.

Farina triticea ex aceto, & uino im-
posita.

Lychnidis semen cum uino bibitum.

Oxylapathi, & oxalidis semen uino, aut
aqua potum.

Sonchi succus comestus, & cataplasma-
tis more impositus.

Intybus cataplasmatibus modo adhibitus.

Pha-

- Phalangium herba sumpta.
Lactuca Sylvestris bibita.
Ocimum cum polenta impositum.
Asphodeli semen & flores in uino poti.
Abrótanum potui datum.
Sampsuchum ex aceto, & sale applici-
tum.
Hieracium maius, & minus cataplasma
tis more impositum.
Laser oleo dilutum inunctum.
Colus rustica cum uino pipereq; bibita,
& manibus gestata dolorem punctu-
ræ omnino fugat.
Melissophylli folia adhibita.
Polemonii radix adalligata.
Rubi flos, & mora.
Vebasci aureum florem ferentis, folia
imposita.
Chamefyces succus illitus
Scorpioides illita
Heliotropium potum cū uino, & illitū.
Aqua maris fotu adhibita.
Sulphur ignem non expertum cum resi-
na terebinthina exceptum admo-
tum.
Calamintha trita illita, uel cum posca
fota.
Galbanum splenii more ductum imposi-
tum.
Hordei farina cum uino parata.
Rutæ decoctum fotu adhibitum.
Trifolium tritum iniectum.

Venenorum.

Cupressus cum uino, & ruta.
Peucedani succus haustus.
Pulegii } decoctum potum.
Gentianæ }
Aristolochiæ præsertim cortex drach-
marum duarum pondere haustus.
Sal cum lini semine.
Sapphirus lapis illitus.

MATTHIOLI.

Mumia ex mero hausta, quin & illita cū
recenti butyro.
Citrii semen potum, & appositum.
Ponticæ nuces in cibis sumptæ, tū quo-
que in cingulo gestatæ.
Pastinacæ semen potum.
Oleum nostrum de scorpionibus uulne-
ri, cordi, & arteriis illitum.
Serpillum }
Althææ radix } pota.
Elaphoboscum }
Blitum ex uino sumptum.
Atriplicis succus potus, & ipsa herba ad-
hibita
Cyani utriusq; folia, siue semen ex uino
decocta, & epota.
Porri folia melle subacta & illita
Asphodeli radix decocta, & plagæ ad-
mota.
Gentiana hausta.
Achates lapis gestatus, ut carnē tangat.
Cochlea

Cochlea hortulana contusa, & illita
Terreni uermes triti, & impositi.
Cancer fluuiatilis tritus & ex uino po-
tus.

Verbenaca recta tum pota, tum illita.
Cuminum cum melanthii, & uiticis se-
mine drachmæ pondere ex uino bi-
bitum.

DIOSCORIDIS.

Ad uesparum & apium ictus.

Lauri folia trita, & illita.
Malua concisa ex oleo imposita.
Sylmbrii folia admota.
Althææ decoctum ex posca bibitum.
Sal cum sepo uitulino adhibitum.

MATTHIOLI.

Asparagus tritus, & cum melle illitus.
Bubulum stercus cum posca illitum.
Sesamum cum posca.
Musæ contritæ, & illitæ
Thymbra }
Melissophyllū | illita.
Sisymbrium }
Momordicæ oleum inunctum.
Ferrum in quo strombi conchylii ima-
go exculpta fuerit icto loco superpo-
sita.

Vecnoerum.

DIOSCORIDIS.

Ad fuganda animalia
uenenosa.

Iuniperi accensæ fumus.

Cedrides peruncto corpore adipe uel
medulla ceruina exceptæ.

Viticis folia suffita, uel substrata.

Cancris fluitantes crudi cum ocimo tri-
ti scorpionibus admoti.

Ceruinum cornu crudum incensum suffi-
tumq;.

Cerui & Elephantis adeps inunctus.

Ceruina medulla.

Nasturtium suffumigatum.

Abrotanum stratum suffituq; incensum.

Origani folia stratis subacta.

Dictamnus olfactum omnia quæ ictu
aut morfu uenenum relinquunt ene-
cat.

Calaminthæ suffitus.

Peucedani suffitus.

Lysimachia incensa fugat serpentes, &
muscas.

Nigellæ suffitus.

Polium utrunq; incensum stratumq;.

Conyzæ

Gagates lapis] suffitus.

MAT-

Venenorum 280
MATTHIOLI.

Veteramentorum suffitus.
Scordium substratum, & sufficium.
Bitumen suffitum.
Succinum
Castoreum suffita.
Asafetida
Ceruina ungula
Cervi corium in terra stratum.

DIOSCORIDIS.

Ad venena omnia.

Phu antidoti insertum.
Cinnamomum potum.
Pix liquida cyathi mensura in eclegma
re cum melle data
Cedrides antidotis impositæ.
Nuces inglandes cum ruta, & ficis præ-
sumptæ.
Quinquefolii radice succus bibitus.
Coagulum leporinum haustum.
Epipactis pota
Castoreum sumptum.
Calamintha præpota.
Mustelæ salitæ, & in umbra exiccata
pulvis cum uino epotus.
Mustelæ uentriculus coriandro fartus
& muكتورatus
Caniculæ lac primi partus epotum.

Aa 4 Erya-

Venenorum.

Eryngium cum uino potum.

Butyrum deficiente oleo haustum.

Sanguis	Anseris	antidotis commistus.
	Anatis	
	Hedi	

Vrina ipsius met infirmi pota.

Semen raparum haustum.

Rutæ semen acetabuli pondere cum uino potum

Napi semen bibitum.

Maluæ decoctum cum suis radicibus frequenter epotum crebroq; reiectum.

Brassicæ semen antidotis impositum.

Irionis semen haustum.

Laserpitium potum.

Agaricum drachmæ pondere cum diluto uino sumptum.

Chamaeleonis albæ radix cū uino pota

Spina alba in amuletum congesta, colloq; suspensa.

Abrotani semen cum uino haustum.

Ruta cum iuglandibus nucibus, & caricis sumpta.

Apri decoctum epotum.

Marrubii folia cibita.

Betonicæ folia drachmæ pondere in uino sumpta.

Tribuli terrestris succus cū uino epotus.

Polemonix radix potui data.

Smilacis asperæ acini prius postuè sumpti.

Acetum tepidum haustum.

Terra

Terra [Lemnia
Samia] ex aqua epota.

MATTHIOLI.

Iridis radix pota.

Imperatoriae herbæ radix bibita.

Phu radix hausta.

Cinnamomi stillatitia aqua epota

Balsami factitii liquores.

Myrrha } pota.

Caphura }

Mumia cum tribulo marino, & assafetida sumpta.

Dictamni albi radices quoquo modo sumptæ.

Quernarum glandium decoctum in potu sumptum.

Citriorum malorum semen haustum

Oleum nostrum de scorpionibus cordi & arteriis illitum

Castoris urina.

Ceruini cordis os.

Napi semen haustum.

Cyani utriusq; folia, siue semen ex uino epota.

Scorzoneræ radix, aut eius & foliorum succus haustus.

Caryophyllorum flores saccharo affluati, intus sumpti.

Zedoaria deuora uel potu sumpta.

Aa 5

Impe

Venenorum.

Imperatoria.

Vincetozicū.

Scordium.

Cardu^s benedict^{us} pta.

Hypericum.

Bistorta, & tormentillæ decoctum epotum.

Consolidæ regalis flores.

Angelica.

Quinta essentia nostra hausta.

Lapis bezahar octo granorum pondere sumptus.

Melitea terra pora.

Antidotum nostrum magnum in præfatione lib. 6. descriptam.

Potio ex antidoto nostro, & aqua uitæ eodem in loco descripta.

MATTHIOLI.

Ad ueneficia.

Herbæ paridis semen drachmæ pondere quotidie potum ad uigesimum diem usq;.

Argentum uiuum pro amuleto suspensum.

Lapis aetites gestatus.

Vpupæ auis cor suspensus.

Eeporis cor in aluta gestatus.

Lupinus oculus dexter gestatus.

Scilla super limine ianuæ suspensa.

DIOS.

Ad leporem marinum.

Cancro fluuiatiles elixi cum suo iure de
uorati.

Lac asininum
Passum] continue datum.

Malæ radicū decoctum epotum.

Veratrū nigrū
scamoniī succ^o drachmæ pondere data
cum mulsâ & mali puni
ci acinis.

Alismatis drachma una uel altera ad-
hibita.

Humanus sanguis calens potus.

Vulpis caro inaffata, & deuorata.

Theriaca diatelleron tribus diebus epo

Ad rubetam ranam.

A 3 5 ris

Venenorum.

ris coagulo, & cymino potus.
Alismatis radix unius, uel duarū drach
marum pondere in uino pota
Merum largius ebibitum, & uomitu red
ditum.
Arundinis } radicis binæ drachmæ e-
Cyperī } potę.

MATTHIOLI.

Eryngii radix ex ranarum comestibiliū
iure pota.
Antidotum nostrum magnum in præsa-
tione lib. 6. descriptum.
Oleum nostrum de scorpionibus cordi,
& arteriis inunctum
Theriaca Andromachi
Mithridatis antidotum.
Testudinis marinę sanguis. additis cu-
mino, leporis coagulo, & uino.
Potio ex antidoto nostro, & aqua uitę
in lib. 6 præfatione descripta.
Smeragdi puluis scrupuli pondere ex ui-
no potus, & subinde intret eger nu-
dus in mulum, aut e quum recentem ex-
ente ratum, ibiq; conclusus noceatur
donec deferuescat cadaver.
Rhabarbarum
Diacurcuma } pota.
Dialacca }
Lapis in rubetę ipsius capite inuentus
epotus.

DIOS-

Venenorum 283
DIOSCORIDIS.

Ad buprestes, & pinorū erucas,

Oleum [Irinum.] potum.
[Melinum]

Caricæ comese, & earū decoctum ex ui
no haustum.

Palmulæ deuorate, uel tritæ ex mulso
aut lacte, & ebibite.

Pyra omne genus in cibum sumpta.

Humanum lac copiose sumptum.

MATTHIOLI.

Antidota omnia, quæ cantharidarum
noxæ subueniunt.

DIOSCORIDIS.

Ad epotas hirudines.

Muria in sorbitionibus data.

Cyrenaicus succus epotus.

Lasertitii folia ex aceto hausta. Quin-
etiā & succus ex aceto gargarizatus.

Betæ folia cum aceto bibita.

Niuis glebula cum posca sumpta.

Cimices uino, acetove poti.

Acetum cum sale potum.

Nitrum ex aqua gargarizatum.

Atramentum sutorium aceto dilutum
& gargarizatum.

MATTH-

Venenorum.
MATTHIOLI.

Salicis decoctum, aut lixiuium ex ipsius
cinere paratum epotum.

Alumen in lixiuio dissolutum, gargari-
zatum.

Sal ammoniacum aqua dilutum, & gar-
garizatum.

Quinta essentia nostra hausta.

Oleum e calcantho semisrupuli ponde-
re haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad epotas cantharidas.

Halicæ

Orizæ.

Tragii

Maluæ

Sem. } Lini
 } Fœnigræci

Althææ

Nitrum ex hydromelite potum.

Nuclei pinei ex uino sumpti.

Cucumeris semen contritum ex mulso
aut lacte haustum.

Anserinus ad eps ex passo epotus.

Smi a terra, quæ after appellatur ex de
fruto hausta.

Pulegium tritum ex aqua potui datum.

Lac epotum.

Vinum

Vinum dulce liberalius haustum.
 Thuris cortex ex passio insumptus.
 Rosaceum cum irino ex rutæ decocto
 sumptum.
 Vitis recentis ramuli detriti, ex passio
 hausti.
 Jus esculentum omnium adipum.

MATTHOILI.

Lac humanum ex uberibus ipsis exui-
 ctum.
 Butyrum crudum recens eclegmaticis
 modo delinctum.
 Psylli, cydoniarum malorū maluq; se-
 minis spissamentum.

Lactucæ.	}	succus potus.
Portulacæ.		
Cucumeris.		
Cucurbitæ.		
Papaueris.	}	seminum cremor lacte ⁹ ex halicaca bi solani aqua pa- ratus, & epotus.
Lactucæ.		
Poponum.		
Cucumeris.		
Cucurbitæ.		
Anguriæ.	}	

Halicabi baccæ decem aut duodecim
 confractæ, & ex aqua portulacæ aut
 hordeacea ptissana potæ.

Amygdalinum dulce selibre pondere
 epotum.

Oleū e.	} pineis nucleis. papaueris semine }	copiose haustu. Mal

Venenorum.

Maluæ
Althææ
Cucurbitæ.

stillatitia aqua lar-
gius ebibita.

Theriaca deuorata.

Mithridatis antidotum.

Antidotum e pineis nucleis, commento
de cantharidibus descriptum.

Antidotum e lemnia terra.

Oleum e momordica Syphone in penis
meatum infusum.

Balneum ex ibisci, maluæ, uiolarum,
psyllij, fœnogræci, hordei, & hyoscia-
mi folijs, & seminibus paratum.

Oui album cum succis frigidis inie-
ctum.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinem, & lac in uentri-
culo concretum.

Coagulum leporinum epotum.

Acetum tepidum potum, & uomitu
redditum.

Grossi lacteo succo turgentes ex posca
sumpti.

Nitrum per sese potum.

Coagulum omne ex aceto, & laserpitii
radice, aut lasere haustum.

Bassicæ semen ex lixiuio ficulnei cine-
ris epotum.

Conyze semen cum pipere ex aceto
haustum.

Rubi

Rubi succus ex aceto potui datus.
Hordeacea farina uentriculo, & aluo
ex aqua mulsa inuncta.

Thymum ex uino haustum.
Calaminthæ folia arida epota.

MATTHIOLI.

Caprifici lac potum.
Chelidonii maioris succus haustus,
Napi semen ex aceto haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad salamandram.

Resina pinea in delinctu.
Galbanum ex melle deglutitum.
Nuclei pinei contriti ex aiuge decocto
poti.

Vrtica cum liliis ex oleo decocta, &
pota.

Testitudinis marinæ, & terrestris oua
cocta, & deuorata.

Ranarum ius in quo eryngii radix fue-
rit cocta, epotum.

MATTHIOLI.

Theriaca.
Mithridatis anti-
dotum.

Terebinthina resi-
na. | epota.

Vrticæ semen.

Cupressi folia.

DIOS.

Venenorum.
DIOSCORIDIS.

Ad colchicum ephemerum.

Origanum cum passo aut oxymelite potum.

Bubulum lac haustum, Quin & asininū largius sumptum.

Quercus foliorum, aut glandium decoctum epotum.

Malicorium haustum.

Serpyllum ex lacte decoctum bibitum.

Sanguinalis herbæ succus potui datus.

Vitis recentium uicularum succus epotus.

Rubi succus haustus.

Ferulæ recētis medulla ex uino sumpta.

Myrti bæccę tuscę, & aqua macerata, & in liquorem soluta pote.

Castanearū media tunica trita, & cum sanguinariæ succo epota.

Origanum cum lixiuio bibitum.

Simplicia omnia quæ fungis aduersantur.

MATTHIOLI.

Lac	[Humanum.]]potum.
		Bubulum.	
		Asininum.	

Distamnum durerum drachmarum pondere haustum.

DIOS-

Venenorum. 286

DIOSCORIDIS.

Ad solanum somnificum, & manicum, & doricinium.

qua mulsâ copiosè sumpta.

ac. [caprillum.] potum.
[Asininum.]

amygdalæ amaræ deuorata.

Conchilia omnia tam cruda quàm cocta deuorata.

locustæ marinæ, quin & gammari in cibum sumpti, & eorum iuscula hausta.

MATTHIOLI.

Antidota oïa quæ opio aduersantur.

Quinta essentia nostra commento de uino descripta.

Potio ex antidoto nostro, & aqua uitæ in præfatione libri sexti descripta.

DIOSCORIDIS.

Ad hyoscyamum.

Mori cortex potus.

Aqua mulsâ largius ebibita.

Lac omne præsertim asininum potum.

Ficum aridarum decoctū epotum.

Nuclei pinei deuorati.

Cucume-

Venenorum.

Cucumeris semen ex passio potui datū
Vinum falsum cum suillo recendi adipe, & passio potum.

Vrticæ semen ex aqua ebibitum.

Nitrum ex aqua haustum.

Cichorium deuoratum.

Sinapis quoquo modo sumpta.

Nasturtium.

Raphanus.

Cæpa.

Allium.

cum uino sumpta.

MATTHIOLI.

Theriaca.

Mithridatis antidotum.

Antidotum nostrum magnum.

Piper longum insumptum.

Pistacia largius deuorata.

Meracum à uomitu potum.

Abinthium.

Castoreum.

Ruta.

Lauri bacce & folia.

ex meraceo hausta.

Defrutum.

Vrticæ semen.

Cardamomū.

DIOSCORIDIS.

Adaconitum.

Leporinum.

Hædinum.

Vitulinum.

coagulum ex uino potum.

Chamæpy

Chamæpytios decoctum haustum.

Scoria ferri ex aceto mulso sumpta.

Origani.

Rutæ.

Marrubii.

Absinthii.

Sedum maius.

Abrotanum.

Chamælea.

Aluga.

{ decoctum cum uino
absinthite potum.

{ ex uino absinthite
pota.

Opobalsamum drachmæ pondere ex
melle, uel lacte cum castoreo pipere,
& ruta equis ponderibus ex uino po-
tum.

Vinum in quo aurū, argentum, ferrū ve-
candens restinctum fuerit potum.

Gallinæ ius ex lixiuio, & uino paratum
epotum.

Bubularum carniū præpinguia iura
cum uino sumpta.

MATTHIOLI.

Eryngii radix ex ranarum comestibi-
lium uel anserino iure pota.

Lemnia sphragis duarum drachmarum
pondere ex calida aqua pota, & uomi-
tione reddita.

Theriaca Andromachi a uomitu hausta
ex uino in quo gentiana incocta fue-
rit.

Antidotum

Venenorum .

Antidotum nostrum magnum in præfatione sexti libri descriptum, deuoratum, aut ex uino haustum.

MATTHIOLI.

Ad napellum.

Lapis Bezabardici septem grana ex albo meraco.

Napi, aut rapi semen potum.

Butyrum bubulum coctum, & sepe, ac large cum uino sumptum.

Glandium putaminum decoctum ex uino, epotum.

Cianabari.] puluis insumptus.

Cinnabari.]

Moscus.] per sese, & cū leminamini

Ambarum.] terra ex uino hausta.

Capparidis radices contritæ & epotæ.

Mus qui in napelli ipsius radices depascitur sicatus, & in puluerē ebibitus.

Antidotum è muscis napelli flores depascentibus uide libri sexti Napelli commentarium.

Smeragdus in puluerem tritus duarum drachmarum pondere haustus.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi, arteriis, atq; naribus replicatis sepe uicibus inunctum.

Puluis Serinis. Principis Ferdinandi Archiducis Austriæ, quo nonnullos, qui napellum

napellum sumpserunt sanatos uidi-
mus.

DIOSCORIDIS.

Ad taxum.

Acetum calidum potum.

Simplia omnia quæ cicuta resistunt.

MATTHIOL.

Medicamenta omnia ad cicuta facien-
tia.

Theriaca Andromachi.

Antidotum nostrum magnum in præfa-
tione libri sexti descriptum.

DIOSCORIDIS.

Ad toxicum.

Sanguis.	{ Hircinus.	} frigus, & in ci- bis sumptus.
	{ Caprillus.	
	{ Leporinus.	
	{ Ceruinus.	
	{ Caninus.	

Galbanum cum myrrha ex uino potū.

Quinquefolii radix hausta.

Roboris.

Fagi.

Ilicis.

cortex tritus ex lacte
haustus.

Cotonea

Venenorum.

Cotonea mala deuorata aut cum pule-
gio, & aqua bibita.

Amomum.

Carpobalsamum.] ex uino epotum

MATTHIOLI.

Lapis Bezahar octo granorum ponde-
re ex uino haustus.

Napi, aut rapi semen potum.

Tormentillę radix sumpta.

Glandium omphacides siue putamina
ex lacte hausta.

Malorum cydoniorum uinum potum.

Cubebę deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad opium & corniculatum
papauer.

Melex rosaceo calido bibitum.

Origanum cum passo aut oximelite
haustum.

Alisnatis radix duarum drachmarum
pondere ex uino pota.

Acetum bibitum, & uomitu redditum.

Sal cum oxymelite sumptum.

Meracium uinum cum absinthio, &
cinnamomo haustum.

Nitrum ex aqua potui datum.

Origanum cum lixiuio aut passo potum.
Rutę

Venenorum.

289

Rutæ sylvestris semen cum pipere, & pance, ex uino sumptum.

Piper cum castoreo ex aceto mulso uel cum satureiæ, aut origani decocto ex uino bibitum.

Pinguia iura in potu sumpta cum uino, aut passo.

Ossium medulla ex oleo epota.

MATTHIOLI.

Artemisia recens deuorata, aut foliorum succus haustus.

Quinta essentia nostra cap. de uino descripta.

Laserpitii lachryma epota.

Castoreum ebibitum.

Theriaca sagzanea deuorata.

Mithridatis antidotum ex uino potum.

Moschum

Ambarum.

} olfactum.

Ellebori albi puluis naribus inditus.

Sulphuris suffitus.

DIOSCORIDIS.

Ad cicutam.

Absinthium ex uino bibitum.

Origanum cum passo aut oxymelite potum.

Acetum epotum, & uomitu reiectum.

Bb

Meracum

Venenorum.

Meracum uinum largius epotum, & per
interualla repetitum.

Lactum bubulum, tum asininum epo-
tum.

Castoreum cum ruta, & mentha ex uino
sumptum.

Amomi.

Cardamomi.

Styracis.

} Vncia pota.

Piper cum urticae semine ex uino haustu.

Lauri folia potui data.

Lasfer ex oleo, uel passio potum.

Passum per se largius epotum.

MATTHIOLI.

Apii semen ex uino potum.

Iridis radix potui data.

Seseli Massiliense ebibitum.

Nitrum ex copiosiore aqua epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad ixiā.

Absinthium ex uino bibitum.

Origanum ex uino potum.

Acetum potum, uomitumq; reiectum.

Rutæ syluestris semen epotum.

Tragorigani decoctum haustum.

Refina terebinthina deuorata.

Nardus Indica potui data.

Castoreum.

Castoreum. }
 Laserpitium. } oboli pondere sumptū.
 Nuces iuglandes cum resina, castoreo, &
 ruta, tritæ, ita ut singula drachmæ
 pondus æquent ex uino haustæ.
 Chamelex. }
 Thapsiæ. } succus scillici pondere ex
 Absinthii. } aqua mulsa haustus.

MATTHIOLI.

Theriaca Andromachi. } ex absinthii
 Mithridatis anti dotum. } pōtici deco
 ctopotata.
 Saccharum è floribus borraginis, bu-
 glosiue paratū, additis corallio, mar-
 garitis, moscho, ambaro, & precio-
 rum lapidum fragmentis.
 Rosaceum cum aceto sincipiti illitum.
 Thlaspi semen potum.
 Betæ succus ebibitus.
 Triticæ ptisanæ cremor ex passo pot⁹.
 Absinthii dilutum potum.
 Nitrum ex mulso haustum.
 La c recenter mulsum a uomitu copio-
 so epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad coriandrum.

Merum per sese uel ex absinthio potū.
 Oleum epotum.

Bb 2 Oua

Venenorum.

Oua in oleo exinanita, & ex muria li-
quefacta deuorata.

Muria epota.

Passum ex lixiuio assumptum.

Gallarum, & anserum ius copiose sal-
sum, haustum.

MATTHIOLI.

Theriaca ex mero pota.

Vincetoxici radices potui datę.

Diamoschum.

Diambarum.] in potionibus.

DIOSCORIDIS.

Ad psyllium.

Simplicia omnia quę coriandro aduer-
santur.

MATTHIOLI.

Theriaca hausta.

Vincetoxicum ebibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad herbam sardoniam.

Aqua mulsā liberalius pota.

Lac assatim obibitum.

Aqua

Aqua calida fotu adhibita, Quinetiam,
& oleum.

MATTHIOLI.

Vinum dulce potum ad ebrietatem usq;
ut inde dormiant affecti.

Castorium e dulci uino potum.

Melissophylli succus ex aceto sumptus.

	[Lilio.	
	Castoreo.	} Occipitio, ceruici, & spinali me- dulle illitū.
Oleum de	Vermibus.	
	Costo.	
	Hyperico.	

Vnguen- tum.	{ Vulpinum	} eodem modo usurpatum.
	{ Aragon	
	{ Agripæ.	

DIOSCORIDIS.

Ad mandragoram.

Aqua mulsa copiosè pota, & uomitu
reicta.

Nitrum cum absinthio ex dulci uino
aut passo sumptum.

Rosaceum cum aceto capiti perfusum.

Eupatorium.

Piper.

Sinapi.

Castorium

Ruta.

} ex aceto trita, & ad
olfaciendum data.

Bb 3 Luccer.

Venenorum.
Lucernarum extinctarum fumus olfactus.

MATTHIOLI.

Coriandri semen } ex aqua calida
Pulegium. } potum.
Origanum ex frigida ebibitum.
Veratri albi pulvis naribus inditus.
Cantharides ex fermento occipitio adalligatae.

DIOSCORIDIS.

Ad fungos malos.

Fimus gallinae cum aceto bibitus.
Mel ex rosaceo calido potum.
Raphanus deuoratus, uel potui datus.
Absinthium cum aceto ebibitum.
Melissophylli folia cum nitro epota.
Lixiuum sarmenticii cineris ex acidamuria potum.
Stureia feruesfacta, haustaq;
Origani in sculum potui datum.
Acetum calidum potum, & uomitu reiectum.
Atramentum sutorium ex aqua potum.
Sal cum oxymelite bibitum.
Pyrastrii folia pota, deuorataq;
Oua gallinacea cum aristolochiae drachma ex posca deuorata.

Panacia

Panacis radix, & semen ex uino pota.

Fex aini cremata ex aqua bibita.

Sinapis hausta.

Nasturtium comestum.

MATTHIOLI.

Myrti frondes cum baccarum semine
tritæ & insumptæ.

Brassicæ succus potus.

Porrum sub cineribus coctum haustum
uel comestum.

Pyri syluestris cinis potus, Quin & li-
gni ramenta.

Pyra syluestria deuorata aut cum ipsis
fungis elixa.

Quinta essentia nostra pota.

Raphani domestici succus epotus.

Rutæ folia deuorata.

Origani puluis sumptus.

Mel deglutitum.

Theriaca ex acerrimo aceto pota.

Vinum generosum in quo piper confer-
buerit haustum.

Allium crudum deuoratum.

Murium stercus ex uino potum.

Oleum cum anatis adipe clystere infu-
sum.

Ricinum oleum uentri illitum.

Scammonium ultimo loco potum.

Diapipereos, aut diacyminum, aut dia-
galanga, aut diamoschum insumpta.

Bb 4 DIOS-

Venenorum.

DIOSCORIDIS.

Ad gypsum.

Origanum cum passo, aut oximelite
potum.

Maluę decoctum potum. quin & toto
corpori inspersum.

Oleum bibitum.

Aqua, mulsa epota.

Caricarum decoctum haustum.

Lixiuum e ficulneo, aut sarmentitio ci
nere paratum cum uino copiosiore
haustum.

Origanum cum lixiuio, aut aceto aut
passo sumptum, Quinetiam & thy-
mum.

Simplicia omnia quę fungis resistunt.

MATTHIOLI.

Antidota omnia quę cerussę & fungo-
rum noxę opitulantur.

Maluę althęę, scenogręci, & lini semi-
nis decoctum potum.

Aqua egelida cum butyro pota, & uo-
mitione reiecta.

Mithridatis antidotum ex meraco dua-
rum drachmarum pondere a uomitu
sumptum.

DIOS

Venenorum 293
DIOSCORIDIS.

Ad cerussam.

Amaracinum. } oleum potum.
Irinum. }
Vlmi liquor epotus.
Persicorum nuclei ex ptisana poti.
Caricarum. | decoctum haustum.
Maluarum. |
Lac calidum bibitum.
Sesamum tritum ex uino sumptum.
Lixiuum ex sarmentitio cinere potum.
Columbina oua cum thure hausta.

MATTHIOLI.

Scammonium ex mulsa aqua potum.
Medicamenta quę suapte natura urinā
pellunt.
Oleum lilinum ex hydromelite potum
& uomitione redditum.
Atriplicis, rapīq; semen ex mulso potum
& uomitu reiectum.
Brassicę decoctum absque sale cū oleo
infusum.
Theriaca.
Mithridatis antidotum.
Vinum album meracum liberalius haustum.

Bb 5 MATTH.

Venenorum.
MATTHIOLI.

Ad arsenicum sublimatum.

Butyrum frequenter sumptum, frequen-
terq; reiectum.

Asininum lac potum.

Rapi semen ebibitum.

Mucago ex psyllii, malux, & cydoniorū
semine parata, & pota.

Amygdalinum oleum potum.

Pinguum gallinarum ius copiosè hau-
stum.

Crytallum in tenuissimum puluerem
tritum drachmæ pōdere dulci amyg-
dalino oleo epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad argenti spumam.

Hormini syluestris semen potum.

Myrrha.

Absinthium.

Hyssopum.

Apii semen.

Piper

Ligustri flores.

Palumborum aridum finum cum nar-
do ex uino sumptum.

} ex uino hau-
sta.

MATTHIOLI.

Butyrum cum mulla potum, & uomi-
tione

tionē reiectum.

Gallarum & anatum adeps ex hydro-
melite potus, & uomitu redditus.

Amygdalinum oleum copiose potum.

Hydromel clystere infusum.

Apii succus uentriculo inunctus.

Butyrum uentri illitum.

Lathyrus semen duarum drachmarum
pondere haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad argentum uiuum.

Lac copiose potum.

Simplicia omnia quæ faciunt ad argen-
ti spumam.

MATTHIOLI.

Lac bubulum cum suo butyro potum.

Amygdalinum oleum ebibitum.

Aurum in puluerem subtiliter tritum
haustum.

MATTHIOLI.

Ad argentum uiuum sublima-
tum, præcipitatumq; &
cinnabarim.

Lac bubulum cum suo butyro potum-
Bb 6 &uo,

Venenorum.

& uomitione redditum.

Antidota omnia quæ ad cantharidum
noxam faciunt.

DIOSCORIDIS.

Ad calcem, sandaracham, & au-
ripigmentum.

Lac ex aqua mulsa potum, & uomitu
reiectum.

Carnium iurapinguia hausta.

Althææ. } decoctum ad spissitudinem

Maluæ. } redactum epotum.

Tragi herbæ semen potum.

Seminis lini decoctum potui datum.

Orizæ decoctum haustum.

MATTHIOLI.

Tac abunde potum.

Rutyrum

Ius carniū pinguium.

Animalium pinguedines.

Medicamenta aluum lubri-
cantia.

} copiosè
epota.

Seminis [Maluæ
Althææ
Psyllii
Lini
Fœnugræci] mucagines.

Antidota omnia, quæ ad cantharidum
noxam faciunt.

MATTH-

Venenorum.
MATTHIOLI.

295

Ad anacardia.

Oleum	{	Amygdalinum dulce] glacie refri- gera- ta & epota
		E pineis nucibus	
		Enucibus Indicis	
		E papaueris semine	
Butyrum crudum recens.] copiosè sum pta.
Bubulum, ouillumq; lac			
Violaceum oleum.			
Hordeacea ptissana			
Pinguium carniū ius] copiosè sum pta.
Suillus, & anserius adeps			
Cerebrum tā quadrupē- dū quā uolatilium.			
Ossium medulla.			

MATTHIOLI.

Ad staphidam agriam.

Amygdalarum dulcium oleum admisto
copioso hydromelite.
Medicamenta omnia quæ cantharidum
noxæ aduersantur.
Theriaca Andromachi pota.
Mithridatis antidotum.
Antidotum nostrum in lib. 6. præfatio-
ne descriptum.

MAT-

Venenorum.
MATTHIOLI.

Bd scyllam malam.

Lac in quo calybs candens extinctus
fuerit, epotum.

Ouorum uitelli in aceto decocti deuo-
rati.

Carnium pinguium iura pota.

Butyrum crudum, ac recens copiosè sum-
ptum.

Extrema iuuenum quadrupedum mem-
bra elixa, & deuorata.

MATTHIOLI.

Ad flammulam.

Bubulum lac a uomitu, & clystere epo-
tum.

Oleum	[Amigдалиū dulce]	Epotum
	[E pineis nucleis]	
	[Papaueris semine]	
	[Ex indica nuce]	

Semiuis	[Lini]	spissamenta sumpta
	[Maluæ]	
	[Althææ]	
	[Psyllii]	
	[Cydoniorū]	

Pingua carniū iura hausta

Halicachabi baccæ deuorata.

MAT-

Venenorum. 296

MATTHIOLI.

Ad urticæ semen.

Medicamenta omnia quæ scyllæ noxæ
resistunt.

Malorum cydoniorum semina contusa,
& ex calida aqua epota.

MATTHIOLI.

Ad dracunculi semen.

Butyrum crudum recens haustum
Hordeacæ farinæ pulicula additis sac
charo, penidiis, amygdalino oleo, aut
recenti butyro deuorata.

Pinguia carniū iura hausta.

MATTHIOLI.

Ad rhododendrum.

Fenugræci decoctum potum.

Dactili deuorati.

Viticis semen aut folia aut eorum deco
ctum epotum.

Caricæ ex melle aut iulapio sumpta.

Defrutum potum.

Pinguia omnia deuorata.

Diacastoreum potum duarum drach
marum pondere.

Iuniperi

Venenorum.

Iuniperi baccae pari pondere potæ.

MATTHIOLI.

Ad azadaracht.

Theriaca Andromachi }
Mithridatis antidotum } ex uino hau-
Antidotum nostrum. } sta.
Medicamenta omnia quæ nerio conue-
niunt.

MATTHIOLI.

Ad uomicas nuces.

Butyrum a uomitu copiosè deuora-
tum.

Vinum meracum copiosum addito pipe-
re, pyrethro, lauri baccis, cinnamo-
mo, & castoreo à uomitu epotum.

Ea omnia quæ opii noxam superant.

MATTHIOLI.

Ad sanguinem menstruum.

Margaritæ drachmæ pondere ex aqua
melissophylli potæ.

Balneum tepentis aquæ.

Theriaca andromachi drachmæ pondere
ex fumarie aqua quotidie hausta.

Viperei

Venenorum. 297

Viperei pastilli scrupuli pondere epoti.

MATTHIOLI.

Ad fel leopardi.

Antidota quæ napello epoto, & uipere-
is moribus auxiliantur.

Antidotus Auicennæ è lemnia terra. Vi
de lib.6.com.de taurino sanguine.

MATTHIOLI.

Ad uipereum fel.

Butyrum decoctum potum

Theriaca Andromachi

Mithridatis antidotum

Viperei pastilli.

Antidotum nostrum.

à uomitu sſi
pta.

Moschum

Diamoschum

Ambarum

Diaambarum.

Oleum nostrum de scorpionibus, cordi
& arteriis sæpe inunctum.

Quinta essentia nostra lib.6.in præfatio
ne descripta.

MATTHIOLI.

Ad canis piscis fel

Butyrum bubulum cum gentianæ ra-
dice,

Venenorum.

dice, cinnamomo, & leporis coagulo
epotum.

Oleum odoratum quodlibet corpori
uniuerso illitum.

MATTHIOLI.

Ad cati cerebrum.

Terra lemnia ex oleo pota, & uomitio-
ne reiecta semel in septimana.

Diamoschum quotidie sumptum horis
quatuor ante cibum.

Moschum per sese semisrupuli pōdere
ex uino pluries epotum.

MATTHIOLI.

Ad uenenum caudæ cerui.

Butyrum bubulum potum, & uomitione
reiectum.

Smeragdi puluis semisrupuli pōdere à
uomitu ex uino epotus.

Pistacia, & pōricæ nucs in cibis largius
deuorata.

Oleum è citri semine pressum toti cor-
pori illitum.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi
& arteriis inunctum.

Antidotum nostrum magnum in præsa-
tione lib. 6. descriptum.

MAT-

MATTHIOLI.

Ad quadrupedum quorumcunq;
sudorem.

Butyrum siue oleum potum, & uomitio
ne reiectum.

Vinum cum rosaceo a citata uomitione
epotum.

Rhabarbarum semidrachmæ pondere
sumptum addito fossitii salis mo-
mento.

Theriaca ex terra lemnia Auicennæ.

MATTHIOLI.

Ad castorenm malum.

Butyrum bubulum } pota & uomitio-
Aqua mulsa } ne reiecta.

Diamoron }
Limonum succus } a uomitu cum sac-
Citri mali succus } charo potus.

Coriandri semen tostum duarum drach-
marum pondere haustum.

MATTHIOLI.

Ad plumbi scobem.

Antidota omnia quæ ad argenti spu-
mam faciunt.

MAT.

Venenorum.
MATTHIOLI.

Ad ferri scobem, & scoriam

Lac recenter mulsu[m] epotum.
Medicamenta ualenter aluum soluentia
ab epoto lacte sumpta.
Butyrum tam diu datum quousq[ue] inte-
stinorum dolores cedant.

MATTHIOLI.

Ad lapidem magnetem.

Auri scobes in tenuissimum puluerem
trita, & epota.
Smeragdi puluis potus nouem diebus.
Lac, & amygdalinum oleum clystere in-
fusus.

MATTHIOLI.

Ad æris squamam

Mulla pota, & uomitione reiecta.
Balneũ ex hyrcorum capita & cochlea-
rum iure paratum.
Menthæ succus potui datus.
Rosaceum calidum uentriculo inun-
ctum.
Acori radices trium drachmarum pon-
dere bibitæ.

Lemniam

Omnia terra drachmæ pondere ex uino hausta.

Corallium rubrum drachmarum duarum pondere ex uino ebibitum.

MATTHIOLI.

Ad æruginem.

Medicamenta, & antidota omnia quæ ad æris squamam conferunt.

MATTHIOLI.

Ad risagallum.

Medicamenta, & antidota omnia quæ ærgenti uiui sublimati, arsenici, & æruginis noxæ aduersantur.

Amygdalinum oleum toti corpori illitum.

Violaceum iulapium ex ptissana hordeacea epotum.

Oleum è pineis nucleis, & Indica nuce pressum selibre pondere potum.

Antidota omnia, quæ cantharidibus cõueniunt.

MATTHIOLI.

Ad elleborum album.

Mulsa cum butyro pota, & uomitione reicta

Nym-

Venenorum.

Nymphaeæ flores duarum drachmarum
pondere potæ.

Theriaca Andromachi.

MATTHIOLI.

Ad elleborum nigrum.

Absinthium uino potum.

Anisi semen ebibitum.

Nardus Indica unâ cum castoreo pota

Cafeus recens.

Mel.

Butyrum.

in cibis sumpta.

Pinguia.

Passum.

Lemnia terra hausta.

Theriaca Andromachi.

MATTHIOLI.

Ad euphorbium.

Butyrum haustum.

Oleum amygdalinum.

Pinguia omnia.

[Solani hortensis]

Aqua

[Violarum]

epota

[Nymphaeæ]

[Maluæ]

Semi Altheæ

nis Psylli

mucago pota

Cydo-

Venenorum.

300

[Cydoniorū malorū]

[Lini]

ac acidum.

Claphura ex aqua rosacea bibita.

unicorum malorum uinū.]

anguria

Cucumis

Cucurbita

Malorum acidorum succus

triffana hordeacea

Citri semen ex uino helenii potum.

] glacie refri
] gerata & in
] sumpta.

MATTHIOLI.

Ad turpetum, & tithymalos.

Antidota omnia quæ ad euphorbium faciunt.

Theriaca Andromachi ex uino pota in quo Cretense dictamnium incoctum fuerit.

Mumia sepulchrorum drachmæ pondere ex meraco hausta.

MATTHIOLI.

Ad scamonium.

Lac a quo demptum fuerit butyrum epotum.

Cotoneorum malorum succus ebibitus.

Ribis

Venenorum.

Rhis succus epotus.
Ribis vulgaris uinum haustum.

MATTHIOLI.

Ad colocinthydem.

Antidota omnia ad Euphorbium facientia.

Bubulum lac, & butyrum recens potum.
Lemnia terra frequenter pota.
Smeragdi pulvis pluries haustus.
Theriaca Andromachi deuorata.

MATTHIOLI.

Ad cyclaminum.

Lauri baccæ duarum drachmarum pondere potæ.
Gentiana hausta.
Nigrum piper in potu sumptum.
Theriaca.
Lemnia terra.

MATTHIOLI.

Ad thymelæam. & chamelæam.

Antidota omnia quæ ad euphorblum faciunt.

Theriaca Andromachi.

Lemnia

Lemnia terra
Rosaceum serapium ex hordei ptissana
epotum.
Driganum tostum potum.

MATTHIOLI.

Ad bryoniam.

Antidota omnia, quę ad euphorbium
conueniunt.

Theriaca ex uino hausta in quo hele-
nium incoctum fuerit.

MATTHIOLI.

Ad elaterium.

Theriaca Andromachi ex baccarū lau-
ri decocto, aut melle drachmarū dua-
rum pondere pota.

Menthæ succus haustus.

MATTHIOLI.

Ad aquam frigidam.

Piper epotum.
Creticum uinum ebibitum.
Antidotum nostrum.
Quinta essentia nostra.

Cc MAT-

Venenorum.
MATTHIOL.

Ad uini læsiones.

Vomitūs excitatio
Brassicæ succus haustus.
Acetum testiculis adhibitum.

MATTHIOLI.

Ad carnes, & pisces refrigeratos.

Ea quæ ad maleficos fungos ualent.
Vini optimi, & odorati potus admisto
cydoniorum succo.
Lemnia terra cum agallocho, & masti-
che hausta

SIM

SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM

FACVLTATES,

QVAE CORPORI DECO
rem praestant ex Dioscoride

Decoris.

DIOSCORIDIS.

Ad alopeciam.



MYRRHA cum lada
no & uino myrteo
illita.

Harundinum corticū
cinis ex aceto inun
ctus.

Ladanum cum uino,
& myrteo oleo admotum.

Myrti baccarum succus illitus

Nucum Iuglādium putamen combustū,
tritumq; & impositum.

Nucum auellanaŕū crematarum cinis ex
ursino adipe perunctus.

Erinacei terreſtris corii cinis ex liquida
pice illitus.

Cc 2 Lepo-

Decoris.

Murium stercus combustum ex aceto.

Vrsinus adeps illitus.

Caprarum finus ex aceto.

Raphanns tritus ex loliacea farina ad-
motus.

Balsica cum sale confricata.

Betæ recentia folia cruda illita.

Asphodeli radicum cinis impositus.

Cepa confricata.

Allii cinis ex melle illitus.

Sinapi illitum.

Nasturtium confricatum.

Cyclamini succus inunctus.

Ranunculi folia, & radices illitæ, partem
temporis spatio.

Aloe ex uino.

Abrotani cinis ex raphani succo, aut c
cino oleo.

Laserpitii liquor cum pipere ex aceto.

Nymphææ radix ex pice.

Cynoglossæ folia ex uetere suillo adia
pe.

Adiantum illitum cum sasino aut myr
tino oleo, aut hyssodo, aut uino.

Thapsiæ succus inunctus.

Rubigo ferri illita.

Sandaracha ex resina.

Alcyonium tritum exustum inunctum

Cotes naxia illita.

Hippocampi cremati cinis ex liquida
ce, aut axungia, aut amaracino un
guento.

Caprarum

Caprarum ungularum cinis ex aceto in-
unctus.

MATTHIOLI.

Conorum cupressi, & mulorum unguis
cinis oleo myrtino exceptus, & illi-
tus.

Vlmi radicum decoctum mucago il-
lita.

Perfici nuclei contusi.

Abrotoni cinis cum oleo raphanimo
aut ficyonio illitus.

Lilii radix ex adipe & oleo.

Oleum e colocynthide illitum.

MATTHIOLI.

Ad capillorum defluuium.

Conorum cupressi, & mulorum unguis
cinis ex myrtino oleo illitus.

Vlmorum radicum mucago illita.

Humor defluens e medulla dissectæ ti-
liæ.

Ladanum inunctum

Sylvestris oliuæ oleum.

Rhois foliorum decoctum ex lixiatio pa-
ratum.

Viperinæ senectæ cinis inspersus.

Murium stercus ex aceto illitum.

Capra affricata.

Cc 3

Abrotani

Decoris.

Abrotani cinis cum oleo ueteri, aut lentis-
tiscino inunctus.

Oleum è colocynthide illitum.

Myrti baccarum uinum illitum.

Myrobalana omnia, & præsertim flaua
quouis modo usurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad pilos auellendos.

Oleum in quo decocta fuerit scolopen-
dra marina inunctum.

Lepus marinus per se, & cum marina ur-
tica tritus, & appositus.

Salamandræ cinis ex oleo.

Hederæ lachryma illita.

Dryopteris radix trita, & post sudorem
inuncta.

Aqua è uiridibus uitium sarmetis igne
incensis emanans admota.

Auripigmentum illitum.

Cyperus Babilonicus illitus.

MATTHIOLI.

Ad pilos retardandos.

Oleum hyoscyaminum
Cicutæ succus
Hyoscyami succus } inuncta.

DIOS-

Decoris.

304

DIOSCORIDIS.

Ad capitis furfures.

Salicis foliorum, & corticis decoctum
in lotionibus.

Myrti baccaum succus illitus.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia in-
unctum.

Humana urina inueterata admota.

Adiantum in lixiuio decoctum.

Fenumgræcum in lotionibus.

Malua ex urina humana.

Betæ decoctum admotum

Allii cinis ex melle

Bulbi cum cremato nitro illiti.

Lilii cremata radix ex melle peruncta.

Alumen cum cruo ex pice.

MATTHIOLI.

Euonymi bacce in lixiuino.

Syluestris oliue oleum.

Pomata illita.

Oleum amygdalarum amararum.

Lupini farina confri cata.

DIOSCORIDIS.

Ad rufandos capillos.

Ligustri folia trita, & in radiculae succo

Cc 4 macerata

Decoris.

macerata, & illita.

Lycium illitum.

Loti ligni decoctum in lotionibus admotum.

Vini fex cremata ex lentiscino oleo tota nocte illita.

MATTHIOL.

Ad crispandos capillos.

Asphodeli radices derafo capiti affricte.

Castanearum echinorum cinis derafo capiti ex melle illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad denigrandos capillos.

Cupressi folia trita ex aceto adhibita.

Rhois decoctum admotum.

Mori folia trita ex aceto imposita.

Gallæ aceto aut aqua macerata illita.

Palmæ corticis decoctum admotum, & subinde deterfum.

Myrti foliorum decoctum in lotionibus.

Acaciæ succus illitus.

Ilignæ radicis cortex ex aqua coctus de nocte nec mollitus contabescat, tota nocte illitus.

Hederæ corymbi illiti.

Salviæ decoctum sæpius inspersum.

Rubi folia admota.

Soro

Sory illitum.

MATTHIOLI.

Eruinæ filiquæ priusquā indurescāt aut
cū sale suisq; foliis contritæ & illitæ.
Oleum è colocyntidis fructu illitum.
Ophrys in capitis perfusionibus addita.

DIOSCORIDIS.

Ad pediculos & lendes
necandos.

Cedria illita.

Myricæ decoctum perfusum.

Mel inunctum capiti.

Betæ decoctum perfusum.

Allium cum origani decoctum potum.

Hederæ lachryma illita.

Staphis agria admota.

Sandaracha ex oleo inuncta.

Alumen ex aqua.

MATTHIOLI.

Euonymi baccae in lixiuio coctæ.

Hederæ gummi illitum.

Hyssopum cum oleo inunctum.

Albi ueratri radix in lixiuio decocta

Argentum uiuum extinctum, & cum bu
tyro inunctum.

Cc 5 Piper

Decoris.

Piper in puluerem tritum, & ex salua illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad prohibendam solis adustionem.

Albumen oui inunctum.

Cyclamini succus inunctus.

MATTHIOLI.

Meloponis. }
Auguriæ. } pulpa illita.

Seminis. { Maluæ
 { Althææ
 { Psyllii } mucago illita
 { Cydoniorū } ex recenti butyro.
 { malorum }

Ulmi folliculorum liquor inunctus.

Vuæ præmaturæ succus illitus.

MATTHIOLI.

Ad remorandam canitiem

Syluestris oliuæ oleum inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad faciei nitorem

Ulmi liquor in folliculis cōtētus illitus
Masti-

Mastiche illita.
Lupinorum farina illita
Raparum syluestrium semen admo-
tum
Peponis succus cum eius semine, & fari-
na in sole sicccatus, & inunctus.
Polygonatum illitum.
Glans unguentaria ex urina illita.
Ricini semen impositum.
Vitis syluestris acini illiti.
Argenti spuma elota inuncta.
Alcyonium primum, & secundum ad-
motum.
Chia terra imposita.
Crocodili terrestris finus illitus.

MATTHIOLI.

Caphura circumlitionibus addita.
Eadem cum chrysocola trita, & ex mel-
le illita.
E limoniorum succo stillatitia aqua il-
lita.
Cochlearum terrestriū stillatitia aqua
illita.
Fabacea farina admota.
Aqua stillatitia ex phasiolis, & quibus-
dam aliis, uide in phasiorum com-
mentario lib. 2. cap. 101.
Lupini decoctum perfusum.
Aqua stillatitia ex melopeponibus &
aliis multis uide li. 2. ca. 128. in com.

Cc 6 Ari

Decoris.

Ari radicum stillatitia aqua, uel earum
succus insolatus, & cum eiusdem ari
stillatitia aqua illitus.

Primulæveris florum succus illitus.

Verbasci florum, & polygonati radi-
cum dilutum per elambicum distil-
latum

DIOSCORIDIS.

Ad colorem concilian-
dum.

Cicer in cibis sumptum.

Agaricum drachmæ pondere potum.

Hyslopum manducatum bibitumve.

Chia terra illita.

Cerasi gummi illitum.

Caricæ in cibis sumptæ.

MATTHIOLI.

Ad pustulas sangui-
neas.

Caphura unciæ pondere cum pari sul-
phuris portione trita, additis myr-
rhæ, thurisq; cuiusque quaternis
drachmis, & aque rosarum libra in ui-
treo uase per dies decem insolata, &
deinde illita.

Fraxini

Fraxinæ stillatitia aqua.

Tamarindorum pulpa deuorata frequenter.

Vinum e fragis illitum.

Verbasci florum stillatitia aqua addito caphuræ momento.

DIOSCORIDIS.

Ad faciem derugandam.

Cacaliæ grana post excussum florem prodeuntia trita, & cum cerato illita.

Bryoniæ radix cum eruo, creta chia, & fœnogræco illita.

Chia terra admota.

MATTHIOLI.

Myrrhæ oleum frequenter illitum.

Myrrha suffita ex candenti patella.

Conorum pineorum recentium stillatitia aqua faciei admota.

Ari radicum stillatitia aqua illita uel insolatus ex radicibus succus.

Primulæ ueris florum succus illitus.

Verbasci florum, & polygonati radicum stillatitia aqua addito limonio succo.

DIOS.

Decoris.
DIOSCORIDIS.

Ad cutis uitia in facie.

Sabinæ decoctum perfusum.
Conchulæ Indicæ cinis admotus.
Glans unguentaria trita ex urina.
Cancrorum fluuiatilium cinis illitus.
Narcissi radix cum semine urticæ ex
aceto.
Ricini semen admotum.
Vitis syluestris acini illiti.
Cinnamomum ex melle.
Cotti radix cum aqua uel melle illita.
Bryoniæ radix per se, & cum eruo, cre-
ta chia, & sœnogreco admota.
Alcyoniū primū, & secūdum impositū.

MATTHIOLI.

Resinæ laricæ, aut terebinthinæ stillati
tia aqua, addito oleo e uini sæce pa-
rato.
Pomata illita.
Aqua e succo limoniorum parata ui-
treo alembico.
Oleum ex ouorum uitellis.
Oleum e tritico.
Auenæ farina in aceto decocta.
Fabacea farina.
Lupini decoctum affusum.
Rapi syluestris semen illitum.

Lapa-

Lapathi acuti aqua stillatitia, & quorundam aliorum, vide lib.2. cap.108.in comment.

Erucae semen cum melle inunctum.

Sinapi aqua subactum, & cuti affricatum.

Dracunculi radix contusa, & illita.

Boni Henrici succus cum aceto illitus.

Ari radices stillatitia aqua uel insolatus earum succus illitus.

Gentianæ stillatitia aqua illita.

Pseudomelanthii semen in farinam tritum, & melle illitum.

Scabiosæ succus cum chrysocollæ farina, & caphuræ momento illitus.

Vinum quod è fragis elicetur.

Primulæ ueris florum succus illitus.

Verbasci florum stillatitia aqua.

Lupuli florum, & folliculorum decoctum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad ionthos, & varos.

Myrrha illita cum melle & cassia odorata.

Porri folia cum rhoe obsoniorum, admota.

Cæpæ succus cum sale appositus.

Bulbi per se, & ex oui uitello.

Pulegium ex cera.

Sory ex aqua.

Alcyonium

Decoris.

Alcyonium primum, & secundum ad-
motum.

MATTHIOLI.

Aqua è succo limoniorum uitreo alem-
bico parata.

Aqua e lapathi acuti radicibus & alijs
nonnullis parata, uide lib. 2. cap.
108. in comment.

Centaurii maioris decoctum adhibitū.
Scabiosæ succus cum chrysocollæ fari-
na & caphurę momento illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad cutis faciei uitia a sole
contracta.

Iridis Illyricæ radix cum elleboro ad-
mota.

Cinnamomum ex melle.

Costi radix cum aqua, uel melle illi-
ta.

Amygdalę amaræ radicum tritarum de-
coctum adhibitum.

Fici lac inunctum.

Cochlearum tum caro, tum testa simul
cremata & melle.

Leporinus sanguis inunctus.

Sepię crematę cinis admotus.

Lini

Lini semen illitum.
 Orobi farina imposita.
 Sifymbrium inunctum.
 Bulbi cremati cum alcyonio impositi.
 Hedera decocta folia ex uino.
 Chamæleonis nigri radix.
 Alyssum concisum ex melle.
 Melia terra inuncta.
 Cyclamini succus illitus.

MATTHIOLI.

Thus cum lacte illitum.
 Melopeponum. } pulpa illita.
 Anguria. }
 Vuc immaturæ succus ex lacte huma-
 no illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad lentigines delendas.

Iridis Illiricæ radix cum albo ueratro
 admota.
 Cassia ex melle illita.
 Sanguis leporinus calens inunctus.
 Tritici farina ex aceto mulso.
 Raphanus cum loliacea farina admo-
 tus.
 Brassicæ semen inspersum.
 Sysymbrium tritum, & impositum.
 Allii cinis ex melle.

Dracunculi

Decoris.

Dracunculi maioris radix ex melle.

Bulbi ex melle, & aceto.

Nigella confricata.

Galbanum cum nitro, & aceto.

Alyssum concisum ex melle.

Narcissi radix cum urticę semine ex
aceto.

Ricini semen illitum.

Vitis sylvestris acini liniti.

Bryonię radix cum eruo, fœnogręco
& creta chia.

Adarces imposita.

MATTHIOLI.

Laricę resinę stillatitia aqua addito
oleo ex uini fæce parato.

Nux myristica illita.

Mustellę sel ex melle, & ari farina illi-
tum.

Oleum ex ouorum vitellis.

Rapi sylvestris semen.

Hordei farina ex aceto, & melle suba-
cta.

Auenę farina in aceto decocta & illita.

Fœnogręci farina cum sulphure, & ni-
tro apposita.

Fabacea farina.

Lupinorum decoctum affusum.

Sii succus illitus.

Aqua stillatitia è lapathi acuti radici-
bus, & aliorum nonnullis, uide lib. 2.

cap.

cap. 108. in commentario.

Melopeponum pulpa affricata.

Dracunculi radix illita.

Ari radix elixa cum fabacea farina de-
fruto subacta.

Gentianæ stillatitia aqua illita.

Centaurii minoris succus aut decoctum.

Menthæ græcæ succus illitus.

Pseudomelanthii seminis farina ex mel-
le illita.

Securidacæ utriusq; seminis farina ex
melle.

Scabiosæ succus cum chrysocolle fari-
na, & caphure momento.

Xyridis succus illitus.

Verbasci florum stillatitia aqua.

Lupuli florum decoctum epotum.

Scrophæ lac perfusum, & plena manu il-
litum.

DIOSCORIDIS.

Ad næuos.

Alcyonium illitum.

MATTHIOLI.

Auenæ farina in aceto decocta, & illi-
ta.

Lupinorum decoctum affusum.

Centauri minoris decoctum.

Argen

Decoris.

Argenti spuma ex aceto, decocta, & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad totius corporis nitorem.

Mastiche inpersa.

Uلمي liquor in folliculis conclusus illitus.

Butyrum inunctum.

Crocodili terrestris finum illitum.

Peponis succus cum eruii semine, & farina in sole siccatus ex aqua.

Bryoniae radix inuncta.

Cyclamini succus inunctus.

MATTHIOLI.

Caphura illita.

Fabacea farina.

Aqua e vulnerato betule caudice distillans illita.

Aqua e limoniorum succo parata uitreo alembico.

Fabarum stillatitia aqua, uide libr. 2. cap. 101. in comment.

Sinapi aqua subactum, & cuti affricum.

Ari radicum stillatitia aqua, nel insolutus earum succus.

Gentiane aqua stillatitia.

Verbasci florum stillatitia aqua.

DIOS-

Decoris.

311

DIOSCORIDIS.

Ad cicatrices delendas.

Afininus adeps inunctus.

Fabarum farina cataplasmatibus indita.

Ranunculi folia, & radices illitæ.

Calamintha ex uino decocta admota.

Cucumeris sylvestris radix trita, & in-
spersa.

Glans unguentaria cocta in aceto cum
nitro adhibita.

Bryoniæ radix cum eruo, creta chia, &
fœnogræco admota.

Chrysocolia illita.

Alcyoniū primum, & secundum inunctū.

MATTHIOLI.

Eruce semen tritum cum felle bubulo
illitum.

Ceruina medulla.

Opobalsamum.

Oleum myrrhe.

Oui recentis dum affatur sudor.

Caphura cum chrysocolia trita, & me-
dulla bubula illita.

DIOSCORIDIS.

Ad uirilignes.

Cochlearum terrestrium testæ crema-
tæ & illitæ.

Leporinus

Decoris .

Leporinus sanguis inunctus.

Sæpiæ crematę cinis admotus.

Fabarum farina inspersa.

Lupinorum farina imposita

Betę cruda folia illita.

Condryllę radix, & folia ex melle, &
nitro trita ex aqua.

Dracunculi maioris radix ex melle.

Asphodeli radice succus inunctus cō-
fricata prius sub sole cute.

Cæpæ succus in sole inunctus.

Allii cinis ex melle.

Piper cum nitro impositum .

Capparidis radix trita ex aceto .

Argemone ficcata, tusaq; cum nitro &
uiuio sulphure admota.

Telephii folia cum hordeacea farina
ex hydreleo sex horis admota.

Gentianę radice succus inunctus.

Chameleonis nigri radix cum sulphu-
re illita.

Ruta cum uiuo, pipere, nitroq; confri-
cata.

Libanotis semen ex acerrimo aceto.

Lilii cremata radix ex melle.

Nymphetę radix ex aqua.

Rubię radix ex aceto.

Althæę semen tum recens tum ficcum
tritum ex aceto in sole inunctum.

Anchusę radix ex aceto.

Narcysii radix cum urticę semine ex
aceto.

Bryonia

inoryonia cum cruo, creta chia, & fœno-
græco illita.

ans unguentaria in aceto decocta
cum nitro imposita.

ucumeris syluestris radix trita, & in-
spersa.

icini semen illitum.

eratrū nigrum ex aceto.

sulphur quoquo modo admotum.

alcyonium primū, & secundū, admotū.

MATTHIOLI.

Conorum cupressi decoctum affusum.
amarindorū pulpa in potionibus ad-
dita.

Aqua è limoniorum succo parata ui-
treo alembico.

Oleum ex ouorum uitellis.

Lupinorum decoctum.

Rapi syluestris semen.

Aqua è lapathi acuti radicibus, & aliis
nonnullis, uide lib. 2. cap. 108. in com-
ment.

Ari radix elixa cum fabacea farina de-
fruto subacta illita.

Mentha græca adhibita.

Chamæleonis nigri radix cum aceto
trita, & illita.

Securidacæ utriusq; seminis farina mel-
le excepta.

Scabiosæ succus addito chrysocollæ, &
caphuræ momento.

[Xyridis

Decoris.

Xyridis succus illitus.
Verbasci florum stillatitia aqua.
Lupuli florum decoctum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad lychenas, & impetigines.

Pini, & piceæ cortex illitus.
Lentisci foliorum decoctum fotu adhi-
bitum.
Cupressi folia cum polenta illita.
Rhammi folia admota.
Lignorum marcor inspersus.
Nasturtii semen admotum.
Rhaponticum ex aceto illitum.
Veratrum nigrum ex aceto illitum.
Glans unguetaria cum lotio imposita.
Vitis uiniferæ gummi cum nitro illitū
loco tamen prius perfricato.
Sulphur ex terebinthina resina.
Sal ex oleo, & aceto perfrictum.
Alcyonium primum, & secundum im-
positum.
Adarces illita.
Pix liquida inuncta.
Thus inspersum.
Aethyopicæ oleæ lachryma inuncta.
Pruni arboris gummi illitum.
Ficulneum lac cum polenta illitum.
Mel cum alumine decoctum illitum.
Propolis inuncta.
Triticeus recens panis ex muria.

Loliacea

Loliacea farina cum sulphure ex uino.
Cicer cum hordeo ex melle.
Lapathi cuiusq; radices in aceto deco-
cta loco prius scarificato, & nitro
confricato, appositæ.
Nasturtium ex melle impositum.
Allii cinis ex melle illitus.
Sinapi ex aceto illitum.
Chamæleonis nigri radix ex aceto co-
cta, & inuncta.
Ruta cum alumine ex melle.
Laserpitii liquor ex aceto.
Glutinum in aceto solutum inunctum.
Cucumeris sylvestris radix trita & in-
spersa.
Tithymali characiæ lac illitum.
Bryoniæ radix cum cruo, creta chia, &
foenogrecæ illita.
Aqua maris fotu adhibita.

MATTHIOLI.

Pix cum melle illita.
Tamarindorum pulpa frequenter deuo-
rata.
Oleum ex ouorum uitellis inunctum.
Rapi sylvestris semen.
Salvia humana affricta a ieiunis.
Aqua è lapathi acuti radicibus, & aliis
nonnullis, uide lib. 2. c. 108. in com-
ment.
Plantaginis recentia folia trita, & il-
lita.

D d Asphodel

Decoris.

Asphodeli radix ex aceto decocta, & imposita.

Gentianæ stillatitia aqua fotu usurpata.

Mentha illita.

Menthæ græcæ succus impositus.

Marrubii folia ex aceto.

Sacuridacæ utriusq; seminis farina ex melle illita.

Scabiosæ maioris radices decoctæ, & potæ quadraginta diebus, & earundem radicum pulvis quotidie drachmæ pondere ex sero hautus.

Xyridis succus illitus.

Lupulorum decoctum ebibitum.

Elebori nigri dilutum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad papulas.

Lac omne potum cum crudo melle admixta aqua, & exiguo sale.

Serum lactis potum.

Acetum applicatum.

Butyrum illitum.

Vrina humana inueterata adhibita.

Lupinorum farina admota.

Cyclamini succus adhibitus.

Pulegii decoctum corpori perfusum.

Ruta cum cera & myrteo oleo cataplasmatibus indita.

Staphi

Staphis agria illita.

Glans unguentaria cum lotio linita.

Rubigo ferri illita.

Alumen cum melle adhibitum.

Cinnabaris, idest, sanguis draconis ad-
hibitus.

Fornaceæ testæ, tostæ admotæ.

DIOSCORIDIS.

Ad alphas & cutis maculas.

Thapsiæ succus cum melle illitus.

Glans unguentaria cum lotio linita.

Narcissi radix cum semine urticæ ex
aceto.

Lotus sylvestris cum melle perunctus.

Cucumeris sylvestris pulverizata radix
imposita.

Ricini semen illitum.

Vitis sylvestris acini liniti.

Bryonia cum eruo creta chia, & sceno-
græco illita.

MATTHIOLI.

Lupinorum decoctum fotu adhibitum.

Rapi sylvestris semen.

Aqua è lapathi acuti, & aliorum non-
nullorum radicibus. uide lib. 2. c. 108.
in comment.

Melopeponum pulpa affricata.

d 2

Cepa

Decoris.

Cæpa cruda affricta.

Ari radix elixa, & cum farina fabacea
defruto subacta.

Boni Henrici succus ex aceto illitus.

Centauri maioris decoctum fotu adhi-
bitum.

Verbasci florum stillatitia aqua illita.

Lupuli florum decoctum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad pforam.

Staphis agria trita ex oleo illita.

Bryonia semen inunctum.

Aqua marina fotu adhibita.

Glans unguentaria in aceto cocta.

Sal illitum.

MATTHIOLI.

Lupinorum decoctum affusum.

Rapi sylvestris semen illitum.

Florum, & folliculorum lupuli decoctum
epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad scabiem.

Cardamomum ex aceto illitum.

Olee uirentis, & accensæ sudor manās
illitus.

Ficulneum

ficulneum lac illitum.

Erinacei marini testa cruda, testave cū aliis mista, & illita.

Hippocampi marini cremati cinis liquida pice, aut axungia, aut amaracino unguento coactus, & capiti inunctus.

Vina humana inueterata.

Serum lactis potum.

Cicer cum hordeo, & melle.

Lupinorum farina.

Argemone siccata, tusaq; cum nitro in balneo confricata.

Hirundinaria minor confricata.

Chameleonis nigri radix addito exiguo atramento sutorio, cedrinoq; liquore, & axungia paucolinita. quin etiam sulphure, & alumine mistis.

Glaus unguentaria cum lotio linita.

Origani decoctum corpori perfusum.

Quinque folii radix decocta linitaq;.

Potamogeton ualet pruritui impositū.

Lotus syluestris cum melle peruncta.

Veratrum nigrum linitum cum cera, pice, & cedrino oleo.

Stimmi cum cera, & exigua cerussa.

Alumen cum aqua aspersum aduersus pruritum.

MATTHIOLI.

Terebinthina refina illita.

Iuniperi cinis lixiuium euino paratū

Oliue syluestris oleum.

Dd 3

Aqua

Decoris .

Aqua in marcescentium quercuum caui-
tatibus reperta.

Tamarindorum pulpa frequenter deuo-
rata.

Poma Adami p mediū secta sulphuris
pulueris aspersa, subq; calenti cinere
calefacta, & scabiosis mēbris affricta.

Nucum iuglandium oleum uetus .

Fœnogræci farina cum nasturtii semine
aceto excepta.

Asphodeli radices ex aceto elixę , &
illitæ.

Senę decoctum , uel dilutum haustum.

Scabiosę decoctum, & eius succus in un-
guentis additum.

Xyridis succus illitus.

Eupatorii uulgaris, & fumarigę e capri-
no sero decoctum potum.

Eupatorii eiusdem succus cum aceto, &
sale.

Borraginis, uulgarisq; buglossi decoctū
ex uino, aut aqua paratum haustum.

Buglossi uulgaris radix trita, & ex ace-
to illita.

Lupulorum florum, & folliculorum de-
coctum epotum.

Ellebori nigri dilutum ebibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad lepram Græcorum.

Fel taurinū cum nitro, & cimolia terra.

Vrina

Vrina humana addito nitro fota.

Iuniperi cortex crematus, ex aqua illitus.

Fraxini cortex crematus ex aqua.

Vlmi folia concisa ex aceto.

Aethiopicae oleę lachryma illita.

Refina	{	Terebinthina	{	cum ærugine
		Larigna.		chalcātho, &
		Abiegna.		nitro illita.

Ficulneum lac cum polenta

Triticei furfures ex acerrimo aceto elixi.

Hordei farina ex aceto acerrimo, & hydreleo.

Lolii farina cum sulphure ex uino, & aceto.

Lapathi cuiusq; radices loco prius scari ficato, & nitro confricato admote.

Brassica concisa cum polenta adhibita.

Veratrum nigrum ex aceto.

Allii cinis ex melle.

Sinapi ex aceto.

Bryoniae semen illitum.

Nasturtium ex melle.

Anchusę radix ex aceto.

Ranunculi folia, & radices apposita.

Melanthii semen admotum.

Cucumeris agrestis radix in puluerem aspersa.

Glās unguetaria cocta ī aceto cū nitro.

Thapsiæ succus inunctus.

Scammonia in aceto decocta illita.

Dd 4 Vitis

Decoris.

Vitis uiniferae gummi admotum, loco
tamen prius nitro perfrieto.

Aerugo cum nitro ex terebinthina re-
fina

Alumen cum brassica, & melle coctū.

Sulphur ex resina terebinthina, &
aceto.

Sal ex oleo, & aceto seruefactum.

Alcyonium primum, & secundum illitū.

Adarces imposita.

Melia terra illita.

MATTHIOLI.

Tamarindorum pulpa frequenter de-
uorata.

Chamaeleonis nigri radix ex aceto tri-
ta, & illita.

Ellebori nigri dilutum bibitum.

Senae foliorum dilutum potum.

Polipodii radicum decoctum haustum.

Fumariae succus ex sero caprino diutius
epotus.

Viperæ pastilli ex melissophylli succo
insumpti.

Myrobalanorum nigrorum chebulorumq;
decoctum pluribus diebus haustum.

MATTHIOLI.

Ad morbum gallicum.

Myricæ radicum decoctum potum.

Guaiacum

Guaiacum lignum, & eius decoctum.

Guaiaci uinum, quære lib. i. comment.
de ebena.

Radicis. } Chinæ } decoctū po
 } Zarzæ parillæ } tum.

Buxi ligni decoctum.

Pruni sylvestris rad. decoctum, & non
nullorum aliorum ad eos qui oris
exulceratione laborant, Vide libro
primo comment. de pruno.

Asarinæ decoctum potum.

Eryngii nouellorum foliorum stillati-
tia aqua pota.

Dictamni albi radices quotidie drach-
mæ pōdere ex guaiaci decocto potē.

Aspleni decoctum ebibitum.

MATTHIOLI.

Ad obesos extenuandos.

Cancamum potum.

Fraxini semen.

Acetum frequenter potum.

DIOSCORIDIS.

Ad pruritum.

Ficulneum lac admotum cum polenta.

Sulphur ex nitro.

Sal ex oleo, & aceto perfritum.

Alumen cum aqua aspersum.

Dd 5 MATTH

Decoris.

MATTHIO LI.

Beta nigra in aqua decocta, & illita.
Boni Henrici succus ex aceto illitus.
Senæ decoctum, uel dilutum potum.
Eupatorii uulgaris, & fumarię deco-
ctum potum.
Lupuli florum, & folliculorum deco-
ctum epotum.
Serum lactis haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad elephantiasim.

Erinacei terrestris exiccatum corpus
in cibis sumptum.
Cedria inuncta.
Coclearum terrestrium cinis illitus.
Salamandra alijs frequentibus medica-
mentis admixta.
Fel. } Caprę syluestris. } inunctum.
 } Hircinum. }
Calamintha in cibis sero lactis superpo-
sito.

MATTHIOLI.

Myricę radicum decoctum, & cum pas-
sis uuis epotum.
Viperina caro deuorata.
Viperei pastilli insumpti.

Veronica

Veronica mas.

Eupatorii uulgaris, & fumarię succus simul haustus.

Ellebori nigri dilutum ebibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad alarum tædia.

Myrrha cum liquido alumine illita.

Myrti foliorum arentium farina inspersa.

Cardui radix cataplasmatibus more adhibita.

Alumen linitum.

MATTHIOLI.

Asphodeli radices cum hyoscyamo teruefactę, pice liquida exceptę, & illitę.

Alumen ex uino affricatum.

Abfinthium recens appositum.

DIOSCORIDIS.

Ad clauos, callos, & uerrucas.

Salicis corticis cinis admisto acceto maceratus, & illitus.

Smaridis piscis saliti crematum caput.

Dd 6 Lacertæ

Decoris.

Lacerte concisum caput.

Ouillum finium ex aceto.

Mel cum alumine decoctum.

Cicerum grana tot accipe quot sunt porri, & singulis granis singulas tange verrucas, deinde liga grana cicerum in linteolo, & post tergum proiice, & hoc non fiat nisi noua luna.

Heliotropii semen linitum.

Scilla cremata peruncta.

Ranunculi folia, & radices.

Dipsaci radix in uino decocta tusa, & imposita.

Nigella ex uetere urina imposita loco prius scarificato.

Lasertitii liquor cera præmollitus impositus scarificatione prius facta.

Clinopodium diebus aliquot potum.

Chamæsyces rami triti, & impositi.

Vitis sarmentorum uiridium incensurum emanans aqua illita.

Aerugo imposita.

MATTHIOLI.

Saligni corticis cinis aceto maceratus, & impositus.

Cicorium uerrucarum in acetario deuoratum.

Eiusdem semen tribus diebus drachmæ pondere insumptum ante nocturnum decubitum.

Ranunculus

Ranunculus tritus, & impositus.

Chelidonii maioris succus illitus.

Verbasci succus tam florum, quam foliorum illitus.

Cantharides tritæ, & ex fermento illitæ.

DIOSCORIDIS.

Ad acrochordonas thymos, & myrmecias

Mali punici uinum adhibitum.

Lac ficulneum cum adipe circa adiacentem carnem illitum.

Chus ex aceto, & pice illitum.

Ruta cum pipere, uino, & nitro affricata.

Cicer cum hordeo, & melle.

Ranunculi folia & radices.

Dipsaci radix trita in uino decocta.

Fithimali characiæ succus, & lac illitum.

Chamæsyces rami triti, & impositi.

Heliotropii semen illitum, Quin & heliotropium minus

Vitium uiniferarum farmentorū uiridium incensorum emanans aqua illita.

Sal cum senu uitulino illitum.

MAT-

Decoris.

MATTHIOLI.

Saligni corticis cinis ex aceto imposi-
tus.

Cichorium verrucarium in acetario de-
uoratum.

Eiusdem semen drachmæ pondere potū
ante nocturnum decubitus.

Ranunculus tritus, & impositus.

DIOSCORIDIS.

Ad labiorum rimas.

Adeps } Anserinus } illitus
 } Gallinaceus }
Lycium admotum.

MATTHIOLI.

Terebinthina, larigna q; resina.

Fagi folia.

Oleum ex ouorum uitellis

Pomata illita.

Oleum è tritico.

DIOSCORIDIS.

Ad sudorem ciendum.

Ferulæ semen ex oleo impositum.

Onobrychis ex oleo inuncta.

Me

Mel Heraclium quodam anni tempore
deuoratum

Fici maturæ comestæ

Sinapi in cibum sumptum.

MATTHIOLI.

Succinum album ex uino potum.

Aurantiorum, & limonum florum stil-
latitia aqua pota.

Quinta essentia nostra in comment. de
uino descripta unciæ pondere hau-
sta.

DIOSCORIDIS.

Ad sudorem compescendum.

Bulbi comesti.

Sulphur confricatum.

Gypsum

Marochtus lapis

Samia terra

} admota.

MATTHIOLI.

Syluestrium oliuarum oleum illitum
toti corpori.

Myrteum oleum

Cyperi radicum.

Nardi Indicæ

Rosarum syluestrium

} puluis affri-
ctus toti cor-
pori.

DIOS-

Decoris.

DIOSCORIDIS.

Ad extergendam cutim.

Cyclamini radix inuncta.

MATTHIOLI.

Rapi syluestris semen.

Ari radix elixa cum fabacea farina de-
fruto subacta.

Gentianæ stillatitia aqua.

SIMP

MEDI

RV

Quibus er

humores

iection

al

Explam

DIO

Ad



Lychni

durum

Andros

rum pon

Verum n

scimone

Pycnom

pondere

SIMPLICIVM MEDICAMENTO- RVM VIRES,

Quibus exuberantes in corpore
humores uomitu, & alui de-
iectione excernuntur;
ex Dioscoride.

Expellentium medica- mentorum.

DIOSCORIDIS.

Ad bilem educendam.



RIS Illyrica drach-
marū septē pōdere
ex hidromelite pota
Thlaspi semen potū.
Aloe hausta.
Absinthiū potui datū
Tragorigani decoctū
bibitum.

Lychnidis sylvestris semen drachmarū
duarum pondere potum.

Androsæmi semen duarum drachma-
rum pondere sumptum.

Veratrum nigrum per se datum, aut ex
scammonia cum salis drachma

Pycnocomi radix duarum drachmarum
pondere ex aqua mulsā.

Cen-

Expellentiu medicamentoru.

Centaurium minus decoctum deuoratum.

Parthenium ficcatum cum aceto mulso, aut sale

Thapsiæ succus in aqua mulsa potus.

Clematidis alterius semen tritum potum.

Sesamoides tritum exhibitum.

Cucumeris syluestris radicis succus, & cortex sesquioboli pondere bibitus.

Hippophae succus oboli pondere potus.

Ricini triginta grana purgata, trita, & hausta.

Tithymalorum omnium succus binis obolis in posca potus.

Mercurialis ius epotum.

Lathyris grana sex, aut septem cum ficis, aut palmulis in catapotio deuorata.

Peplus in hydromelitis cyatho potus.

Scammonii succus drachmæ unius, aut quaternum obolorum pondere haustus ex aqua mulsa uel pura.

Chameleæ folia in catapotiiis deuorata cum duabus absinthii partibus adiecta chamelea una cum hydromelite.

Thymelexuiginti granorum pars interna bibita.

Folia [Sambuci]olerum more cocta, & [Ebuli] deuorata.

Apios.

Expellentiu medicamentoru. 322

Apios. s. inferior radice pars deuorata.

Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite haustum.

Filiculae aridae farina aqua mulsa inspersa ebibita.

Cynocrambae decoctum epotum.

Heliotropii decoctum ex aqua potum.

Agarici drachma una, vel altera cum mulsa bibita

Pityusae radix drachmarum duarum pondere cum mulsa hausta, seminis uero drachma; & succi cum farina subacti cochlearium in catapotio.

MATTHIOLI.

Afarum, & asarina.

Cassiae solutinae pulpa.

Manna e senae diluto pota.

Spinae insectoriae baccae, & sirupus ex earum succo paratus.

Tamarindorum pulpa

Pruna.

Sebestena.

Zyzipha.

Nasturtii semen denariorum decem pondere ex aqua potum.

Thlaspi semen acetabuli mensura epotum.

Rhabarbarum insumptum.

Sena

Expelleutiū medicamentorū.

Sena
Gratiola
Frangula
Myrobalani flauī

} hausta.

DIOSCORIDIS.

Ad pituitam eiiciendam.

Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex hydromelite.

Mandragorę succus duorum obolorum pondere potus.

Veratrum nigrum per se datum, uel cū scammonia cum salis drachma.

Lycii Indici semen cyathi dimidii mensura potum.

Ulmī crassior cortex in uino, aut aqua frigida unciatim potus.

Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis modo paratum haustum.

Cyclamini radix ex hydromelite pota.

Scilla cum melle cocta pota.

Hyssopi decoctum ex aqua, melle, & ruta epotum.

Thymum cum sale, & aceto haustum.

Sphondilii semen potum

Ammoniacum drachmæ pondere potū

Daphnoides folium recens uel aridum ebibitum.

Hippophæsti succus trium obolorum pondere ebibitus

Epithy.

Expellentiu medicamentoru. 323

Epithymum potum cum melle.

Bryoniae succus cum aqua mulsa

Cnici seminis succus cum mulso, uel iure gallinaceo.

Magnes

Cetaurii minoris decoctum deuoratu.

Parthenium siccatum cum aceto mulso aut sale potum.

Clematidis alterius semine tritum potu.

Sesamoides tritum datum.

Cucumeris syluestris radices succus, & cortex sesquioboli pondere bibitus.

Hippophais succus oboli pondere potus.

Ricini grana triginta trita, & epota.

Lithymalorum omnium succus binis obolis in posca potus.

Lathyris grana sex, aut septem in catapotio cum ficis aut palmulis deuorata.

Peplus in hydromelitis cyathis epotus

Scammonii succus drachmae unius, aut quaternum obolorum pondere haustus ex aqua pura, uel mulsa.

Chamelæ folia in catapotis deuorata cum duabus absinthii partibus adiecta chamelæ una cum hydromelite.

Thymelæ uiginti granorum pars interior bibita.

Folia [Sambuci] olerum more cocta & [Ebuli] deuorata.

Apii inferior pars deuorata.

Empe-

Expellentiu medicamentoru .

Empetrum in iure aliquo aut hydromelite.

Filiculę aride farina aqua mulsa inspersa, & hausta.

Cynocrambe decoctum bibitum

Pithyusę radix duarum drachmarum pondere cum mulsa, & seminis drachma, succi uero cum farina subacti coctarium in catapotio exhibita.

Heliotropii decoctum ex aqua potum.

Agarici drachma una, aut altera cum mulsa pota

MATTHIOLI.

Iridis radice succus potus.

Asari decoctum, aut dilutum potum, & præsertim ex caprillo sero paratum cum nardo, & hydromelite.

Asarina ex mulsa pota aut oxymelite.

Castiæ solutiæ pulpa.

Cnicinum oleum potum.

Mumia ex senæ diluto pota.

Spinę infectorię bacce, & earum succus.

Cyclaminus

Dracunculus.

Agaricum

Rhabbarum.

Aristolochię utriusq; radix

Cen-

expellentiu medicamentoru. 334

Centaureum minus

colloc.

Gratiola.

Sena

Myrobalani Chepuli, empelici, & Belli
rici

Frangula.

DIOSCORIDIS.

Ad atram bilem pel-
lendam.

Mandragorę succus potus duorum obo-
lorum pondere ex mulso.

Gallinaceorum senescentium ius, Dio-
scoridis modo paratum, epotum.

Epithymum ex melle haustum.

Serum lactis ebibitum.

Origanum siccum acetabuli mensura ex
mulsa potum.

Pulegium bibitum.

Elleborum nigrum haustum.

Spartium epotum.

Alypum mensura epithymo pari cum
sale & aceto sumptum.

MATTHIOLI

Sena, & eius decoctum uel dilutum, &
uinum ex ea paratum. Vide com-
ment.

Expellentiu medicamentoru.

ment. eius lib.3. cap.70.

Myrobalani nigri

Ellebori nigri dilutum potum.

DIOSCORIDIS.

Aduomitum ciendum.

Thlaspi potum bilem rubeam educit.

Mandragora pota atram bilem.

Thapsie lacteus succus in mulsa epotus.

Tithymalorum succus cum aqua mulsa binis obolis haustus.

Apii superior pars deuorata.

Spartii flores, & semina in mulsa pota.

Anagyris semen commanducatum.

Betonice radices ex hydromelite pota pituitam eiiciunt.

Papaueris spumei semen in mulsa acetabuli mensura potum.

Staphidis agrie grana quindecim in mulsa propinata.

Silybi radice drachma pota.

Glans unguentaria cum hydromelite

Narcissi radix cocta est, seu pota

Ricini grana triginta hausta.

Raphani cortex ex aceto mulso potus.

Tithymalorum omnium succus epotus.

Aesustum cum hydromelite potum.

MAT-

Expellentiu medicamentoru. 325

MATTHIOLI.

Napi semen ex oxymelite, & tepenti
aqua potum.

Atriplicis semen potum.

Lathyris semen haustum.

Asari radicum puluis ex oxymelite po-
tus

Stibium nostrum quinq; granorum po-
dere ex rhodofaccharo sumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad aquam intercutem edu-
cendam.

Cyclamini radix ex hyromelite hau-
sta

Polii decoctum bibitum.

Hippophæsti succus trium oboloru pon-
dere potus.

Hippophais succus oboli pondere sum-
ptus

Ricini grana triginta pota.

Lathyris cuiusq; grana sex, aut septem
in catapotio cu ficis aut palmulis de-
uorata.

Sambuci } folia olerum more cocta &
Ebuli } deuorata.

Empetrum in iure aliquo aut hydrome-
lite haustum.

E e Cyno-

Expellentiu medicamentoru.

Cynocrambe decoctum epotum

Asarum potu sumptum.

Lactucæ syluestris succus in aceto mul-
so potus.

Trifolii radix drachmarum duarum pō
dere in uino bibita.

Tithymalorum succus epotus.

Thymelæe uiginti granorum pondere
pars interna bibita.

Vitis syluestris radix feruefacta in aqua
in cyathis duobus nini aqua marina
dilutiepota.

Squamma æris ex aqua mulsa hau-
sta.

Mercurialis decoctæ ius potum.

MATTHIOLI.

Iridis radicum succus potus.

Perfici flores in acetariis deuorati.

Brassicæ marinæ succus cum Rhabarba
ro sumptus.

Frangula.

Elaterium bibitum,

Rhabarbarum

Agaricum

Stibium nostrū deuoratum quinq; gra-
norum pondere.

Turpetum in potionibus adhibitur.

DIO.

Expellēiū medicamentotū. 316
DIOSCORIDIS.

Ad aluum emolliendam, ci-
tandamq;.

Cerasia recentia manducata.

Runa in cibis sumpta.

Siliquæ deuorate.

Fici maturæ deglutitæ

Lac ficulneum potum.

Chamarum piscium ius epotum.

Vnguis adoratus ebibitus.

Raphanus comestus.

Beta alba deuorata.

Blitum comestum.

Rumicis cuiusq; decoctum potū, Quin
& ipsa herba decocta deuorata.

Malua in cibo sumpta.

Atriplex deuoratum.

Brassica leniter seruesacta comesta.

Lentis decorticatæ decoctum primum
haustum.

Asparagorum cauliculi in cibum acce-
pti.

Cucurbitæ integræ seruesactæ expressus
succus epotus.

Gingiber quoquo modo sumptum.

Peucedanum potum.

Scillæ siccæ cochlear unum, aut alterum
ieiunis propinatum.

Androsæmi semen tritum, & haustum.

Helxines foliorum succus ebibitus.

Ec 2 Papa-

Espellentium medicamentorū.

Papaveris erratici semina acetabuli
pondere ex mulla aqua pota.

Cynoglossi decoctum haustum.

Chamaefices rami decocti, & in cibum
sumpti.

Bryoniae cauliculi recentes cocti, & in
cibum sumpti.

MATTHIOLI.

Cassia solutivæ pulpa deuorata.

Amygdalinum oleum epotum.

Manna ex iure sumpta.

Laricea resina deglutita.

Pruna Damascena, & Vngarica ex iu-
re, aut uino decocta.

Sebestena iure macerata, deuorata.

Iuglandes cum garo a ieiunis sumptæ.

Maluæ folia, uel teneri eius cauliculi
decocti, & ex oleo, & aceto deuo-
rati.

Beta alba, & eius succus, eo maxime
libræ ponderis infusus.

Eiusdem decocta radix sale aspersa &
supposita.

Hieracii succus ex posca duorum obo-
lorum pondere.

Senæ decoctum, uel dilutum, aut e-
iusdem uinum. Parandi rationem

habes in comment. proprio. libro. 3.
cap. 70.

Bellis

Expellentiu medicamentoru. 327

Bellis recens in catapotiis deuorata
uel ex iure decocta.

Vux pallie ante prandium deuoratz.

FINIS.

Ec 3 MENS V.

MENSVRARVM ET PON-
derum Typi ad Dioscoridis men-
tem. Ex Galeno.

In ponderum ratione,

Siliqua, Pendet Chalcum unum
Aegyptia faba, Chalcū unum & semis
Orobis, Chalcos duos
Obolus, Chalcos tres
Scrupulus, Obolos duos
Drachma, Scrupulos tres
Vncia, Drachmas octo
Acetabulum, Drachmas quindecim
Nux { Regia, Vncias septem
 Pontica, Vnciam unam
Libra, Vncias duodecim
Mina { Medicorum, Vncias sexdecim
 Italica, Vncias decem & octo
 Alexandrina, Vncias viginti,

DE ARIDORVM MENSVRIS

In aridorum mensuris,

Artaba Aegyptia, continet Modios
quinque
Modius Aegyptius & Italicus, Chœni-
ces octo

Medimnus

Medimnus, Hemiecta duodecim
Hemiectum. i. semisextum, Congios
duos

Congius, Choenices quatuor, idest
drachmas 720

Choenix, Heminas 3. Atticas. i. drach.
180

Sextarius, Heminas duas. i. drach. 120

Hemina, Cyathos sex, idest drach. 60

Cheme, Cyathi quartam partem, idest
drach. 2. & s.

Cochlear, Scrupulos tres

PONDERVM ET MENSV- rarum Liquidorum ratio.

In liquidorum mensuris,

	[Ceramini pēdet lib. 80
	Amphora lib. 80
	Vrna lib. 40.
	Congius lib. 10
	Sextarius lib. 1. & uncias 8
Vini	Hemina uncias 10
Aceti	Cotyla unc. 10
Aquæ	Oxybaphus drach. 18
	Acetabulum drach. 18.
	Cyathus drach. 12. & scrupulos 4.
	[Cheme drach. 3. & scrup. 1.
	Cera-

[Ceramium pendet lib.72.

Amphora lib.72.

Vrna lib.36.

Congius lib.9.

Sextarius lib.1.

Olei.

Hemina uncias.9.

Cotyla uncias.9.

Acetabulum drachmas.18.

Oxybaphus drach.18.

Cyathus drach.18.

Cheme drach.3.

[Ceramium pēdet lib.120.

Amphora lib.120.

Vrna lib.60.

Congius lib.15.

Sextarius lib.2.

Hemina lib.1.

Mellis.

Cotyla lib.1.

Acetabulum drach.27.

Oxybaphus drach.27.

Cyathus drac.20.

Cheme drach.5.

Errores qui corrigi debent.

Folio 7. b. lineæ 12. pernide leg. perinde
ibidē lin. 25. in modico, leg. immodico.

fol. 14. lin. 5. frigidam, leg. frigida.

fol. 15. lin. 12. Gallæ n. & Rhus. leg. Gal
le. n. Acetum, & Rhus.

fol. 20. lin. 1. altera, leg. alterare.

fol. 23. B. lin. 17. reservandi leg. rese-
randi.

fol. 34. lin. 14. decocti leg. decoctis.

fol. 49. lin. 26. si quidam. leg. siquidem.

fol. 52. lin. 25. quod futurum, lege quod
impurum.

Fol. 302. B in principio addatur,
Leporinum caput crematum, ex urfi-
no adipe.

Ranarum crumematar cinis ex liqui-
da pice.

In margine.

fol. 7. lin. 3. cap. 9. leg. 19.

fol. 11. lin. 12. c. 6. leg. c. 26.

fol. 16. lin. 13. cap. 5. leg. 15.

fol. 26. B. lin. 17. cap. 20. leg. 2.

Ibidem in fine cap. 20. leg. 2.

fol. 27. B. lin. 25. cap. 30. leg. 3.

Series chartarum.

ABCDEFGHIJKLMNO PQR
STVXYZ.

Aa Bb Cc Dd Ee.

Omnes sunt sexterni, præter Ee, qui
est ternus.

VENETIIS,
Apud Vincentium Valgrisium.
M D L XIX.

